

IV. D^x 225


42500

VERHANDELING
Omtrend de WEERSGESTELD-
HEID en ZIEKTEN der
VEREENIGDE NEDERLANDEN,
UITGEGEEVEN
DOOR DE
N A T U U R-
E N
G E N E E S K U N D I G E
C O R R E S P O N D E N T I E-
S O C I E T E I T,
I N ' s H A G E.

*Ventos, & Varium Cœli prædiscere morem
Cura fit, ac Patrios cultusque habitusque locorum.*


VIRGILIUS.

I. DEEL.



MUTUA PRÆSTANT OFFICIA. *P. Hearn.*

IN 's GRAVENHAGE,
BY A. VAN HOOGSTRAATEN,
M D C C X C I V.



Nil foret in arte medica utilius, quam succedentes sibi ad invicem constitutiones conferre, ut recta medendi methodus institui posset, quoties eadem tempora ac iidem morbi recurrerent. —

R A M A Z Z I N I.

VOORBERICHT

A A N D E N

GEËERDEN LEZER.

Wy kunnen thans het genoeg hebben onze Landgenoten te berichten, dat agtervolgens het nieuw en verbeterd plan der inrichting dezer Societeit, veele nieuwe leden zich verbonden hebben het vervalte Gebouw dezer heilzaame Maatschappy wederom te helpen oprichten. Daar wy te vooren alleen de waarneeming ontvingen van éénen Geneesheer, die hoe naaukeurig ook zynde, nogthans door medehulp van verscheide Geneesheeren in elke Stad, daar de gelegenheid zulks toelaat,

laat, veel meerder aan het oogmerk dezer Societeit voldoen zouden, hebben wy hoop, daar dit bereids in voornaame Steden van dit gemeenebest plaats heeft, alwaar Gezelschappen van Geneesheeren opgericht zyn, welke met vereenigde poogingen elk Jaar een naauwkeurig verflag der ziekten in hunne Stad voorgevallen zullen opmaaken en aan deze Societeit toezenden, eene naauwkeurige bundel van welgestelde waarneemingen aan onze Lezers te kunnen mededeelen.

Dan daar dit plan eerst in het midden van voorleden Jaar is bekend gemaakt, konden wy niet verwagten daar van in het afge-loopen reeds de vruchten te zien.

Alleen om aan onze verpligting te voldoen geeven wy dit Stuk uit, het welk met betrekking tot 's Gravenhage de waarneemingen be-

bevat getrokken uit de aantekeningen van den Mededirecteur **THUESSINCK**; die van den Heere **VAN DER SANDE** op dezelfde leest geschoeid; die van den Heere **EICKMA** leverende de Waarneemingen van de Ziekten der laatste maanden van het Jaar 1793. door verscheide Geneesheeren aangetekend, en door dezen Geleerden Heer by een verzameld; en van nog eenige andere Corresponderende Leden.

— Wy twyffelen niet of wy zullen in het volgend Jaar meerdere Verhandelingen, welke ons toegezegd zyn, bekomen, en daar door anderen Steden aanspooren om op eene gemakkelyke wyze ook het hunne, tot het algemeen nut, en tot de kennis der Vaderlandsche Ziekten toetebrengen. Daar hier in 's Hage de Directeuren, die *Medicinae Doctores* zyn, zich

verbonden hebben om gezamenlyk hunne Waarneemingen te vergelyken, en na daar uit een geheel gevormd te hebben uit deze hunne Waarneemingen ook *Corallaria* te trekken, met verzoek aan alle Heeren Correspondenten om insgelyks by hunne eige Waarneemingen zodanige *Corallaria* agter aan te voegen, als zy oordeelen, dat uit hunne Waarneemingen kunnen getrokken worden.

Met smert moeten thans Directeuren melding maaken van het verlies der Societeit toegebracht door het afsterven een hunner medeleden, den Wel Edele Gestrengen Heer en Mr. PHILIPPUS VAN SWINDEN, 's Lands Advokaat, die tevens ook was Thesaurier dezer Societeit, een man wiens kunde, vriendelyke ommeegang, blaakende yver, welmee-

meenende poogingen, en naauw-
 keurigheid veel heeft toegedaan
 tot in stand brenging dezer in-
 richting, en die tot zyn dood
 toe onvermoeid in zyne arbeid
 tot welzyn van de Societeit is
 geweest. Dit verlies hebben Di-
 recteuren het genoeg van ver-
 goed te zien door de Verkiezing
 van den Wel Edelen Gestrengen
 Heer en Mr. PATYN *Secretaris*
 van 's Hage als Mededirecteur,
 door zyn Wel Ed. Gestr. aange-
 nomen. Tot Thesaurier is be-
 noemd den Mededirecteur AR-
 NOLDUS VAN DE LAAR *Med.*
Doct. — Voorts door het ver-
 trek van den Hoog Geleerden
 Heere THOMASSEN A THUES-
 SINCK, welke tot *Professor Me-*
dicinae Practicae aan het hooge
 School te GRONINGEN is aan-
 gesteld, de plaats van Directeur
 opengevallen zynde, is daar toe
 aan-

VIII V O O R B E R I C H T.

aengefteld den *Med. Doctor* JACOB COVYN TER BRUGGE, zullende de Heer THUESSINCK, als daar toe verzogt zynde, als Lid Consultant, Thesaurier en Correspondent te Groningen zo veel mogelyk in deze betrekking voortgaan, deze inrichting van dienst te zyn

V A A R W E L

'sHAGE,
den 9 October
1794.

ANT. LAURILLARD DIT FALLOT.

Societ. Secret.

P R O G R A M M A

V A N D E

NATUUR- EN GENEESKUNDIGE

CORRESPONDENTIE - SOCIETEIT

I N D E

VEREENIGDE NEDERLANDEN,

OPGERICHT IN 'S HAGE,

Voor 't Jaar 1793.

In de Voorberichten van de laatste uitgegevene Verhandelingen hebben Directeuren telkens moeten klaagen over eene vermindering van correspondeerende en contribueerende Leden der Societeit. Met leedwesen hebben zy moeten ondervinden, dat, ondanks alle hunne welmeenende pogingen, dit verval van tyd tot tyd is toegenomen, en hierom hebben zy in ernstige overweeging genomen, welke middelen men zoude kunnen in het werk stellen, om den geheelen ondergang van deze voor onze Inwoonderen zo nuttige Instelling voor te komen. Directeuren zyn van oordeel, dat onvoorziene oorzaaken voor een gedeelte daartoe aanleiding gegeven hebben, maar dat dezelve voor een volkomen redres vatbaar zynde, kunnen en behooren uit den weg geruimd en verbeterd te worden, wanneer zy zich vleijen, dat een ieder, wien het belang zyner

A

Mede-

Medeburgen ter harte gaat, zich beyveren zal, om tot dit gewigtig oogmerk, zo veel mogelyk, mede te werken.

De nuttige, doch zeer omflagtige Meteriologische Waarnemingen en Tafelen, welke gedurende de eerste Jaaren van eenige Plaatsen geregeld wierden ingezonden, zyn van verre de meesten of geheel agtergebleeven, of maar zeer onvolkomen toegezonden.

Dit veroorzaakte niet alleen eene merkelyke vertraaging in het uitgeeven der Verhandelingen, maar zelfs eene zekere verwarring, welke veelen dusdanig mishagden, dat zy zich allengs der Societeit onttrokken hebben, het welk wel dra een aanmerkelyke vermindering van het Fonds der Societeit, en een moeilykheid om de noodige kosten tot het drukken te vinden, te weeg bragt. Dit was te meer drukkende voor de Societeit, daar de Werken niet in het openbaar verkogt, maar den Leden alleen *gratis* toegezonden wierden. Het klein getal van Exemplaren, 't welk hier door verspreid wierdt, geraakte in te weinige handen, om een algemeen nut te kunnen doen, en anderen te kunnen aanmoedigen, om in dezelve deel te nemen.

De Verhandelingen, door de Correspondenten van tyd tot tyd ingezonden, hebben ook niet alleen de verwagting van Directeuren, en aan het Plan der Instelling voldaan, dewyl al sommigen
nutte-

nutteloos omflagtig waren, andere enkele Naamlysten van ziekten opleverden.

De Berichten waren in de agt laatste Jaaren zodanig schaars ingekomen, dat dezelve niet genoegzaam waren om in geregelde Stukken te worden uitgegeeven, en om deze rede hebben Directeuren voorgenomen, om dezelve alle by elkander in een Boekdeel uittegeeven, en op deze wyze, om zo veel dit in hun vermogen was, deze geheele gaaping in te vullen, waarby tevens beslooten wierdt, om daarmede het voorgaande werk te sluiten, en in het volgende Jaar onder een andere Titel de Verhandelingen op een zeer gemaklyke, korte en geschikte wyze, wederom uit te geeven.

Directeuren noodigen op nieuws alle Geneeskundigen van ons Vaderland uit, om met vereenigde poogingen wederom dit Werk op te vatten: vooral noodigen zy de Gezelschappen van Geneesheeren in grootere Steden, de Doctoren van Diaconien, Godshuizen en publieke Gestichten, om met elkander gemeenschaplyk hunne Berichten op te stellen, en aan de Societeit toe te zenden, wanneer Directeuren zich vleyen volledige Berichten van elke Plaats te zullen leveren, waaruit men den onderlingen samenhang der Ziekten, de regte bronnen der *morbi populares* beter zal kunnen opspeuren.

Het is met het grootste genoegen, dat Diree-

teuren vernomen hebben, dat zich in verscheide voorname Steden van dit Gemeenebest, dusdanige Genoodschappen van Geneesheeren verbonden hebben, en reeds werklyk bezig zyn, om zodanige Berichten op te stellen.

Daar de ondervinding Directeuren geleerd heeft, dat men met geen mooglykheid van alle Plaatsen van Nederland volledige Weêrkundige Tafelen na het eerste Plan der Societeit bekomen kan, hebben zy voorgenomen, om thans alleen hunne Correspondenten te verzoeken, om zo veel mogelyk op de gesteldheid van Weêr en Wind te letten, en ten minsten de voornaamste Winden, en de hoogste, laatste en middenstand van den Barometer en Thermoter voor elke Maand aantetekenen.

Topographische Beschryvingen van die Plaatsen, die in 't voorgaande Werk nog niet beschreeven zyn, Geboorte-, Trouw- en Sterflysten zullen aan Directeuren welkom zyn. Het ware wel te wenschen, dat de Geneesheeren in elke Plaats zich vrywillig verbinden, om de Gestorvenen, met opgaaf der Ziekte, aan de Secretarien aan te geven, ten einde men op de Sterflysten behoorlyk konde staat maken.


Eindelyk moeten Directeuren den Correspondenten erinneren, dat het groot oogmerk der Societeit hierin bestaat, dat men den waaren aart en geneefing der Ziekten, welke uit den samenloop

loop der oorzaken op elke Plaats ontstaan, navorsche. Zy verlangen dus geen bloote Naamlyst van Ziekten in elke Maand waargenomen; noch ook geen wydloopig verhaal van Geneeskundige gevallen, maar alleen een duidelyke en beknopte Beschryving van het beloop, toevallen en geneefing der Ziekten, en hierin kunnen zy HUXHAM en STOLL niet genceg als modellen aanpryfen. Zy meenen hier eger geenzints uittesluiten zodanige gewigtige gevallen, welke een omflagtiger Beschryving vorderen, en die *morbi chronici*, welke in de eene plaats, en op den eenen tyd, gewooner als op den anderen zyn, en dus wel degelyk tot de Geneeskundige Geschiedenis behooren. Ook verlangen zy, dat men het verband der *morbi chronici* met de doorgaande Ziekte, naga.

Voorts hebben Directeuren het volgende besloten.

- I. Dat de nieuwe Verhandelingen op kosten van het Genoodſchap gedrukt, ten voordeele van hetzelfde publicq zullen verkogt worden.
- II. Dat aan elk Lid, Mecenaat, Consulent, contribuerend of honoair Lid en Donateur een *Diploma* behoorlyk getekend en gezegeld zal ter hand gesteld worden.

- III. Dat in elke Plaats een der Leden zal verzogt worden om de Lyst van alle Leden in dat Departement op te maaken, en aan den Secretaris toe te zenden; zullende de Lyst der Leden voor het eerste Stuk gedrukt worden.
- IV. Alle Leden zullen een Exemplaar van de Werken der Societeit *gratis*, eer die in 't publiek worden uitgegeeven, ontvangen.
- V. De Correspondenten zullen Jaarlyks voor 1^{en} Maart hunne Berichten inzenden, om dezelve nog in 't zelve Jaar te kunnen uitgeeven.
- VI. Directeuren behouden egter aan zich de vryheid, om de Verhandelingen te bekorten en te veranderen, egter daar van te voren aan de Zenders kennis geevende.
- VII. De Berichten zullen voortaan met het hoofd-Departement van 's *Hage* beginnen, en met eenige Aanmerkingen en *corollaria* gesloten worden.
- VIII. De Verhandelingen van het voorgaande Jaar zullen altyd in het volgende gedrukt en uitgegeeven worden, zullende het eerste Stuk de eerste Jaaren 1791, 1792 en 1793 bevatten.



W A A R N E M I N G E N

OMTRENT DE LUGTSGESTELDHEID
EN ZIEKTEN VAN

'S G R A V E N H A G E,


In het Jaar 1791.

D O O R

E. J. THOMASSEN & THUESSINK;

A. L. M. Med. & Phil. Doct.

January.



Geduurende deeze geheele Maand hadden wy vogtig en koud weer, zo dat flegts een heldere dag in dezelve wierd waargenomen. Van den 1 tot den 4, den dag der nieuwe Maan, was de wind veranderlyk, N. NW. en ZW. regenagtig en koud: op den 4 hadden wy sneeuw met een weinig vorst, welke reeds den 5 ophield, wanneer de wind uit het zuiden waaide met zoelen regen en buijen. Den 15 waaide een heldere N. wind: van den 16 tot den 22 was de wind
A NW:

NW. en donker. Van den 22 tot het einde der maand, was de wind Z. met warmen regen.

Met het begin der maand waren 'er weinige Zieken, dan binnen weinige dagen vermeerderde derzelver getal aanmerkelyk. Door den aanhoudenden regen wierd de uitwafeming belet, de vaste deelen verflapt, en de vogten verdikt, en hieruit ontstonden veele rheumatieke, flymagtige en jigtige ongemakken.

Dan deeze namen, naar mate van de verschillende lighaamsgesteldheden, ouderdom en temperamenten der lyders verschillende gedaanten aan. Sommige hadden zinkingagtige zeere keelen, andere zinkingagtige pynen in de borst, welke door spaansche vliegen en zagte uitwaasfemende middelen wierden verdreeven. By veelen waren de onderkaaks-klieren sterk opgezet, waarby zich een ligte koorts met heevige tandpyn voegden, welke door buikzuiverende middelen, het aan'eggen van verzagten-de pappen en mondspoelingen en daarna door ligte zweetmiddelen binnen weinige dagen herstelden.

Deeze toevallen waren egter nu en dan slegts voorboden van een nalaatende koorts van een zamengestelden aart. De ziekte nam haar begin met een plaatslyke pyn in het een of ander deel, welke gewoonlyk met hevigheid het hoofd, de borst of ook wel de ledematen aangreep.

Na dat deeze pyn eenige dagen had aangehouden, wierd zy verzeld met eene meer algemeene pyn in 't hoofd, den rug en lendenen, maar vooral met eene ondraaglyke en borende pyn der beenen, plaatsverwisselende rillin-

lingen, beurtlingsche verwisfelingen van koude en warmte, een witte flymagtige tong, papagtigen en fomtyds fmaaklozen mond, drukking en bezwaardheid omtrent de maag, walging en braaklust. Deze koorts kwam tegens den nagt aan met koude, gevolgd door hitte, fomtyds met hitte alleen; by zommigen was een volftrekte flaaploosheid, by anderen wederom een onweerftaanbare neiging tot flapen, 'smorgens ging de koorts of geheel af, of had ten minften een merkelyke *remisfie*. Dit was het algemeen beloop der koorts, dan by sommigen was zy geheel onregelmatig, zodat fomtyds de zieke eenen geheel vryen dag had, doch ook fomtyds op eenen dag twee aanvallen van koorts kreeg. Deze koorts was langduurig en zeer hardnekkig, zodat zy van den lyder het grootfte geduld en van den geneesheer de uiterfte oplettendheid vorderde. Gemeenlyk was ik genoodzaakt in het begin wegens de plaatslyke pyn en vrees voor ontfteking eene aderlating te doen. Het bloed was zeer dik, en een weinig tot ontfteking overhellende. Na de aderlating liet ik veel van een losmakenden en verdunnenden drank drinken, waardoor de ftof, in de eerfte wegen opgehoopt, beweeglyk gemaakt wierd, en den volgenden morgen door een braakmiddel kon ontlast worden. Wanneer 'er uit de opgezetheid des buiks, en het vlokig wit of geelagtig beflag der tong agterdocht ontftond van zwaare en aan de ingewanden vast gehegte ftoffen, moesten 'er gedurende eenige dagen ontbindende afkookfels met midden zouten gebruikt worden, om dezelve be

weeglyk te maaken, waarna een purgeermiddel eene groote hoeveelheid taaije flymagtige stoffen deed losfen. Met deze behandeling was men dikwyls verpligt, weeken lang voort te vaaren, terwyl alle bittere middelen, en vooral de rhabarber, de ziekte verergerden en de koorts vermeerderden. Door het te vroeg aanwenden dezer middelen zag ik eens een geelzugt geboren worden, welke door een langdurig gebruik van zoute ontbindende middelen overwonnen wierd. Somtyds was deze koorts gepaard met andere toevallen, vooral met pynlyke en moeilijke waterlozing, hardnekkige zinkingagtige pynen &c., welke alleen door ontbindende purgeermiddelen wierden weggenomen.

Aanmerkelyk waren in deze maand de zinkingagtige buikpynen, buik- en perslopen, welke ik zeermengvuldig zag by vrouwen en lieden, die zwak en aandoenlyk van gestel waren.

Deeze ziekten waren gedeeltelyk flym- en gedeeltelyk ontsteking- en vooral zinkingagtig. Zy begonnen met vliegende en plaatsverwisselende pynen, welke zich eindelyk op de maag en ingewaden plaatsten, wanneer 'er walging flymagtign braking, gedurige doch ydele persfingen de ingewanden en blaas volgden, de pols was meest zeer klein en ingetrokken, dikwyls hard en gespannen, de tong of rood, of flymagtig en wit, de buik hard en opgezet, de ontlasting was zuiver flymagtig en het water zeer dik. Somtyds waren deze buikpynen van eene hevige remitteerende koorts verzeld. Wanneer men in deeze ziekte zo als gewoonlyk-

lyk reeds voor myne aankomst geschied was rhabarber toediende, wierden alle de toeval-
len aanmerklyk verergerd, en de pynen aller-
hevigst, met verheffing van koorts. De pyn-
stillende middelen waren zeer nadeelig, en de
opium schein de pyn wel voor een oogenblik
te stillen, dan daarna de ziekte zeer te verer-
geren. Eene ruime aderlaating, emollierende
en verzagtende stovingen des buiks, een aan-
houdend gebruik van verdunnende en verzag-
tende dranken, spaansche vliegen op den buik
aangelegd, somtyds ook aan de beenen, het
wryven met *spir. sal. ammon.* en amandelöly,
weekmakende verzagtende inspuitingen, en het
warme bad, deden hier den uitmuntendsten
dienst. De natuur redde zich meest door een zagt
zweet en een dik wit gezet water.

Deeze ziekte is zo wel door den uitmuntenden
STOLL beschreeven, dat ik hier deszelfs eigene
woorden zal laten volgen, te meer, daar ik meer-
malen gezien heb, dat deeze ziekte, die in ons
land, in alle vogtige winters, onbegrypelyk ge-
meen is, van veelen niet gekend en verkeerd
behandeld word.

„ *Quosdam assidui dolores abdominis crucia-*
„ *bant, postquam artus dolere cessaverant,*
„ *vel etiam artus una & intestina doluerunt,*
„ *Colicos hosce cruciatus ab rheumate intera-*
„ *nea obsidente credidimus. Quibus venter*
„ *hoc modo doluit, simul alvus fluxit, hi mu-*
„ *cum pendulum, velut ranarum sperma esse*
„ *solet, vel etiam qualis in calculosorum uri-*
„ *nis observatur, in fila ductilis; crebro &*
„ *torminose, & cum tenesmo dejecerunt, identi-*

„ dem cacaturientes. Mucum hunc subinde san-
 „ guis tingeat. Morbus dysenteriam refe-
 „ rebat, sanavi tamen ut rheuma intesti-
 „ norum phlogisticum, venæsectionibus sanguinem
 „ lardaceum exhibentibus, cataplasmate, fotu-
 „ que abdominis emolliente, & potu tepido,
 „ mucilaginoso, mucilagine potissimum gummi
 „ arabici. Dolore omni profligato, subinde
 „ collecta & auctior saburra excuti ore potuit
 „ tuto, quin & debuit. Diarrhæam, si qua
 „ restitaret ob inductam intestinorum lubrici-
 „ tatem, emendaverunt infuso-decoctum radice
 „ arnicæ, amara, interpositis subinde parego-
 „ ricis, & vinum austerum. Quidam difficulter
 „ & cum ardore mingebant; malum hoc subito
 „ nonnunquam, prægresso partis cujusdam alte-
 „ rius dolore veluti destillatorio, nunc vero dissi-
 „ pato, accessit, rheuma vesicæ appellabamus.
 „ Potus tepidi emollientes & cataplasma consimile
 „ dolenti pubi & perineo admotum profuit.” (a)

Van deeze ziekte verschildte en in natuur en
 in hevigheid de *colica Rheumatica SELLII*,
 welke ik reeds, als te voren hier meermalen
 waargenomen, beschreven heb. Deze ziekte
 valt in kwaadsappige en aan buikverstoppingen
 meer onderhevige menschen, ten minsten heb ik
 dezelve in die gestellen het meest gezien, waar-
 in ik verstoppingen der lever en der bloedvaten
 des onderbuiks vermoedde: er schijnt zich in
 deeze menschen een atrabilaire, jigtige stof op
 de

(a) Rat. Med. T. III. p. 71.

de ingewanden te werpen, welke de allerhevigste en onlydelykste pynen en persingen te weeg brengt: in het begin bepaalen zich de pynen gemeenlyk tot de dunne darmen, dan naderhand verspreiden zich dezelve door het geheele lichaam, en vooral worden de geledingen der armen, handen en voeten door deeze scherpe stof aangetast, terwyl er zich rondsom de geledingen pynlyke en veerkragtige zwellingen opdoen, even als wy dit in de jigt waarnemen. De ziekte schynt dus niet *rheumatisch* maar *arthritisch* te zyn, niet zoo zeer haaren oorsprong aan belette uitwaasfeming, als aan een gebrek in de werktuigen der spysvertering, verschuldigd te zyn, hoewel koude en andere uitwendige oorzaaken tot derzelyer opwekking aanleiding kunnen geven.

Wegens de hevigheid der toevallen is men somtyds genoodzaakt in het begin der ziekte aderslatingen, warme baden en emollierende middelen te gebruiken, spaansche vliegen op den buik brengen somtyds eene oogenblikkelyke verligting aan, dan ik heb meermaalen ondervonden, dat oplofende middelen, gepaard met opwekkende dingen, welke de scherpe jigtstof door het zweet en water loosden, het duurzaamste nut aanbragten. Het *sal. CC.* met *opium*, en vooral een langduurig gebruik van zoete kwik met *sulph. aur. antimon.* bragten de zeekerste en beste hulp aan. Door deeze middelen kregen de zieken een verliggend zagt zweet, een zeer dik wit gezet water, en loosden een menigte zwarte pekagtige stoffen. Of schoon de toevallen van deze *colica*, welke ik, hoewel niet menigvuldig, egter alle

A 4

jaar

jaar waarneeme, met de *colique de poitou* overeenkomen in toevallen, is egter de natuur daarvan zeer verschillende, en het is daarom van belang, dat men dezelve wel onderscheide. Het lood colyk luistert zeker het best na absorberende middelen met rhabarber, en daarna doen versterkende middelen de beste uitwerking, daar dezelve behandeling, na myne herhaalde ondervinding, in deze *colica* nadeelig is.

February.

Deeze geheele Maand was, even als de vorige, zeer koud en regenagtig. Van den 1 tot den 5. regende het doorgaans, hierop volgde den 6 vorst met een NW. wind. Den 7 ZW. nevelagtig. Den 8 NW. en koud. 9 Z. 10 N. 11 NW. met buijen. 12 N. en helder. Van den 13 tot den 20 was de wind veranderlyk Z. ZW. met doorgaanden regen. 20 smeltende sneeuw met NO. wind. 21 ZO. helder. 22 ZW. met nevel. 23 ZO. 24 Z. van den 25 tot den 28 heerschte een koude N. wind met verdwynende sneeuw.

Dezee geheele maand was meer doorgaande koud en nat dan de maand January, offchoon zy voor 't overige daarmede veel overeenkomst had. De ziekten waren egter nu meer zuiver zinkingagtig en slymerig, en die Ziekten, welke uit een slymagtige verdikking des bloeds, en een ophoping van slym in de verschillende ingewanden ontstaan, waren nu algemeen heerschende. Hoest, Benaauwdheid, Kortademigheid, Hoofdpyn,

pyn, Verkoudheid, Slymberoerte waren de meest gewoone ziekten. Zy vorderden eerst eene kleine aderlating om den omloop des bloeds te bevorderen, en daarna kragtige slymbrekende middelen. Omtrent den 10, wanneer de koude N. winden de overhand hadden, zagen wy het meest zuivere en ook met een weinig ontsteking gemengde zinkingagtige ziekten, zinkingagtige pleurissen, coliquen, doorlopen, roos en zwellingen der halsklieren, welke met eene kleine aderlating, spaansche vliegen, en eerst ontbindende vervolgens met openende laxermiddelen moesten behandeld worden.

Wanneer op den 20 de wind NO. waaide, scheen zich de rheumatische stof op de ingewanden te zetten, en veroorzaakte by veelen de te vooren beschrevene persloop en buikpyn.

Dat de *Podagra* dikwyls met graveel en aambeijen verwiszelt, heb ik meermalen waargenomen, ik had hiervan deeze maand een aanmerkelyk voorbeeld. Een podagrist, die dikwyls een sterken aambeyenvloed had, kreeg deeze maand sterke persingen op het water met loofing van zwart bloed, verzagtede middelen deden geen nut, het gebruik van poeijers met aluin en *gummi kino* en *Opium*, en een afkookfel van brandnetelen met salewortel, stopte de bloedwatering, veroorzaakte een algemeen verliggend zweet, waarop een geregelde aanval van *podagra* volgde, die den lyder volkomen herstelde, zonder dat hy daarna weder eenig ongemak der blaas gevoeld heeft.

Maart.

Het weer was de geheele maand meest zagt,

maar ten opzichte van natheid en droogte zeer veranderlyk, zodat wy sommige fchoone en warme lente dagen, en aanftonds daarop ftortregens en ftormen hadden.

De maand begon met fneeuw en een NO. wind, waarop een ligte vorst volgde, welke twee dagen voor de Nieuwe Maan veranderde in fchoon helder zagt weer, met een veranderlyken wind, die Z. ZW. en W. was. Den 9 waaide een heldere N. wind. Van den 10 tot den 20 was de wind W. of ZW. met een zoele heldere lügt. Den dag van de nagteveening op den 21 hadden wy koude noordelyke ftormwinden. Den 23 ging de wind na het NO. en wierd eindelyk NW. tot den 26, waarna dezelve weder naar het N. en NO. liep, met kouden nevel.

Met het begin der maand hadden wy veele zwaare verkoudheden, welke met buikpyn verwifelden, roos, zwelling der onderkaaksklieren, by kinderen waren de wormen menigvuldig en die fcrofuls hadden, leeden daar aan nu zeer veel.

De koortfen waren zinkingagtig, doch met ontfteking en gal gemengd (*rheumatico-inflammatorio-biliofa*). Zy begonnen met pyn door de leden, zeer zwaare hoofdpyn, benaauwdheid en pyn omtrent de maag, buikverftopping, een rood opgezet met geel gemengd wezen, een geele papagtig beflagen tong, een volle fnelle pols. De koorts was remitterende, kwam 's avonds met fterke rilling en koude aan, waarop brandende hitte met yling volgde, doch tegens den morgen met een fterk zweet afging. Het bloed was in deze koorts weinig ontftooken, dan de
ader-

aderlating verligtte de hoofdpyn. De tong wierd niet tegenstaande het vroegtydig gebruik der braak- en purgeermiddelen droog en brandig. Eens zag ik in deze koorts reeds den zesden dag den geheelen mond en de keel met spruw bedekt, de zieke wierd slaapzugtig, de pols klein en bevende en het hoofd meer opgezet. De verschyning van spruw in den beginne of in den ruuwen staat der ziekte voor den 7den dag is door BOERHAVE, VAN SWIETEN en KETELAAR voor zeer gevaarlyk gehouden, STOLL beschouwde de spruw als een teken van onreine stoffen in de eerste wegen. Ik heb seldsaam eenige spruw zien verschynen, dan tegens den 11den of 17den dag, wanneer zy meest verligting aanbragt en meest altyd een nadere crisis op den 20 aanduidde. In dit geval was het alleen een kenmerk van een opneming van stof in de vaten, welke reeds in het begin der ziekte zich van een gedeelte derzelve zогten te ontdoen, en dus een *molimen criticum*, doch onvolkomen, en niet genoegzaam om zich van de geheele ziektestof te ontlasten. Egter was het raadzaam in dit geval door zagte emollierende Middelen, mondspoelingen en pappen om de keel, deeze poging te helpen. Dan daar onder deeze behandeling de toevallen toenamen, en de ziektestof voor 't grootste deel in 't bloed was opgenomen, oordeelde ik het nodig, volgens den raad van VAN SWIETEN, den koortsbast toe te dienen, waardoor niet alleen de kwyling en beurtlingsche opkoming en afvalling der spruw bevorderd, maar op den 11den dag een critische ruime pislosing, en op den 13 een sterk zweet be-

bevorderd wierd. Hierna volgden tekenen van gekookte stoffen in de ingewanden, welke door zagte *laxantia* wierden ontlast, eindelyk wierd het water den 17 dag troebel, en 'er volgde een volkomen *crisis* met een wel gescheiden zetzels in 't water.

Over 't algemeen waren deeze koortsen gemakelyk door een aanhoudend gebruik van zagte laxeerende middelen weg te neemen. Wanneer tusfchen den 8 en 13 der maand de wind Zuidelyk en warm was, waren 'er veelen die gal en flymagtige brakingen en doorlopen hadden, zy herstelden door het wegnemen der galagtige oorzaak en het opwekken der belette uitwaassening.

Wy hadden geduurende deze maand verscheide lyders aan beroerte, onder anderen wierd ik by een sterk man geroepen, die zeer zwaarmoedig van gestel zynde, gewoon was zeer onmatig in het eeten te zyn. Hy had den voorgaanden avond na gewoonte onmatig voedsel genoomen, 's nagts had men hem hooren dansen over zyn kamer, des morgens vond men hem volkomen beroerd, met zwaare stuiptrekkingen, uit zyn oor was veel bloed gelopen, offchoon men by het naaukeurigst onderzoek geen uitwendige belediging konde vinden, hy was aan eene zyde geheel lam, daar de andere altyd stuipagtig was, hy braakte veel schuim en galagtige stof, zyn pols was zeer hard en sterk. Nadat ik hem ruim had adergelaten, zyn hoofd had laten scheeren en omslagen van koud water 'er omleggen, tragtende ik door een veer in de keel te brengen, hem te doen braken, vooral om dat de maag
zeer

zeer opgezet was, dan hiertoe was geen mooglykheid, door het gestadig woelen raakte de laadband los, en niet tegenstaande hy zeer veel bloed verloren had, bleef de pols hard. Met veel moeite gaf men hem prikkelende darminspuitingen, en men bragt het zo ver, dat hy eene dr. *scammonium* inkreeg. Dienzelven avond wierd hy weder adergelaten, en 's nagt gebeurde hetzelfde ongeluk, dat de laadband losfprong, waardoor wederom een zeer zwaar verlies aan bloed ontstond. Hy scheen door deze herhaalde ontlastingen bedaarder te worden, en op den 4den dag was hy volkomen by zyn kennis.

De ziekte bedaarde langzaam en hy herstelde volkomen. 'Er is by my geen twyffel over of de eerste oorzaak dezer beroerte moet in een al te groote ophoping van voedsel, en hier door veroorzaakte drukking op de onderbuiksvaten, waar door het bloed belet wierd naar beneden te vloeijen, en dus in de borstholte en het hoofd opgehoopt wierd, gezogt worden. Dan, zoude het raadzaam geweest zyn, hier, ter wegneming der oorzaak, een braakmiddel toe te dienen? Immers zoude hier door eene nog grootere ophoping van bloed in 't hoofd veroorzaakt zyn. Door de aderlating in tegendeel wierd de onmiddelyke drukking in het hoofd weggenomen, terwyl men door clysteeren den onderbuik zuiverende, gelegendheid gaf, dat de stoffen zich naar beneden konden begeven.

In dit geval hebben zekerlyk de verbasende ontlastingen van bloed, welke geen redelyk geneesheer zoude hebben durven aftappen, dezen
ly-

lyder het leven behouden. En waarlyk, wanneer ik alle gevallen van beroerte, die onder myne behandeling gevallen zyn, overwege, moet ik bekennen, dat alleen diegenen, waarin ik in het begin ruim en herhaald bloed ontlast heb, de gelukkigste geweest zyn. Spaansche Vliegen kunnen weinig afleiden, wanneer men die by de Aderlaatingen vergelykt, en ik meen over het algemeen waargenomen te hebben, dat dezelve in 't begin veel meer kwaad, dan goed uitwerken. De Heer GRANT schynt my dus al te zeer de Braakmiddelen te pryfen, en ik geloof, dat deeze behandeling alleen in een zeer zeldzaam geval te pas komt. De geleerde BURSERIUS waarschuwt dus te regt tegens deeze middelen.

Omtrent de Voorjaarsnagteveninig, wanneer 'er koude N. Winden waaiden, begonnen de Voorjaarskoortsen meer de overhand te nemen, zy kwamen nu schielyk en onverwagt aan met hevige koude, zwaare hoofdpyn, walging en braking, en deze toevallen waren zomtyds zo geweldig, dat zy een waar boord geleken, zommigen vielen door de hevige aanval in flaauwte. Anderen hadden deeze zelve Koorts, doch onder de gedaante van eene alle-daagsche tusschenpozende Koorts, waar van elke aanval met duifeling, hevige hoofdpyn, drukking en benaauwdheid, en walging begon. Deeze vorderde herhaalde aderlatingen, braakmiddelen en ontbindende *laxantia*. Het was een galkoorts met ontsteking gepaard. — Pleuris en peripneumonie met toevallen van onreinheid in de eerste wegen, en een galagtig

tig ontstoken bloed, wierden door aderlatingen, verzagtede pappen, en zuure ontbindende purgeermiddelen genezen. — Alle ziekten waren gedurende deeze dagen gal en flammagtig met ontsteking gemengd, wy hadden veel roos, neteluitslag, en *peripneumonia notha*, welke alle de zelve behandeling, namelyk aderlating en ontlastingen, vereischten.

April.

Gedurende het grootste gedeelte deezer maand hadden wy byna Zoomerweêr, het welk nu en dan door een zagten regen vervangen wierd. Van den 1 tot den 6 was de wind N. of NO., op den derden hadden wy eene Zonsverduistering, die hier zichtbaar was. Den 6 en 7 was het warm regenagtig weêr met ZW. wind. Van den 8 tot den 11 was de wind doorgaans 's morgens ZO. tegens den avond O. en warm. Den 13 en 14 W. en ZW. met warmen regen, 15 ---- 17 ZO. helder en warm. Van den 18 tot den 20 W. of ZW. wolkig. Den 21 Z. en zagten regen tot den 23. Van den 24 tot den 26 wolkig met W. wind. Van den 27 tot den 30 N. en NO. winden met kouden regen.

In het begin der maand, wanneer de dagen warm en de nagten koud waren, zagen wy veele catarrhale ziekten, die met gal gemengd waren, vooral zinkingagtige zeere keelen, baftaart pleurissen, galagtige boorden en coliquen.

Verscheide menschen, die in den voorgaanden herfst anderendaagfche koortfen gehad had-

hadden, wierden nu weder daar van aangetaft, en dit had niet alleen plaats by die geene, welke door koortsbaft waren weggenomen, maar ook by anderen, die de koorts of van zelve of door oploffende middelen waren kwyt geworden, by verre de meeften verdreef ik de koorts alleen door het gebruik van oploffende geneesmiddelen.

De aanhoudende of remitterende koortfen welke over het algemeen de overhand hadden, waren *febres ardentes* of *causi HIPPOCRATIS*, en offchoon by sommige de ontsteking plaatslyk, by andere meer algemeen was, droegen zy egter alle de kenmerken van de zelve ontstekingsagtige galkoorts. De ziekte kwam fchielyk en onverwagt met zware koude en rilling aan, hier op volgde of een pyn in de zyde die de ademing belette, dog veelal over de geheele aangedane zyde zich verspreidde, zware hoofdpyn, roodheid van 't wesen, met een geelagtigen weerschyne van 't begin af aan een fterke neiging tot rasen, drooge roode tong meest zuiver, doch ook wel geel beflag, meestal een zware brand hitte en droogte in de keel, onophoudelyke walging en neiging tot braken, de koorts kwam des nademiddags altyd met koude aan en verminderde aanmerkelyk tegens den morgen veelal met zweet, het water was zeer galagtig en met een zwaar rood zinkzel bezet. By die gene die plaatslyke ontstekingen hadden, vertoonde het bloed zich galagtig ontstoken, dat is, de korst was zeer geel taay en als gesmolten vet, terwyl het bloedwater
groen

groen zag. By de overigen was het bloed weinig ontstoken maar schuimende, geel en zeer teder. De eersten verdroegen dus ruimere en meerdere aderlatingen, terwyl by de laatsten de aderlating nuttig was in het begin der ziekte, doch geenzints een tweede verdraagen wierd. Na de aderlating zoude het zeker in dit geval aangewezen geweest zyn een braakmiddel te geven; zodra 'er geen plaatslyke ontsteking was, of de aderlating de pijn had weggenomen, waren de braakmiddelen ook allernoodzakelykst, dewyl dezelve de Hoofdpijn en Benauwdheid wegnamen en gemeenlyk de volgende verheffing aanmerkelyk verminderden; zo lang egter de pijn in 't ademhalen aanhield, heb ik alleen by de zuuragtige dranken een weinig *Tart. Emeticus* gevoegd, waardoor dikwyls de maag op een gemaklyke wyze van veel galagtige stof ontlast wierd, terwyl 'er tevens een heilzame doorloop ontstond, welke de ziekte zodanig verligtte, dat niet alleen de koorts verminderde, maar ook de pijn allengs, naar mate der ontlasting van galstof, verdween.

Ongetwyfeld behoorde deeze ziekte tot de *pleuritis biliosa*, welke door BIANCHI, GUIDET en naderhand door STOLL waargenomen en uitnemend beschreven is, de welke door de ouden reeds waargenomen door latere Geneesheeren is over het hoofd gezien, wanneer wy intusschen de beschryvingen deezer Geneesheeren met de onze vergelyken, zal het blyken, dat 'er een aanmerkelyke ontstekingskoorts mede gepaard was, welke het vroegttydig ge-

bruik der braakmiddelen in deeze ziekte belettede, en de aderlating noodzaakelyk maakte, welke ook altyd verligting te weeg bragt. Intusfchen heb ik in deeze epidemie meermalen waargenomen, dat door de herhaling der aderlatingen de koorts heviger en de pyn zwaarder wierd, wanneer de ontlasting zo wel door braak- als purgeermiddelen fomtyds niet alleen de pyn in de borst verminderde, maar zelfs geheel wegnam. De natuur was zeer geneigd om de gal door stoelgangen uit te voeren, en deeze waren over het algemeen zeer veilig en namen de ziekte spoedig weg. Offchoon ik niet geloof, dat men altyd purgeermiddelen in de plaats van braakmiddelen in galagtige ziekten geven kan en dezelve zeker in de eenvoudige zomergalkoorts nadelig zyn, heb ik egter meermalen gezien, dat in onze *pleuritides biliosæ*, welke zelden van ontsteking geheel vry zyn, de braakmiddelen de ontsteking vermeerderden en dat men dus met dezelve voorzigtig moest zyn, daar in tegendeel zagte *emeto-cathartica*, waartoe ik meest het *emeto-catharticum* van TISSOT gebruikte, welke ligte braking, doch veel meer een doorloop bevorderden, zeer veilige en heilzame hulpmiddelen waren, waardoor de gal na de ingewanden gelokt, en vermogend ontlast wierd.

Te gelyk met de *pleuritides biliosæ*, zag ik ook ware *angina biliosæ*; behalven alle tekenen van galkoorts, welke periodisch remittteerde, was de keel gezwollen en donker rood; de aderlating bragt niet de minste verligting aan, integendeel vermeerderde hierdoor de koorts en

en hitte aanmerkelyk, het bloed was niet ontstoken, maar dun en teder, terwyl de tong groenagtig was. De natuur redde zich ook in deeze ziekte door een galagtigen doorloop, welke door een zagt morgenzweet vergezeld wierd. Wanneer ik egter dit zweet door uitwaasfemende middelen wilde bevorderen, keerden de pijn en zwelling der keel, met alle de overige tekenen van galkoorts weder, die egter aanstonds weder wierden weggenomen, door het herstellen van den galagtigen doorloop.

By die geene, welke de koorts met eenen doorloop en zware buikpyn kregen, was de gal zeer beweeglyk en wierd gemeenlyk door een of twee braakmiddelen uitgedreven, waar na door zachte laxeermiddelen een galagtige doorloop volgde, die de koorts binnen drie dagen tot een geregelde anderendaagsche koorts deed overgaan, welke door aanhoudende laxeermiddelen ook spoedig geneezen wierd.

Van denzelven galagtigen aart waren de opzettingen der onderkaaksklieren, roos en uitilag, welke nu meenigvuldig gezien wierden; alle verergerden door uitwaasfemende middelen, terwyl een braakmiddel, en daarna een door laxeermiddelen te weeg gebragte diarrhé dezelve geheel en al wegnamen.

Gedurende de laatste dagen der maand hadden de *pleuritides* en *peripneumoniæ biliosæ*, dat byzonder, dat 'er niet tegenstaande de ruime ontlastingen door braak- en purgeermiddelen, waar door de ziekte overwonnen werd, 'er egter plaats verwisselende pynen in de borst overbleven, welke door herhaalde spaanschevliegen en an-

timonialia overwonnen wierden. Op dien tyd was het weer vogtig en zoel, en de uitwaasfening dus ligtelyk belet.

De eigenlyke *febris aphthosa* is over het algemeen in dit land een feldfaam verschynzel, ik had gelegenheid dezelve in deezen tyd waar te neemen.

Een vrouw van een teder en aandoenlyk gestel, werd door zwaare benauwdheid en hoofdpyn aangetast, welke om den anderen dag met een ligte koorts verzeld waren, de tong was wit bellagen en papagtig: na het gebruik van oplofende en laxeerende dranken, werd zy op eens hevig benaauwd, met een zwaare toeknyping der borst, welke toevallen door het ontlasten van veel zwarte stoffen bejaarden. Dan den volgenden dag werd zy op eens door een moeyelyke flikking en een gevoel als van een bal in de keel aangetast, waar by zy veel heldere pis loofde. Daar ik dit toeval als hyfterisch beschouwde, gaf ik een zenuwdrankje. Den volgenden dag was de keel droog en de benauwdheid meerder. Egter volgde er een goede nacht en de benauwdheid was merkelyk minder; ik vond toen de flikking moeylyker en de keel zeer rood, en hier en daar met witte spruw bezet, deze vermeerderde den tweeden dag, doch op den derden was de geheele mond en keel zodanig met spruw overtoegen, dat daar uit een moeyelyke ademhaling en ligging ontstond, den 7den dag kwamen de stonden, welke de ziekte verligteden, dan dewyl de zieke zeer zwak was, gaf ik den koortsbast. Op den 12den dag kwam een nieuwe bezetting

van

van spruw, en zodanig een onrustigheid en slaaploosheid, dat ik genoodzaakt was *opium* te geven. Dit verwekte een sterk zweet, waardoor de spruw verdween. Offchoon 'er nu geen spruw meer aanwezig was, verheften de benauwdheden egter om den anderen dag, doch langzamerhand verdween ook dit toeval, doordien de zieke 'snachts zweette, een sterk wit bezinkzel in 't water had en veel slymagtige afgangen kreeg.

Offchoon hier de spruw uit een scherpe stof ontstond, welke waarschyntlyk van een catharralen aart was, zag ik duidelyk, dat de natuur hier zynen eigenen weg wilde volgen, en de scherpte onder de gedaante van spruw in den mond ontlasten, terwyl op dien tyd alle overige ontlastingen de spruw weerhielden, en groote benauwdheid veroorzaakten. De Heer GRANT spreekt ook van deeze spruw en was ook van begrip, dat men de Natuur hier ongestoord haaren gang moest laten gaan, en alleen de scherpte door verzagtende en doorspoelende middelen moest tragten te matigen, terwyl alle ontlastingen, en vooral ook zamentrekkende middelen en opiaten nadeel aanbragten.

Mey.

De koude NO. winden bleeven van het begin tot den 10. aanhouden met gestaadigen regen, den 11. wierd de wind W. en het weer helder. Van den 12. tot den 16. waaiden 'er NO. en NW. winden, den 16. en 17. W. Den 18. NW. 19. N. 21. NW. met een heldere koude, van den 22. tot den 24. was

het weer helder en matig warm met W. wind. 25 NO. wolkig en koud. 26 O. en helder van den 27 tot den 30 NO. en helder.

De koude NO. winden veroorzaakten in het begin der maand catharrale koortsen, zinkingagtige zeere keelen, roos, zweeren in den mond, en by veelen spruw, of schoon de ziekten anders uit haaren aart niet hevig of kwaadaartig waren. By eenige kinderen zagen wy stikzinkingen vooral wanneer zy reeds eenigen tyd te vooren gehoest hadden, en daar na onvoorzigtig aan de lugt waren bloot gesteld geworden.

Ik had geduurende deeze dagen wederom gelegenheid het nadeel der braakmiddelen in beroerte te zien, hoe zeer dezelve ook aangewezen scheenen. Een mager slymagtig en met buikverstoppingen bezet man, wierd na dat hy een sterke ontlasting gehad en te gelyk veel bloed door de aambeyen was kwyt geworden, op eens beroerd gevonden, en lag zonder beweging en gevoel ter aarde, een ander geneesheer had een aderlating gedaan en een purgeerdrank voorgeschreeven. Zyn bloed was dik en slymagtig, de ademhaling ronkende en de pols langzaam. Hy deed alle pogingen tot braaken en loosde een weinig dikke slym. Ik liet 2 grein braakwynsteen in water smelten en by gedeeltens inbrengen. Dit veroorzaakte een sterke braking van veel dikke taaije slym. Een prikkelend lavement had geen ontlasting te weeg georagt. Ik vond hem na eenige uren bleek, ingetrokken, met moeilijke ademhaling, snorrende, niet zeer weinig kennis, hy bragt de
eene

eene hand dikwyls na het hoofd, terwyl de andere zoo wel als het been geheel verlamd waren. Niettegenstaande hy naderhand door darminspuitingen veel gal en slymagtige stoffen kwyt raakte, begon het hoofd en de oogen te zwellen, en hy stierf nog dien zelfden nacht.

Door de natte koude wierd de galagtige gesteldheid nu merkelyk verminderd, en daarentegen de slymagtige en catharrale in deszelfs plaats gesteld. Hier door waren de ziekten in het begin met ontsteking gepaard, en vorderden aderlatingen, waar na oplosfende middelen vereischt wierden om de taaije slymagtige stoffen te verdunnen en los te maaken: na dat deeze ontlast waren, deden de uitwaasfemende middelen en spaanschevliegen den meesten dienst.

Omtrent het midden der maand hadden wy veele tusschenpoozende koortzen, welke alle aan een belette uitwaasfeming, na dat het lichaam verhit geweest zynde, koude gevat had, haaren oorsprong verschuldigd waren. Zy hadden alle draaijingen, zwaare hoofdpyn, benauwdheid en een drukkende pyn omtrent den hartkolk. In het begin van den aanval braakten zy veel gal en na eyerdooren gelykende stoffen, op het einde van elken aanval was 'er een rood bezinkzel in het water, de tong werd na deezen aanval meer geelagtig beslaagen, en het water was weinig en wierd met moeite geloosd.

De brakingen, welke of door de natuur of door kunst verwekt wierden, deden hier den meesten dienst, en hier door wierd een

verbaazende meenigte *faburra biliosa* ontlast. Zommige kreegen na het viérde, andere na het vyfde acces van koorts eenen uitslag rondsom den mond, waar na de koorts aanstonds weg bleef. Ik was egter te raade nog langen tyd een doorloop te onderhouden, waar door ook alle myne lyders zonder weder instorten hersteld wierden.

Een remitteerende galkoorts zag ik in een zwaare roos overgaan, welke door den damp van warm water, met een zagte uitwaasfeming verdween, terwyl het water moejelyk wierd, en een zeer sterk bezinkzel afzette.

Omtrent den 25, wanneer de wind meest N en het weêr helder en koud was, wierd de galstof, welke niet konde uitwaasfemen, meest na de borst en ingewanden gebragt, hieruit ontstonden vele galagtige pleurissen, boorden, diarrheen, *rheumatismi*, moejelyke waterlozing, zwellingen der onderkaaks- en oorklieren, welke in 't eerst wel eenige ontfteeking, doch daarna haaren galagtigen aart vertoonden, en hierom zeer bedrieglyk waren.

Een bloedryk en sterk man kreeg, nadat hy zyne gewoone voorjaars aderlating had laten doen, een steekende pyn in de linker borst, met pynlyke en benauwde ademhaling en ligging, en een zeer harde pols, na twee aderlatingen had hy verligting en het bloed was niet ontftooken, egter was ik genoodzaakt wegens de hevige pyn hem voor de derde maal te laten, wanneer het bloed ontftooken was, de pyn had zig nu onder het borstbeen bepaald. Ik liet hier op een spaanscheylieg leggen, waarop de pyn verdween.

Op

Op den vierden dag kreeg hy een hevige koorts met koude, een zeer geele tong, een bitteren mond en walging, waarop hem een braakmiddel gegeven wierd, 't welk veel taye slym ontlastte. Op den 5 den dag verhefte de koorts teegens den avond met dezelve toevallen, het water was brandig rood. Op den zesden dag, was de kortademigheid minder, maar de tong bleef zeer beflagen en de pols hard. Op den 7 den was de eetlust verbeterd, maar de adembaling moejelyk, de tong droog, veel dorst en de pols hard. Den 8 sten dag had hy een hard en ontstoken gezwel aan de kuit, hy had een neusbloeding, hoestte bloed op, was kortademig en de pols hard en gespannen. Na de aderlating, waar in het bloed galagtig ontstoken was, verdween de zwelling in het been. Den 9 den was de zwelling hard en pynelyk, de pols minder hard, de kortademigheid sterker, ik liet daarom nog 10 oncen bloed aftrekken. Daarna was het bloed ontstoken, de pols zagter, doch de tong droog, en hy ylde, egter was de eetlust goed. Op den 10 den kreeg hy doorloop, het wesen wierd bleek en verwilderd, de adembaling geheel ruim, terwijl de pols klein en snel was, dit duurde voort tot op den 11 den; doch den 12 den was de yling hevig en boven op de hand vertoonde zig een *phlegmone*, de afgangen waren zeer stinkende, de tong rood, het water rood en helder, hy had opspringingen der peezen, s'avonds verhefte de koorts met opzetting van 't wesen, terwijl de pols snel en klein was en de stuyptrekkingen vermeerderden. Den 13 den wierd de slikking

moeijelyk en op den 14 den dag kreeg hy een *trismus maxillæ* en stierf dien nacht.

Deze *pleuris*, welke eerst van geen belang en eenvoudig scheen te zyn, wierd naderhand met een galagtige ontstekingskoorts verbonden. De natuur deed door verscheide pogingen haar best om de stof, door op twee plaatzen uitwendige ontstekingen te vormen, te ontlasten. Dan de bykoomende *phrenitis*, en de overgang tot een *febris putrida* maakte spoedighier van een einde.

In een oud man compliceerde dezelve gal-koorts met een bastaart longontsteking: na eenige dagen gehoest te hebben, verminderde de eetlust, en wierd de tong beslagen, er wierd een laxerende borstdrank gegeven, waarop de hoest vermeerderde, het wesen rood wierd, en de tong meer besloeg, by den borstdrank voegde men *nitrum* en *sp. Minder.* om de uitwaasfeming te bevorderen. Hierop kwam een koorts met hevige koude, braking van taaije gal, benauwdheid, kortademigheid, pyn in de zyde, met een uit rood en geelgemengde koleur van 'taangezigt, zeer zware hoest, en een zeer harde pols. Na een aderlating en het toedienen van een purgeerdrank, verbeterden deze toevallen. Dan alle avonden vermeerderden wederom de toevallen, wanneer de koorts opkwam, zo dat ik gedrongen was, vier aderlatingen te doen, wanneer het bloed telkens ontstooken en groenagtig was. Op den 6 den dag was de benauwdheid zeer groot, zonder dat de zieke, wiens borst zeer vol was, iets ophoefte. Een
drank

drank uit *Tamarinde*, *Manna* & *Tart. Emeticus* bevorderde dezelve uitnemend. Dan by elke avond-verheffing was de zieke zeer flaperigen benauwd, ende ophoefing was dan zeer weinig. Op den negenden dag, wanneer de zieke reeds veel door braking en stoelgangen was kwyt geworden, wierd de pols zwak, het water bleek en de borst benauwder, waarom ik een spaanschevlieg op de borst liet leggen, en een mixtuur met *kerm. miner.* & *oxymel. seill* toediende. Hier op volgde een ruime ophoefing. Op den 13den dag, na een heevige verheffing van koorts, kreeg hy meer gebondene afgang. Na deezen dag vermeerderde de ontlasting van stoffen daaglyks, terwijl tevens veel slym opgehoest wierd en het water een sterk wit bezinkzel had. Het aftrekzel van de *senega* wortel en de *flor. arnica* met de *gummi. ferulacea* & *sulph. aur.* deden nu zeer veel nut, en de zieke herstelde volkomen. — Dit geval was een *peripneumonia Notha* met veel ontsteking en gal verbonden.

Juny.

Deeze maand begon met een helderen ZO. wind, die op den 2. eerst NW. en daarna N. wierd. De hitte was deeze dagen zeer sterk en ondraagelyk, zodat alles verdroogde, op den 9 wierd de hitte door regen gematigd en de NW. wind bragt een schielijke verandering van koud weêr aan. Den 12 was de wind W. NW. met regen, storm en hagel, van den 13 tot den 23 veranderlyk, zynde de
wind

wind dan W. dan weder O. en NW. meest storm en buyagtig. Den 23 hadden wy weder een onaangenaam warm weêr met W. wind, dan van den 27 tot den 30 wierd de hitte draaglyker, terwyl de wind uit het Z. en ZW. waaide.

In den tyd van drie dagen veranderden de ziekten aanmerklyk, zodat nu de galagtige gesteldheid voor de catharrale plaats maakte, intusschen waren alle de ziekten meer of min met ontsteking verbonden, ja sommige waren zodanig ontstekingagtig, dat zy geenzints ontlastende middelen, maar herhaalde aderlatingen vorderden. Alle de lyders hadden een zeer harde pols, een zeer rood aangezigt en oogen, een drogen mond, en zeer sterken dorst; zonder dat zich een plaatslyke ontsteeking opdeed.

In het begin van den Zomer, wanneer de dagen warm en de nagten gemeenlyk koud zyn, en 'er N. of NO. winden waaijen, heb ik gemeenlyk gezien, dat in het begin der koortzen een ontsteekingagtige gesteldheid plaats had, en dat een aderlating als dan ongemeen veel nut deed en de daaropvolgende ontlastingen zeer bevorderde. SYDENHAM en GRANT raaden hier, en niet te onregt, om in 't begin der galkoortsen een kleine aderlating te doen, en STOLL, die over 't algemeen de aderlatingen niet toegedaan is, zegt zelfs, *ubi tempore, quod*
„ veri extremo & aestati interjacet febres bili-
„ osae accidunt, hae sanguinem accendunt, ita
„ ut in his cura a vs. etiam iterata inchoari
„ de-

„*debeat*” Op een andere plaats egter fchynt hy niet van het gevoelen van GRANT te zyn.
 „*Morbo bilioso per se vs. nunquam convenit*
 „*cum extracto sanguine bilis vomitore acrius in-*
 „*surgat et liberius in sanguinem irruat, si vero*
 „*bilis per corpus diffusa, tum etiam plethoræ*
 „*speciem cum febre valida, strangulationem mi-*
 „*nitatur quæ manu mittendus sanguis est. (a)*

Na myn gedagte behoort men dit laatste tot de ziekten van July en Augustus hier te lande te bepaalen, wanneer zeldzaam eenige ontsteeking met de galkoortsen gepaard is, maar de gal minder zuiver en meer tot rotting overhellen: de is, en 'er tegelyker tyd een *saburra putrida* in de maag en ingewanden gevonden word.

Na dat door aderlatingen en verkoelende middelen de ontsteking was weggenomen, ver- toonden zich spoedig teekenen van gal in de eer- ste wegen, welke aanstonds door braakmiddelen en daar na door purgeermiddelen wierden op- geruimd, of schoon de lyder zeer zwak scheen, heb ik dikwyls een braakmiddel het beste *car- diacum* gevonden. Wanneer de buik opgezet en gespannen was, gepaard met een waterag- tige dunne scherpe afgang, heb ik na een braak- middel met een uitstekend goed gevolg zuur- agtige laxeermiddelen toegediend, en daar door den doorloop zien ophouden, terwyl 'er goede stoelgangen kwamen. Zoo lang de pols snel en de hette groot was, heb ik noch bittere noch versterkende middelen toegediend, maar door rype vrugten en zuure dranken met laxeer- middelen gepaard ruime ontlastingen onder- hou-

houden en hier door de zieken hersteld. In deze koorts heb ik meermaalen gezien, dat versterkende middelen te vroeg toegediend, eene allergevaarlykste kwaadaartige koorts te weeg bragten, die den dood ten gevolge had.

By eenige kraamvrouwen heb ik in deze maand dezelve koorts gezien, welke zich met hoest en gierstuitslag, diarhé, walging en opzetting des buiks paarde. Door het gebruik van zuure dranken, vrugten, purgeermiddelen be- daarden de toevallen zeer schielyk. Seldsaam heb ik by kraamvrouwen gierstuitslag gezien, als in den voorzomer, wanneer zich met dezelve een galagtige koorts vereenigde, en hier van heb ik altoos in dit geval ruime ontlastingen laten onderhouden, wanneer door de stoelgangen in't gemeen veele oude galagtige en verstopte stoffen geloosd wierden.

Wanneer op den agtsten deezer maand de lugtsgesteldheid geheel en al veranderde, en het weer ruuw en buyig werd met een kouden noorden wind, ontstonden 'er aanstonds zeere keelen, pleurissen en diarheen, welke meest galagtig catharraal waren, dan na dat dit weer eenige dagen had aangehouden, wierden de vogten meer verdikt en slymagtig, zoo dat men nu die ziekten waarnam, welke men gewoonlyk in het najaar in de maand van October pleegt te zien, vooral de bastaard peripneumonie in volbloedige en bejaarde menschen. In het begin vorderde dezelve aderlatingen en een braakmiddel, daar na *laxantia*, dan wanneer men te lang met de ontlastingen aanhield, werd de stof tayer, de borst droger en de ophoefling moeielyker. In dit tydstop der ziek-

ziekte deden de spaansche vliegen, *antimonialia* & *scillitica* met *gum ammoniac* gepaard, de taye stof gemaklyk loozen, terwyl alle uitwaasfemende dingen oogenschynlyk in deeze ziekte nadeel toebagten. De pleurissen, welke nu ook menigvuldig waren, hadden ook een geheel anderen aart, zy waren *rheumatico inflammatoriae* en vorderden aderlatingen, spaansche vliegen en *emollientia*, terwyl somtyds alleen op het einde der ziekte *laxantia* vereischt wierden.

Op het einde der maand het weêr weder zeer warm wordende, hadden wy veel galkoortsen, en *pleuritides biliosa*. Over het algemeen zag men, dat de koortsen met een steevende pyn in de zyde begonnen, waar voor ik altoos een kleine aderlating deed, doch aanstonds daar op een braakmiddel liet volgen, en hier door werd gemeenlyk de geneezing ineens verricht.

July.

De maand July begon met een W. wind en zagten regen, welke tot den 8 duurden. Den 9 en 10 was de wind meer noordelyk en de regen kouder, van den 11 tot den 13 zoelen vogtig, van den 14 tot den 16. kouder met een NW. wind. Van den 16 tot den 19 was het brandend heet met een O. wind. 9 W. wind en regenagtig. 20 helder en warm. 22 Z. wind. 24 regen, W. wind. 25 buijg, van den 26 tot den 30 zeer warm en droog met een O. wind.

De galkoorts werd in het begin der maand algemeener, en offchoon 'er door de tusschenkomende

mende koude regen by zommige catharrale toevallen bykwaamen, was egter de *febris bilio-putrida* van GRANT, de *febris stationaria*. Deeze koorts was in het begin verzeld met pyn in de regter zyde, dan dezelve scheen haar zitplaats dieper te hebben, en strekte zich verder na het *epigastrium* uit, de koorts was remitterende, kwam 's avonds met verheffing aan en verminderde des morgens. Deeze pyn lusterde na geene aderlatingen, pappen of spaanschevliegen, maar scheen daar door te verergeren. Het bloed was helder rood en zeer tender, zodat by de minste omroering hetzelfde zich met het groenagtige bloedwater vermengde. In het begin was 'er noch walging, noch kwaade smaak in den mond, het water was hoog geel en de pols klein en snel. Dan na dat de koorts eenige dagen geduurd had, vertoonden zich de tekenen van gal duidelyk en vereischten herhaalde braak- en purgeermiddelen, waarmede dezelve door het ontlasten van veel groene gal zeer schielyk wierd weggenomen.

Gedurende de vogtige dagen dezer maand wierd zoo wel door de koude avonden als de natheid der lugt de galstof meer na de inwendige deelen van het lichaam en vooral de ingewanden bepaald, en hier uit ontstonden galcolyken en menigvuldige doorloopen, de lyders ondervonden eerst een ongewoone mattigheid en zwaarte door de leeden, de eetlust wierd gebrekkig, de mond smaakloos, zomtyds bitter, 'er volgde een zwaarte en drukkende pyn in de maag en ingewanden, waar
by

by zich rilling, gevolgd door meerdere of mindere hitte, volgden, vooral tegens den avond en des nagts, hierop kwamen 'er dunne galagtige geele afgangen. Wanneer men de natuur volgde en de ontlastingen haren gang liet gaan, of dezelve door zachte laxeermiddelen bevorderde, en tevens het bloed zuiverde door het gebruik van vrugten en zuuragtige dranken, hield gemeenlyk de buikpyn en doorloop van zelf op; dan niets verergerde zo zeer de pyn als de rhabarber, welke dikwyls reeds door de lyders gebruikt was; er ontstond dan hitte, en koorts, terwyl de buikloop gemeenlyk ophield, en de galstof in het bloed werd opgenomen. Byaldien de zieke geduurende dezen buikloop zich te veel aan de lugt bloot stelde, of in zynen gewoonen leefreegel voortging, kwam er een boord, waardoor de galstof met geweld van boven en beneden ontlast werd. In deze omstandigheid liet ik door zuure dranken met *Manna* gemengd, of met Tamarinde-water rykelyk doorspoelen, wanneer geduurende eenige dagen een heilzame buikloop onderhouden werd, die den lyder van eene anders onvermydelyke galkoorts bevrydde.

Nimmer zag ik zoo veele oogontsteekingen als in deze maand, aderlatingen, spaansche vliegen en oogwaters waren hier vrugtloos, ja verergerden de ziekte, de oogen waren geel rood, de pyn was niet zwaar, maar zy konden geen licht verdragen, de tong was zeer geel, de mond bitter, verzeld met walging, en een remitterende koorts. Herhaalde braakmiddelen, zuure dranken en purgeermiddelen namen deze *ophtha-*

mia biliosa weg. Van den zelfven aart was de galagtige roos en de zwellings der *parotides*, welke noch door pappen noch door zweetmiddelen, maar dikwyls door een enkel braakmiddel herstelden.

De pokjes, welke hier sporadisch waren, hadden dezelve galkoorts by zich. Een jongeling van 13 jaaren kreeg pyn door de leden, benauwdheid en walging, hy nam hier op zelfs een sterk purgeermiddel, sonder dat hy daar van eenige ontlasting had, 'savonds vond ik hem buiten kennis, zeer benauwd, met een harden vollen pols, gezwollen aangezicht, roode oogen, brandende huid, een zeer drooge, ruwe, roode tong, de maag en ingewanden waren zeer opgezet en hy waterde niet. Een aderlating verligte hem niet, maar na een clysteer wierd hy iets beter, hy braakte veel gal van een drank met *oxymel. & Tart. Emetic.*, dien dag had hy verscheidene rotagtige ontlastingen.

Den volgenden dag had hy nog eenige galagtige braken en de pokjes begonnen zich nu te vertoonen. Op den 4 den dag voelde hy zware buikpyn, zyn pols was byna natuurlyk, maar hy was zeer zwak: op den 5 den had hy zeer stinkende stoelgangen, dan 'savonds was hy wederom *comateus*, de handen waren koud, de pols traag, de tong zeer droog, de urine zeer brandig, de pokjes stonden droog en hard. Na dat hy eenige ontlastingen gehad had, wierd hy beter en de pokjes liepen nu ook haaren gewoon loop, zonder dat de galkoorts, welke door tydige en overvloedige ontlastingen en zuuren gestuit wierd, de pokjes verder belemmerde.

De

De galkoorts, welke in het midden en tegens het einde der maand zich openbaarde, werd genoegzaam altyd voorafgegaan door kleine witte zweeren in den mond, welke verdwynende, door de koorts zelve opgevolgd wierden, of ook fomtyds de ziekte vergezelden. By zommigen had deeze ziekte een enkele verheffing des avonds, by andere verhefte de koorts ook tegens den middag. Zelden werd in 't eerst meer dan een dikke slym ontlast, dan na dat de koorts eenige dagen had aangehouden, vertoonde zich de gal meer zuiver, zoo dat zy dan of van zelve, of door een braakmiddel in een zeer groote hoeveelheid met verligting ontlast werd, gewoonlyk volgden hier op zwartgallige ontlastingen, en een zeer troebele drabbige pis, welke de ziekte volkomen scheidde.

Gedurende deeze galagtige gesteldheid heb ik veele bloedspuwingen gezien, welke ik aan de uitzetting van 't bloed door de warmte toeschreef; ik heb daar by geen tekenen van gal waargenomen, en ofschoon het bloed niet ontstoken was, met vrugt, hoewel spaarsaam, adergelaten, en veele verkoelende en zuure dranken toegediend; byzonder vond ik, dat het comcomersap met citroen in dit geval uitnemende diensten deed, en de vogten zodanig verkoelde, dat de hette en drift der pols daar door zeer spoedig gematigd werd.

Augustus.

De hette was in 't begin der maand ondraaglyk

lyk, de lugt was helder, en de wind W., van den 2 tot den 6 hadden wy 'savonds zeedampen, welke de lugt verkoelden; van den 7 tot den 11 was de wind NW. en N. met hitte, den 11 en 12 viel 'er een verkwikkende regen. Maar den 13 bragt de ZW. wind weder een zwaare hette aan, die met een O. wind tot den 17 aanhield, wanneer de W. wind, welke schielyk N. wierd, een gematigder lugt gaf. Van den 21 tot den 24 hadden wy weder warme dagen, dan van den 25 tot het einde der maand was de lugt door een NW. wind merkelyk koelder.

In het begin dezer maand vertoonden zich aanstonds *colicae & cholerae biliosa*. Het galagtig coliecq wierd voorafgegaan door een langdurigen afkeer van voedsel, daarna walging, neiging tot braken, welke gevolgd wierden van scherpe en vliegende pynen in het weeke van den buik; vooral aan de regter zyde, de tong was zeer beslagen en geel, de pols snel, de dorst groot, en de huid zeer heet. Na het drinken van veel verdunnenden drank, gaf ik des avonds een braakmiddel, 't welk zeer veel gal ontlastte, wanneer de buikpyn gewoonlyk ophield, somtyds wierden 'er egter ook *laxantia* vereischt. Vrugten en verkoelende zuure dranken, waarna de zieken zeer verlangden, deden hier het oogenschynlykste nut.

De *cholera morbus* wierd even als de *colica biliosa*, door een langdurig gebrek aan eetlust en tekenen van gal in de eerste wegen voorafgegaan; waarop zwaare buikpyn volgde, welke dan in een hevige ontlasting van gal van boven en van beneden overging. Wanneer de stof niet gemak-

gemaklyk ontlast wierd, gaf ik kleine en herhaalde giften van *Ipecacoanna*, welke de pogingen der natuur ondersteunden, en hierop liet ik de lyders gedurende verscheide dagen *manna Tamarinde* of de emulsie van GRANT uit *Manna & Tartar. solubil.* bestaande, gebruiken, op deeze wyze wierd de galkoorts voorgekomen, welke ik alleen heb waargenomen, by die gene, welke tot wegneming van het boord rhabarber, versterkende middelen, wyn met caneel en ge-roost brood, en diergelyke dingen gebruikt hadden. Zeer kort daarna kreegen zy een zwelling en opzetting der maag, welke op de minste drukking zeer pynlyk was, een snelle zeer kleine pols, en groote hitte der huid. Herhaalde braakmiddelen en *laxantia* genazen deeze koorts.

Die zich onvoorzigtig aan de koude avond-lugt blootstelden en de opgeslurpte gal niet tydig door braak- of purgeermiddelen ontlasteden, kreegen een neteluitslag, puisten over de geheele huid, of ook plaatslyke roos, welke door zweetmiddelen verergerden, en meestal spoedig door een braakmiddel en daarop volgende *purgantia* herstelden. De *dysenteria biliosa* was een gewoon gevolg van een versuimde *colica biliosa*, zy was verzeld van walging, braaklust, pyn in de maag, een geelheid in 't aangezicht, beslagen tong, opzetting des onderbuiks, hitte en droogte der huid met gedurige en ydele perzingen tot afgang, waar door een weinig slymagtige dunne stof ontlast wierd. Een braakmiddel en daarna de emulsie van GRANT ontlasteden een menigte galstoffen, waarna kleine

giften *Ipecacoanna* de al te groote gevoeligheid en krampagtige zamentrekking der ingewanden wegnamen.

Gedurende dit galagtig jaarfaifoen had ik veel tuffchenpoozende anderendaagfche koortfen, welke van het begin af aan intermitteerden, de aanvallen waren hevig, de koude fterk en langdurig, de hitte zwaar en verzelde van ylhoofdigheid en zwaare hoofdpyn, de koorts vervroegde telkens twee of vier uren, het water was meest helder, ook wel galagtig en bruinrood, en zette eindelyk een zeer hoogrood bezinkzel.

Braak- en purgeermiddelen waren onvoldoende, deze koorts geheel te overwinnen, en na dat de eerfte wegen genoegzaam gereinigd waren, moest ik de koorts met de *china* wegnemen.

Onder de chronifche ziekten zag ik veel vogtige *herpes*, welke een langdurig gebruik van antimoniaal en kwikmiddelen met een *decoct lignor.* vorderde.

Het einde der maand was zeer verfchillend van defzelfs begin, dewyl 'er nu een koud regenagtig weêr met NW. wind plaats had.

De ziekten bleven egter dezelfde, en vorderden ook dezelve braak- en purgeermiddelen, alleen was het nu nodig de ingewanden door verfterkende middelen, tegens een nieuwen aanval te verzekeren.

September.

In den aanvang deezer maand was het weer koud

koud en regenagtig, en de wind W. van den 6 tot den 8 hadden wy helder warm weer met een N W. wind, de wind liep vervolgens na het Z., terwyl de warmte tot den 15 aanhield, van den 5 tot den 23 hadden wy een natte koude met W. en N W. winden, waarop een droge koude met een O. of N O. wind tot aan het einde der maand volgde.

Dezelve galagtige ziekten bleven in 't begin der maand aanhouden, ondertuffchen waren zy geenzints, zoo als dit gemeenlyk op het einde der zomer plaats heeft, met ontsteeking gepaard.

De zomer gal, welke nu nog in de lichaamen was opgehoopt, wierd door de vogtige koude meer verdikt en met flym vermengd. De stof was hierdoor trager, meer vastgehegt, en veel minder beweegbaar, zy vorderde dus een langdurige bereiding en oploffing, terwyl zy nu niet meer zich geheel en al langs den weg der ingewanden wilde ontlasten, maar na de behoorlyke zuivering der eerste wegen door het water en zweetgaaten moest ontlast worden.


De zieken, die de galkoorts hadden, gevoelden nu meer een groote zwaarte door de leden, en drukkende hoofdpyn, zy hadden een gevoel van drukking om rent den hartkolk, een drogen papagtigen mond, ydele braking, een zuivere of witte beflagen tong, een zamentrekking des buiks op de plaats van het *colon transversum*. Na het eerste braakmiddel in het begin der ziekte wierd een weinig dikke gal ontlast, doch zonder dat hierdoor de benauwdheid en walging ophield. De koorts verhefte des avonds en verminderde des morgens

gens aanmerkelyk, ja was fomtyds geheel en al tuffchenpoofende. De ziekte was dikwyls verzeld van een dunnen doorloop met veel dorst en hette, zonder verligting. Na het gebruik van openende afkookzels met *sal ammoniac* of *polychr. & oxymel*, wierd de ftof beweegbaar, en kon door een braakmiddel ontlast worden, terwyl deze zelve folverende middelen den buik genoegzaam open hielden. Hierna moest men overgaan tot zagte *diaphoretica* als *spir. Minder. Tra antimonii, sulph. aur. ant.*, waardoor de uitwasfeming hersteld, en de overgeblevene ziekte ftof gemakkelyk door een zagt zweet uitgedreven wierd.

Tegelyker tyd zagen wy *diarrheen, rheumatique* pynen, *angina serosa*, uitflag, hoest, en verkoudheden.

Na den 6, wanneer het weer weder warm wierd, herkreeg de gal weder deszelfs eerste kragt en hieruit ontftonden wederom verschillende ziekten. Veele vrouwen hadden nu sterke vlooden, welke zo wel door zuuragtige ontlastende middelen, als door *sp. vitrioli &c.* na maten der omftandigheden moesten behandeld worden.

De gal, welke door de hette fcherper geworden, en door de verwiffeling van de avond koude en de hette van den dag te gelyk dikker, nauwer met de vogten verbonden, en daarvan niet zo gemakkelyk aftescheiden was, veroorzaakte nu andere toevallen.

De geelzugt, die  vry algemeen was sproot niet voort uit een belette ontlasting der gal in de ingewanden, maar alleen uit een

eene al te groote overvloed (*polycholia*). De ziekte begon met de gewoone toevallen van koorts, verzeld met zwaare lende-pyn, de ontlasting was traag, de tong wit en flymagtig, in 't begin was 'er walging en braaklust, de pols zeer snel, en het water hoog geel, tot hiertoe was 'er geen geelzugt, maar wanneer alle de tekenen van koorts verdweenen waren, en de eetlust zich herstelde, de ontlastingen natuurlyk en met gal vermengd waren, wierd het water dik, zeer geel en gaf een geel vlokkig bezinkzel, de tong wierd geel, en de geheele huid kreeg de kleur van geel wasch. s'avonds was 'er een weinig koorts met roodheid van wezen, welke echter spoedig verdween. Deeze geelzugt was dus voor een gedeelte critisch, dewyl de natuur een gedeelte der galstof na de huid bragt en daar tragtte te ontlasten, egter was deeze *crisis* onvolkoomen, dewyl het water eveneens met gal verzadigd was. Wy leezen menigvuldige dergelyke voorbeelden by GUIDETTI en FORESTUS, welke de Heer de WIND in zyne uitmuntende verhandeling de *morbis vero et stricto sensu biliosis* breder heeft opgegeven.

By zommige bleef na een galagtigen doorloop een zekere losheid der ingewanden over, wanneer de eetlust hersteld en de gal behoorlyk ontlast was. In deze gevallen deed de *opium* met adstringerende en gomagtige middelen een uitstekenden dienst. De *dysenterie* wierd nu algemeener en was of eenvoudig, of met koorts verzeld. In het eerste geval kwam er eerst walging, gebrek aan eetlust, de tong wierd geel beslagen, hierop volgden

winden en rommelingen, gevolgd van hevige buikpynen, en looze persingen, welke zeer hevig wierden na het gebruik van warm drinken, persing op 't water, 'twelk in een zeer kleine hoeveelheid was; de stoelgangen waren menigvuldig, zeer gering slymagtig met bloed gemengd; by sommigen deed een braakmiddel veel dienst, by de meesten egter kleine giften van *Ipecacouanna* tot dat 'er een sterke walging kwam; alle verstoppende middelen en rhabarber deden kwaad, zagte emollierende, oplofende en laxerende afkookzels verligteden de ziekte; waar na de rhabarber en bittere middelen de verlooren veerkragt der ingewanden herstelden.

De *Febris dysenterica* was zeldzaamer, zy werd voorgegaan door een gebrek aan eetlust, en neerslagtigheid, hierby kwam des avonds koorts met rilling en koude, hierop volgde zwaare hoofdpyn, sterke droge hitte, een bittre smaak, loose braking, een drukking en zwaarte omtrent den hartkolk, dorst, een droge, witte slymagtige tong, snydingen in de ingewanden met persingen tot afgang, wanneer 'er slegts een weinig dikke slym ontlast werd. De persingen namen vervolgens toe, terwyl 'er intusschen telkens minder ontlast werd en de pyn vermeerderde, de verheffingen van koorts wierden in die zelve rede zwaarder, terwyl tevens de kragten verminderden en de moedeloosheid der lyders vermeerderde, de pols zwakker en snelder werd, endes nagts een vetagtig bezwarend zweet werd waargenomen. De zieke herstelde niet eer voor dat de persingen verminderden, en 'er waare galagtige stoffen genoegzaam

zaam ontlast wierden. De ziekte was over 't algemeen met een grote slaperigheid gepaard, en de lyders gevoelden zich na den slaap altyd erger. Het eerste teken van beterschap was, wanneer de zieke des nagts wel en met verligting doorfliep, en dat hy daarna zuure opspisingen kreeg, een teken 't welk HIPPOCRATES reeds had waargenomen, en 't welk ik dikwyls heb bevestigd gezien.

Ik begon in 'teerst myn behandeling met een braakmiddel, dan daar ik altyd ondervond, dat hierdoor geen verligting of ontlasting van gal volgde, heb ik deze behandeling laten varen. Zagte ontlastende middelen veroorzaakten heevige pynen, opzetting van buik en deden geen uitwerking. Ik heb my met zeer veel vrugt van *decocta Graminis* met *Tamarinde Ipecacoanna* en *senna* bediend, waardoor weinig pyn veroorzaakt wierd, en gewoonlyk zeer schielyk goede gebundene en verliggende afgangen voortgebracht wierden. Na het purgeermiddel heb ik dikwerf een opiaat gegeven, dan hoewel hierdoor de persloop voor een korten tyd bedaarde, wierd de koorts heeviger, en de ziekte altyd zwaarder, ik heb daar om alleen op 't einde der ziekte na de *purgantia* een emulsie met *syr Diacod* gegeven, waardoor de ingewanden verzagt en de ontlastingen niet te veel gestremd wierden. De *rad. arnica diarheae* welke my te vooren in het stuiten van *diarheae symptomatica* in koortzen uitnemend voldaan had, heb ik ook herhaalde reizen in de *febris dysenterica* beproefd, dan ik heb daarvan veel nadeel ondervonden, dewyl de tong droog

droog, de koorts hevig, en de ziekte erger werd, zelf heb ik op het einde dezer koorts de *rhabarber* met *arnica* altyd moeten ter zyde stellen. De *spir Minder* met *sulph. antimon aur*, of de *Tra antimoni vinosæ Huxhami* voldeden uitstekend aan het oogmerk, om den aandrang der vogten van binnen naar buiten te brengen, en om de overblyvende scherpe stoffen door een sterk bezinkzel in 't water, en een zagt morgenzweet af te voeren.

Omtrent het midden der maand hadden wy eenige waare, doch veele bastaart pokjes. De laatsten hadden weinig of geen koorts en byna geen beslag op de tong, na een gemelykheid en ongemaklykheid van 2 dagen volgde een eruptie van puisjes, welke niet van waare pokjes te onderscheiden was; dan op den derden dag stonden zy reeds te etteren, en begonnen reeds den 4den dag te verdwynen; zy hadden niet als een *Laxans* op het einde der ziekte nodig.

Op het eind der maand waren 'er veele *peripneumoniæ* en *pleuritides*, welke voor 't grootste gedeelte galagtig, doch ook sommige meer rheumatisch waren, een kleine aderlating, een braakmiddel, en spaansche vliegen deden hier de genezing af.

October.

Deeze maand begon met een schoon en helder weêr en een O. wind, welke tot den 7 duurde, wanneer wy tot den 14 NW. winden met koude regens hadden; twee dagen had-

hadden wy daarna weder ſchoon weêr met ZO. wind. Van den 16 tot den 24 hadden wy ſtorm en buyagtig weêr en veel kouden regen met een NW. W. en zomtyds ZW. wind.

Van den 25 tot het einde der maand hadden wy vorst en vry ſtrengē koude met O. en N. winden.

In het begin der maand was het getal der zieken en dooden zeer gering, en de galagtige geſteldheid ſcheen nu geheel door de invalende koude overwonnen te zyn. — Alle de ziekten waren nu rheumatiſch, vooral heerſchten *colicæ rheumaticæ*, opzettingen der halsklieren, en rooſagtige oogontſtekingen.

De *colicæ rheumaticæ* waren of zonder of met diarhé, zomtyds zonder, zomtyds met koorts verzelde. Zy wierden voorafgegaan door plaats verwisfelende pynen in 't hoofd, nek, borst, lenden, en in den rug, en zetteden zich eindelyk in den buik vaſt, vooral omtrent den navel, of ook boven het ſchaambeene, de pynen waren of hevig, en ſcherp, of dof, de tong was of zuiver, of met een dunne witte ſlymkoſt bedekt, en 'er was geen walging, dan die uit de hevige pynen in de buik door medelydenheid ontſtond, de ontlaſtingen waren of natuurlyk, of hard, doch meest zeer dun, ſcherp en ſlymagtig. Pynſtillende en zweetdryvende middelen in 't begin der ziekte gegeven, deden geen nut. Zagte en weekmakende clyſteeren ſtilden ſchielyk de pyn, terwyl rhabarber met campher en kreefts oogen zeer ſpoedig de pynen wegnamen, de *rad.*
arni-

arnica stilde vermogend den doorloop. Wanneer 'er een taaye slym vast aan de ingewanden gehegt was, welke de catarrhale stof als 't ware bevattede en ingewikkeld hield, waren zagte oplosfende middelen hier zeer geschikt, als *Manna*, *Cassia*, en alle de middenzouten.

Wanneer de *colica rheumatica* met koorts en diarhé verzeld waren, was 'er een aanmerkelijke voorraad van taaye slym voorhanden, welke door ontbindende middelen ontlast zynde, de koorts van zelf ophield. Pynstillende middelen deden hier een merkbaar nadeel. De koorts opgehouden zynde, bleven 'er zomtyds nog hevige buikpynen over, welke door *diaphoretica* erger wierden, en een verder gebruik van *laxantia* vereifchten.

Opzwellingen der onderkaaksklieren, met ontfleking van het tandvleesch waren fomtyds zo hevig, dat zy een herhaald gebruik van aderlatingen en verkoelende middelen vereifchten; wanneer eindelyk zagte laxeermiddelen, en spaansche vliegen de ziekte weg namen, terwyl 'er naderhand een overvloedig zweet en dik water geloosd wierd.

Zwellingen der *parotides*, welke weinig pynlyk en byna zonder koorts aanwezig waren, wierden meest door inwryving van *sp. C. C.* met amandeloly weggenomen. Ik heb egter nimmer verplaatfingen dezer zwellingen na de borsten en de *testes* gezien, waarvan BURSE-RIUS gewag maakt.

De *pleuritis rheumatica*, welke nu vry menigvuldig was, had in 't begin byna geen
koorts

koorts by zich, maar aanstonds een gebrek aan eetlust en mattigheid der leden met slaaploosheid, een vaste pijn in een der beide zyden, die op het leggen, zo wel als aanraken verergerde, en meestal laag omtrent de korte ribben haar zitplaats had, de zieken hadden meest een rood uitslag in 't aangezicht, de pols was vol en sterk. De aderlating deed niet te min nadeel, spaansche vliegen namen dezelve weg. De pijn weggenomen zynde, ontstond 'er een *febris remittens* met exacerbatie tegens den avond, welke egter na het toedienen van een braakmiddel door openende en laxerende dranden gemaklyk overwonnen wierd.

By kinderen de eerste weeken na hunne geboorte hadden wy een byzondere oogziekte, welke alleen de *glandula Meibomiana* scheen aan te doen. De oogleden waren zeer gezwollen en gesloten, 'er liep uit de oogen een dikke geele etteragtige stof. Nadat men eenige dagen spaansche vliegen, purgeermiddelen en weekmaakende stovingen had aangewend, slonken de oogleden van zelf, verminderde de ontlasting van etter, en men vond de oogbollen zelve volmaakt gezond.

De kinkhoest, welke hier niet epidemisch was, werd ons van Utrecht aangebragt, doch verspreidde zich niet verder in deeze maand als in de huizen, waarin zy reeds grasfeerde, alle de kinderen waren reeds in het tweede tydperk der ziekte, of hadden reeds de kinkhoest zelve, een kind 't welk van de overige besmet wierd, kreeg eerst een catarrhale hoest van 8 of 10 dagen, wanneer die in waare
kink-

kinkhoest overging. Ik merkte wel verheffing des nagts, doch niet om den anderen dag.

Zy hadden alle een onverzadelyken honger. Veeltyds was zy met lange wormen of maden verbonden. Om den anderen dag herhaalde braakmiddelen herstelden hen binnen kort. Sommige genazen alleen door het gebruik van *Ipecac. sulph. aur. ant.* en rhabarber tot dat 'er walging kwam, waardoor zagte ontlastingen onderhouden wierden.

Over 't algemeen begon zich de *constitutio atrabilaria* te vertonen door zwaarte in de leden, doffe hoofdpyn, slaaploosheid, uitslag over 't lichaam, hardlyvigheid, en aambeyen, ook zagen wy by kinderen meer wormen, als in de voorige maanden.

November.

Van den 1 tot den 5 sneeuwde het daaglyks, de wind N., van den 5 tot den 8 NW. en W. wolkig, 'smorgens dikke nevel. 9 ZW. helder, 10 regen. 11 heldere vorst met ZO. wind. 13 NW. nevelig en koud. 15 tot 20 regen met W. wind. Van den 20 tot 24 dagelyks dikke koude nevel. Van den 25 tot den 30 regen, met mist verwisfelende, over 't algemeen guur weêr, van den 15 tot het einde der maand waaide de wind altyd W.

Wy zagen nu dezelve ziekten, die wy in de voorige maand hadden waargenoomen, welke alle zinkingagtig waren, *diarrheen*, buikpynen, veele verkoudheden, *rheumatique* pynen, zo wel in de zyden als in de ledematen, zinkingagtige

agtige zeere keelen. Zy hadden deeze opvolging, dat wy in de eerste dagen met de koude N. winden veele diarheen en colicquen hadden, welke egter van pynen door de ledematen vergezeld waren. De diarhé was de hoofdziekte, waarmede zich de overige toevallen paarden. Omtrent den 5 zách men meer rheumatique hoofdpynen, roos en klieragtige opzettingen van het wesen en den hals, ontstekingagtige *rheumatismi*; de wind NW. zynde: zinkingen en ontstekingen der oogén, waren toen ook zeer gemeen. Tegens den 10 kreegen wy veele verkoudheden in 't hoofd, en op de borst, welke door de mist vooral zeer algemeen wierden. Na den 15 scheen door 't slappe en vogtige weér de zinkingstof zich weder meer op de ingewanden te plaatsen, zodat men coliquen, diarheen en moeilijke waterlofing met en zonder hoest waarnam. Kinderen en oude lieden kreegen veel geelzugt. Ook zag men veel uitflag van allerhande soort. Op het eind van November waren de bloespuwingen en alle andere bloedstortingen algemeener, en veele kraamvrouwen kregen een doorgaande koorts.

De diarheen waren flymagtig en catarrhaal zodat 'er met dezelve altoos een ophoping van flym in de eerste wegen aanwezig was, de mond was papagtig, de tong wit en met flym bedekt, de mond van de maag was pynlyk, de afgangén waren flymagtig, gering en met persing verzeld, een remitterende kleine koorts vergezelde de ziekte, met vliegende pynen, welke 't hoofd, dan wederom de ingewanden aangre-

D

pen

pen. Een braakmiddel verlichtte, maar genas de ziekte niet. Alle zweetmiddelen vermeerderden dezelve; alleen voldeden hier die ontlastmiddelen, welke de slym losmaakten, terwijl zy te gelyk den aandrang der vogten naar de oppervlakte des lichaams bragten en de nieuwe ophoping derzelve, door de ingewanden te versterken, beletteden; de rhabarber met campher en *sal ammoniac* beantwoordeden het best aan dit oogmerk. In alle ziekten was 'er niet alleen een ophoping van slym in de eerste wegen, maar vooral ook in 't bloed een byzondere dikte en slymagtige traagheid, welke zich door alle toevallen openbaarde. Hierom was ook de geelzugt by kinderen en oude menschen zeer algemeen. Deze geelzugt was ook van een geheel anderen aart dan in de maand September. Eerst gevoelden de lyders een drukkende pyn in de maag, walging, zwaarte en doffe pyn in het regter *hypochondrium* met braking van taaye slym, de pols was langzaam en traag, het water eerst dik en slymagtig. Op den derden of vierden dag der ziekte wierden de oogen en het aangezicht eerst geel, de ontlastingen waren slymagtig, hard en kleiagtig, het water werd nu ook drabbig geelagtig groen, of bruin. Een braakmiddel verlichtte in 't eerst de ziekte aanmerkelyk, zodat dikwyls door het ontlasten der taaye slym in de maag de eelust geheel hersteld werd, oplofende extracten met de rhabarber en seep ryklyk toegediend, namen de ziekte in weinige dagen geheel weg. Om de veerkragt der ingewanden te herstellen, liet ik
lang

lang—een aftrekzel van quasiehout met rhabarber gebruiken.

Geduurende den kouden en mistigen NW. wind, dien wy omtrent den 9 hadden, wierd het getal der zieken aanmerkelyk vermeerderd door de hoesten en verkoudheden. In 't begin hadden zy een scherpe hoest, met een ontlasting van scherpe stof uit den neus, die de keel ontvelde en een *angina serosa* gaf. De meeste menschen agteden deezen hoest niet, en hierdoor wierd dezelve dagelyks drooger, meer prikkelende en piepende, vooral des nagts; hierby voegde zich dan tegens den avond koorts met koude, plaatslyke pyn tusfchen de schouders, of in de zyde, die de ademhaling belemmerde, zodat de hoest by eene diepere inademing vermeerderd wierd; zy konden op de aangedane zyde geheel niet, en bezwaarlyk op den rug of agter over liggen; de pols was in 't begin klein en ingetrokken, de tong vogtig, wit, met slym bezet; de ontlasting ongeregeld, het water dik, de eetlust zeer gering. Spaansche vliegen deden in 't begin geen nut, en 'er wierd altyd een aderlating gevorderd, welke, offchoon zy weinig de pyn verligtede, egter aan het dik bloed een grotere vryheid gaf en de pols ruimer maakte.

Het afgetrokken bloed was dik en geleiächtig, zodat 'er zich byna geen wei van afscheidde, by de tweede aderlating vertoonde zich een platte rheumatische korst, die egter een weinig omgekruld was. Gewoonlyk bragt de aderlating dit voordeel aan, dat de koorts, die eerst min of meer aanhoudende was, nu sterker remitteerde, met duidelyker koude en rilling begon,

en des morgens met een sterk zuur ruikend zweet eindigde. De stekende pijn, die na dit alles voortduurde, luisterde nu na het aanleggen van spaansche vliegen, en gemeenlyk wierd de ziekte nu door een zagt uitwaasfemende behandeling weggenomen. Dit was dus een *febris catarrhalis* met een plaatslyke rheumatische pijn verbonden.

Zomtyds eindigde deeze catarrhale koorts in roos. Deeze koorts begon met koude en huivering, remitteerde des morgens met een sterk zweet, de tong was wit, de pols vol en hard; na de aderlating vertoonde het bloed zich meer ontfoken; de tweede aderlating scheen meer dan de eerste te verligten, intusschen kwam de koorts des avonds weder zonder koude, maar was meer van yling en slaperigheid verzeld. Op den vierden dag kwam 'er na een hevig acces van koorts een roofigtige opzetting van de eene zyde van 't wezen, intusschen vertoonde dezelve zich als een najaars roos, door dien de kleur van 't wezen meer geelagtig en purperverwig was, en tegelyk met het uitbreken derzelve de mond bitter en de tong beslagen wierd, terwyl de adem zeer sterk riekte, en het water een galagtig bezinkzel toonde. Den zesden dag vertoonden zich veel blazen met geel vogt vervuld, welke weder verdwynende, door een nieuwen aanval te voorschyn gebragt wierden, en de koorts zeer verligten. Ik tragte nu, door ruime ontlastingen te bevorderen, en het openhouden van een spaansche vlieg in den nek, deeze stof te ontlasten, waar door de ziekte spoedig ophield.

De

De Heer GRANT merkt te regt op, dat de koorts van deeze maand hardnekkig is, en zich niet gemaklyk laat overwinnen, by aldien 'er geen roos of intermitterende koorts by koomt.

Wanneer deeze roos een der oogen aangreep, wierd 'er een zeer moeyelyke *ophthalmia serosa* gebooren, de vaten der *albuginea* wierden zeer rood en opgezet, rondsom de *cornea* vertoonde zich een roode kring van kleine opgezette vaten, welke de randen van de *cornea* opzatteden; intusschen was de pyn en de gevoeligheid voor 't licht niet aanmerkelyk, van tyd tot tyd kwamen 'er pynlyke schoten door 't geheel oog. Na eenige dagen kwam 'er in den hoek der *cornea* een donker stipje, 't welke schielyk het geheel waterig vogt troebel maakte en als in dunne etter veranderde. Aderlatingen, spaansche vliegen, bloedzuigers, alle oogwaters &c. konden den voortgang dezer ziekte niet beletten. Sterk opengehoudene spaansche vliegpleisters in den nek, het gedurig toedienen van sterke purgantia, vooral van het *sal epshamense* tot dat 'er dunne en wateragtige stoelgangen kwaamen, en het drinken van een *decodt sarsaparilla*, bragten een dik etteragtig bezinkzel in 't water, waar door langzamerhand het *humor aqueus* weder helder wierd, 'er bleef egter nog lang een witte vlak op het hoornvlies, welke door eene zalf uit eenige greinen rood *precipitaat* en *axungia* bereid, en een *ecorce de garou* op den arm wierd weggenomen.

De borstziekten, welke gedurende de vogtige en koude W. winden op het laatst der maand regeer-

den, waren verschillende naar mate zy in verschillende gestellen voorvielen.

By volbloedige sterke bejaarde lieden heerfchte de *peripneumonia notha* van SYDENHAM en BOERHAAVE. Zy nam haren aanvang met een pynlyke gewaarwording door alle ledematen, geweldige hoofdpyn, als of het hoofd van een zoude berften, vooral vermeerderd wordende door een zware, volle, moeilyke hoest, een zwaare en moeilyke ademhaling, eene zeer ongemaklyke ligging, een witte flymige tong, gedurige flaperigheid, doch ongeruste en afgebroken flaap, een zeer waterige of dikke papagtige urine, verftopte ftoelgangen, angst en benauwdheid, walging, een volle en fterke pols, waarby nog zommige hadden een fteekende pyn in de borst. Deeze ziekte welke by BOERHAVE en SYDENHAM onder den naam van *peripneumonia notha* befchreven is, verfchilt na myne gedagten niet van de ware peripneumonie, dan in zo verre dezelve in een flymagtig geftel valt. De dikte van het bloed maakt dat het met moeite door de longen ftroomt; de koude, welke een fterkere zamentrekking der longen te weeg brengt, vermeerdert deeze moeilyke doorftirling, en hieruit ontftaat dus ligt een zamengeftelde ziekte uit flym en ontfteking, waarvan dus zo veele wyzingen zyn, als 'er gefellen gevonden worden. In fommige is de ziekte byna zonder ontfteking, terwyl by anderen de hoogfte trap daarvan befpeurd word. Men begrypt hier uit, dat men in deeze ziekte by zommigen zeer fpaarzaam moet aderlaten, terwyl by anderen

ren rykelyke en zeer dikwyls herhaalde bloedontlastingen gevorderd worden. De behandeling van SYDENHAM en BOERHAVE is over 't algemeen zeer geschikt, dan men zoude zomtyds kwalyk doen om den anderen dag een lating en een purgeermiddel voor te schryven. Daar by de eene dikwyls in 't begin een braak-en purgeermiddel de ziekte zal doen eindigen, zal 'er by den anderen meer dan eene aderlating op een dag te pas koomen. In alle gevallen zal een aderlating in het begin altoos de vryheid van circulatie bevorderen, terwyl een braakmiddel de long niet alleen, maar ook de maag en ingewanden van zeer veel taaye slym zal bevryden.

Dan, byaldien de ontsteking hevig is, is het niet raadzaam, braakmiddelen in 't begin te geven, als alleen, door het toevoegen van een weinig *Tart. Emeticus* by de *purgantia*, een zachte braking te verwekken. Zelf oordeel ik het niet zeer veilig deeze middelen te geven in sterke ontsteking, voor dat 'er ontspanning genoeg is, om door de prikkeling deezer middelen de ontsteking niet te vermeederen. In die gevallen van *peripneumonia notha*, die onder myne behandeling gevallen zyn, heb ik altyd gezien, dat de ziekte voor 't grootste gedeelte ontstekingagtig was, en daarom met zeer veel vrugt herhaald en ruim adergelaten, tegelyk ontbindende en zeer zagt afvoerende dranken gegeven, en dan eerst sterkere purgeermiddelen toegediend, wanneer de kragt der ontsteking gebroken was. Dan eerst verligten de ontlastingen de borst, endryven de slym naar beneden

den uit. Niets is na myne ondervinding schadelijker in deeze ziekte, dan het vroeg toedienen van *expectorantia*, dewyl daar door de borst meer en meer met slym vervuld, en dikwyls een stikking gedreigd word. Spaansche vliegen in 't begin der ziekte aangelegd zyn even eens nadelig; hierdoor worden de vogten nog meer naar de borst toegeleid. Wanneer door een zwakheid der longen, of een alte grote zamentrekking derzelve de ophoesting op eens ophield, vond ik, dat een kleine aderlating en het aanleggen van spaansche vliegen op de borst en aan de beenen, dikwyls den lyder uit het grootste gevaar reddeden. Nadat het bloed door behoorlyke ontlasting genoegzaam gezuiverd was, deden de *gummi ferulacea* met *kermes minerale* of *sulph. aur. ant.* de overblyfsels der ziekte door een heilzame ophoesting, schielyk verdwynen.

In tegenovergestelde droge inflammatoire gevallen had deeze ziekte een geheel anderen loop. Zy begon met koude en rilling en stekende pijn in de zyde op de hoogte van de valsche ribben, de zieken konden op beide zyden gemaklyk liggen; de pijn vermeerderde by de inademing, maar vooral door 't hoesten, de hoest was zeer droog en gedurig, 'er volgde brandende hitte met een snelle ingetrokkene pols. De tong was aan de randen vogtig en wit, in 't midden bruin en droog, 'er was walging en braking van slymagtige gal, het weezen was niet rood noch opgezet. Wy nadden hier een zamenloop van ontsteking en *faburra gastrica*, hierom liet ik in 't begin een

een aderlating doen, waar door aanstonds de sterke pijn verdween, doch de benauwdheid aanhield, ik liet daar op een resolverende drank toedienen met een weinig *Tart. Emetic.* waarna een ontlasting van zeer veel kwade stoffen van boven en van onderen volgde. Het bloed was zeer ontstoken, en hierom werd de aderlating herhaald, vooral omdat de hoest hevig aanhield en de ophoesting bloedig was. Wanneer op den derden dag de pijn en hoest wederkeerden, liet ik voor de derdemaal aderlaten, hier op volgde gewoonlyk meer verligting, en de ophoesting schein nu meer gekookt, intusschen bleef de koorts met verheffing des avonds aanhouden. Het voor de derdemaal afgetapt bloed had een platte rheumatische korst. Ik liet om die reeden aanstonds spaansche vliegen aanleggen op de zyde, waarna de koorts spoedig ophield, en gekookte met bloedstrepen gemengde fluimen gemaklyk ontlast wierden. Gedurende de geheele ziekte zorgde ik, dat de buik ruim werd opengehouden.

Deze *pleuritides* waren dus zamengesteld uit het ontstekingsagtige en zinkingagtige en van een verzameling van bedorven stoffen in de eerste wegen vergezeld (*pleuritis inflammatorio-saburrali-catarrhalis*).

Veele hevige rheumatique pynen in de borst, verdroegen aanstonds herhaalde spaansche vliegen, zonder aderlating, doch vorderden tevens ruime ontlastingen.

De pleurissen, die wy doorgaans hier te lande ontmoeten, of schoon zy in 't eerste begin

hevig ontstekingsagtig fchynen, hebben egter altyd tekenen van zinkingagtige fcherpte by zich. Zeldzaam is de tong zeer droog, en meest kunnen zy op de aangedane zyde niet liggen. Men denke egter niet, dat men hierom aanftonds fpaanfche vliegen moet aanleggen. Ruime aderlatingen en een ontstekingswerende behandeling worden zoo lang vereischt tot dat de korst van het afgelaten bloed geheel plat is, en de pols merkelyk van zyn eerfte hardheid verloren heeft. Als dan heb ik altyd waargenomen, dat fpaanfche vliegen, zelf wanneer de koorts nog aanhoudend en de pols zeer snel was, niet alleen de pyn, maar ook de koorts, door de ftof na buiten te lokken, wegnamen.

Vrouwen van een volbloedig en flap geftel hadden nu bloedfpuwing met een inflammatoire koorts, waarin fterke aderlatingen en een zeer ontstekingswerende behandeling gevorderd wierden.

Te regt merkt de Heer STOLL aan, dat in de flappe winters zeer dikwyls flappe geftellen waare ontsteking ziekten krygen, terwyl fterkere menfchen voor dezen prikkel ongevoelig zyn, en daardoor niet aangedaan worden.

Reeds voor twee jaaren was my de *cortex angusturae* ter beproeving door den Heer MARCARD uit Engeland medegebragt, ik had dezelve flegts eens doch met oogenschynlyk gelukkig gevolg in een chronifche *diarhé* toegediend. Ik had nu gelegenheid dezelve in een *diarhéa symptomatica* te beproeven in het laafte tydperk der tering. Ik liet aan deze lydereffe daarvan driemaal daags 10 greinen in poeder toedienen met dit uitfteekend gevolg, dat daardoor de *diarhé* wel-

welke na geene andere middelen luisterde, zeer spoedig wierd weggenomen.

In trage en koude gestellen, was een taaye en dikke slym en zwartgallige gesteldheid aanwesig, die wy te vooren (Ao 1788.) beschreven hebben. Ook waren 'er veelen, die chronische uitlagen hadden, waarin slymbreekende *laxantia* den meesten dienst deden.

December.

Deze maand is in 't begin buiten gemeen zagt geweest, zoodat wy van den 1 tot den 6 zagt regenagtig weer met W. wind hadden. hierop volgde helder weer met vorst en O. wind, den 8 was het dooy weer en regenagtig. Den 10 smeltende sneeuw. Den 11 N. wind en vorstig. 12 O. wind met sneeuw, van den 13 tot den 16 ZO. en ZW. winden met zagt weer. Van den 16 tot den 23 des nagts vorst, doch door den dag helder en schoon weer met een O. of N. wind. van den 23 tot het einde der maand storm en buiagtig met veel reegen en een veranderlyke W. ZW. of Z. wind.

In 't begin der maand, hadden het zwakke lieden het ergst, en zukkelden aan catarhale en slymagtige ziekten. Hoesten, instoringen van tuschenpozende koortzen, *lumbago*, rheumatique pynen, maagpynen, coliquen, kramphoesten waren meest al de gewoone ziekten.

Na den 6den zagen wy rheumatique ziekten met ontsteking gemengd, zinkingagtige pleurissen, zeere keelen, catarhale met ontsteking

gemengde koortsen, zeer moejelyke waterlofing, zinking pynen.

Den 16de Beroerten, vloeden, bloedspuwingen, walgingen, hevige *rheumatismi* en oogziekten.

Den 24 paarde zich met de ziekten meer slym; slymhoeften, roos met slym, coliquen, maagpynen, zwellingen der oorklieren.

Veele kinderen hadden geelzugt, wierden door braakmiddelen van veele taaye slym bevryd, en herstelden door ontbindende zouten en zagte laxeermiddelen.

De catarhale koortsen, of verkoudheden met koorts gepaard, die wy menigvuldig omtrent den 8 waarnamen, begonnen met huivering, of verwisselingen van koude en warmte, welke s'avonds erger wierd, de huid was heet en droog, de pols snel en zelden hard, de ademhaling gemakkelijk, de hoest was kittelende en gedurig den lyder afmattende, of geheel droog, of met een uitwerping van zeer dunne en schuimagtige slym, 'er was altyd een prikkelende gewaarwording in de keelen onder de *procesfus ensiformis* van het borstbeen, by sommige was een zinkingagtige zee-re keel, by anderen tand of oorpyn. De hoest was vooral des nagts door het liggen en de warmte van het bed zoo ondraaglyk, dat de zieken het in het bed niet konden houden, de tong was wit, vogtigen papagtig, het water dik en drabbig. Zommige braakten een dikke taaye slym en waren daardoor zeer verligt. In het begin (*in statu morbi crudo*) deed de aderlating nut, en het bloed was met een ligte ontsteeking korst bedekt, de slym wierd na dezelve meer ont-

ontwikkeld, zoodat zy gemaklyk door een braakmiddel konde ontlast worden. Alle olie en slymagtige middelen, en borstdranken verergerden den hoest, *Ipecacuanna* en *kermes* waren vooral nuttig, omdat de geringste gift daar van altyd een heilzame braking te weeg bragt. Zagte smeltende afvoerende dingen, als *manna*, rhabarber en middenzouten waren tot het zelve einde dienstig. Maar wanneer de hoest meer chronisch wierd, nam zy de gedaante van een maaghoest aan, kwam met accessen en verergerde na den eeten. *Opium* met cachou, yslandsche mosch en de *polygala amara* met koortsbast voldeden dan uitnemend.

Omtrent het midden van December, wanneer het weer vorstig en koud was, paarde zich de zinkingagtige stof meer met ontsteking, zo egter, dat by allen een galagtige stof in de eerste wegen gevonden wierd. De *anginae inflammatorio-ferosa* waren nu zeer algemeen. Een ruime aderlating, geschikt naar de kragten en de omstandigheden der lyders bragt veel verligting aan, en het bloed was zeer ontslooken. Daar de tong zeer beslagen en geel de smaak bitter en de urine dik geel en troebel was, toonde dit de noodzakelykheid der *emeto-catarctica* aan. Deze een en andermaal herhaald zynde, wierd de ziekte of geheel weggenomen, of ging in een algemene *rheumatismus* over. Deeze *rheumatismus* verdroeg geen spaansche vliegen, maar in 't begin aderlatingen, waarna een braking van zelf aankwam, die een menigte gal en slymagtige stoffen

fen ontlafte, en de ziekte onbegrypelyk verlichtede. Kleine giften van *Tart Emeticus Ipecac.*, & *Sulphur. aurat.*, veroorzaakten in 't begin zagte en gemakkelyke brakingen, en daarna een verliggend zweet.

De maand ten einde lopende, wierd het weer zeer koud guur en regenagtig. Hier door wierden de vogten verdikt, de eerste wegen verzwakt, de omloop des bloeds door het gestel der poortader vertraagd, de slym, welke in de ingewanden nestelde, vooral by zittende en werkende menschen meer vastgezet. Het bloed het welk in de groote takken der ingewanden traag bewoogen en opgehouden wierd, belette de wederkeering van 't bloed naar de rechter holte van het hart, en de uitgang uit het linkergedeelte, hierdoor ontstond een ophoping van bloed in het hoofd en in de borst, en veroorzaakte by sommigen gevaarlyke toevallen, welke moeilyk konden weggenoomen worden. By andere veroorzaakte dezelve taaye slym chronische uitflagen, welke alleen door het behoorlyk ontlasten der ingewanden en buiksvaten konden hersteld worden.

De zwellingen der *parotides* by kinderen; waren algemeen, in een jongeling van 17 jaaren zag ik eerst de eene, vervolgens de anderen *parotis* opzwellen, den derden dag was ook de *glandula Thyreocidea* zoo opgezet, dat het een kropgezwel geleek, een verwarmende pap, en een *decoct. aperiens laxans.* genas hem in zeer weinig dagen.

L Y S T

D E R

G E S T O R V E N E N

In 's GRAVENHAGE

I N D E N J A A R E 1791.

<i>January</i>	.	.	.	134
<i>February</i>	.	.	.	87
<i>Maart</i>	.	.	.	73
<i>April</i>	.	.	.	96
<i>Mey</i>	.	.	.	91
<i>Juny</i>	.	.	.	90
<i>July</i>	.	.	.	78
<i>Augustus</i>	.	.	.	95
<i>September</i>	.	.	.	101
<i>October</i>	.	.	.	63
<i>November</i>	.	.	.	97
<i>December</i>	.	.	.	99
<i>Totaal</i>				<hr/>

1104

WEERS.

WEERSGESTELDHEID

EN

ZIEKTEN

VAN

's GRAVENHAGE,

van 't Jaar 1792.

January.

De maand van January was zo veranderlyk, dat wy geen twee dagen hadden zonder aanmerkelyke verandering in den dampkring te ondervinden. Van den 1 tot den 3 hadden wy Z, ZW. en W. wind met mist en regen. Den 4 N. wind met heldere vorst. Van den 5 tot den 8 mist en Z. wind. Den 8 heldere vorst. Den 9 regen met ZW. wind. Den 10 smeltende sneeuw, de wind N. Den 11 heldere vorst. Den 12 en 13 sneeuw met W. en NW. wind. Den 14 ZO. wind, helder en vogtig. Den 15 zagten regen met ZW. wind, tot den 18, wanneer wy mistig weêr hadden met vorst, de wind N. en NW. Den 21 en 22 bleef het weêr helder en vorstig, de wind ZO. Van den 23 tot het einde der maand was het weêr zeer zagt, regenagtig en stormig met ZW. wind.

Het

Het getal der zieken was in 't begin van January aanmerklyk groot. Het flappe weêr verzwakte het lichaam, maakte de spysvertering gebrekkig en de uitwaasfeming ongeregeld, hierdoor heerfchte er een flymagtige gefteldheid, waarmede zich een *faburra biliofa* paarde. Hieruit ontftond die koorts, welke SYDENHAM en GRANT de winterkoorts genoemd hebben, en die uit de dikte der vogten, een te groten toevoer van flym na de ingewanden, en een ophoping van bedorvene ftoffen in de eerfte wegen, gebooren word.

De zieken klaagden over zwaare hoofdpyn, duifeling, walging, braking, benauwdheid omtrent den hartkolk, fmaakloozen mond of bitteren fmaak, verwiffelingen van koude en hitte, pyn door armen, beenen en de lendenen, traage buikfontlafing, zy ylden zeer ligt, het wezen was rood en zy zweeteden fterk zonder verligting, de tong was met een dikke witte flym overtoogen, het water of rood of dik en troebel, de koorts verhefte des middags of na den eeten: 'er was geen *crifis*, als alleen een *crifis partialis*; en de ziekte fchikte zich langzaam, en zeer ongelyk tot beeterfchap, wanneer 'er een dik zetzal in 't water befpourd wierd. Eene aderlating, waardoor een dik en met een rheumatifche korst bedekt bloed wierd afgetapt, een braakmiddel, en vervolgens openende en verdunnende dranken met fpaanfche vliegen, waren hier de veiligfte hulpmiddelen. Met deeze koorts was dikwyls een plaatslyke zinking gepaard, welke de ziekte als door een foort van *crifis* fcheen te fcheiden, een zwel-

E ling

ling der oorklieren was vooral hier in zeer gemeen, en gemeenlyk zwol eerst de eene, vervolgens de andere en eindelyk de strottenhoofdklieren, wanneer de ziekte tevens wierd weggenomen: verzagtende pappen en laxermiddelen deden deeze klieren zonder suppuratie verdwyuen. — Eveneens scheidde de ziekte zich door een opkomende zinkingagtige zeerekeel.

De zinkingagtige oogzicktens, of schoon niet zeer pynlyk, maakten ligt kleine zweertjes op de *albuginea*, welke hardnekkig zynde, dikwerf door het lancet moesten geopend worden, de vaten der *albuginea*, waren *variceus*, de oogen liepen van eene scherpe weifstof over, egter waren zy voor 't licht niet zeer gevoelig. Deeze ontsteeking in 'teene oog geneezen zynde, ging ligt tot het andere over. In 't begin wierden aderlatingen, bloedzuigers, en spaansche vliegen aangelegd, en uitwendig zamentrekkende *collyria* uit het *vit. alb. serum aluminosum &c.* op het oog gelegd, terwyl inwendig om den anderen dag een afleidende purgatie uit *sal. epsk.* of *sal. glaub.* wierd toegediend. Des avonds appliceerde men op 'toog, of het gewoone *ung. oculare*, of de roode præcipitaatzalf, uit een *Dr. axungia* en 1 of 2 gr. præcipitaat bereid. De roode præcipitaat deed in deze chronische oogontstekking zeer veel nut, en trok de uitgezette oogvaaten uitnemend zamen.

In een persloop, die zeer lang geduurd had, en na generhande middelen wilde luïfteren, schreef ik de *cortex angustura* met zeer veel vrucht voor. Ik heb dezelve met een even gelukkig gevolg in een anderendaagsche koorts, en

en in een maagpyn, welke tegens alle andere middelen hardnekkig bleef, toegediend. Dit middel fchynt, behalven zyne verfterkende kragt, iets krampstillends te bezitten, 't welk ook eenigzins door den finaak, die iets na de *Ipecacuan-na* gelykende heeft, word aangewezen.

Van den 10 tot den 15 hadden wy een vry fterke vorst met sneeuw. De catarrhale koortfen waren nu meest zuiver of met een weinig ontsteking gemengd, rheumatique pleuriffen, coliquen, en verkoudheden &c. vereifchten meest na een kleine aderlating, ('t bloed was met een platte korst voorzien) *emollientia* en zagte *diaphoretica*; wanneer 'er een plaatslyke pyn by was, fpaanfche vliengen.

Veele kinderen, die te voren kinkhoest gehad, en daardoor zwakke longen hadden, wierden op dezen tyd door ftikzinkingen aangetast: het warm bad, een fpaanfche vlieg op de borst, en een mixtuur van *oxym scillit* en *kermes miner* voldeed over het algemeen het best: by een kind wierd egter een aderlating gevorderd; de clyfteeren deden in deeze ziekte ook een zeer voortreffelyke uitwerking.

Vanden 15 tot den 18 was het weer zagt, en nu zagen wy veele verkoudheden, en catarrhale koortzen met een flymagtige gefteeldheid.

Op den 18 kreeg ik een hevige *pleuris* by een jong en fterk mensch, by wien den eerften dag alle teekenen van galkoorts waren, die egter den volgenden dag verdwenen, wanneer de ziekte volkoomen ontstekingagtig was. Door herhaalde aderlatingen de ontsteking gebrooken hebbende, onderhield ik door clyfteren en *laxantia*

zagte buiks ontlastingen. In 't begin was het bloed zeer ontstoken, naderhand rheumatisch, wanneer ik met vrugt spaansche vliegen liet aanleggen. De ziekte scheidde zich eerst door ontlastingen, daarna op den 9 dag door een zeer dik etterig water, zonder eenige fluimloozing. Op den 15 dag kwam 'er een *furunculus* op de borst, en hy genas zonder eenig overblyfzel van ongemak.

Van den 19 tot den 22 hadden wy wederom vorst; duizelingen, zuifingen der ooren, stuipen, zenuwaandoeningen, bloedspuwingen, en uitflagen, waren nu de heerschende ziekten.

Den 22 volgde 'er wederom slap vogtig weêr, en nu waren 'er veele slymkoortsen, waar van een reeds den 6den dag dodelyk wierd. — Zonder voorafgaand ongemak begon de ziekte met een koude rilling, slaaprigheid, duifeling en zwaarte in het hoofd, hier op volgde roodheid van 'twesen en hitte zonder zweet. Den volgenden dag keerde de koorts weder, maar gepaard met walging, bitteren mond, een vuile tong, benauwdheid, en alle andere teekenen van turgerende stof naar boven, vooral byaldien 'er een aderlating gedaan was. Zommige hadden een hoest, die vooral den slaap belette. De ontlasting van veele taaye slym door een braakmiddel, het openhouden van den buik door purgeermiddelen, en daarna een dik rheumatiesch water, genas ze allen.

Zelden wierden sterke mannen, maar alleen vrouwen en kinderen door deze ziekte aangetast. Kinderen en jongelingen hadden ook nu meer waare ontstekingsagtige pleurissen, welke door a-

der-

derlatingen en verkoelende middelen gered wierden.

Zwangere vrouwen kreegen na hevige colicq pynen miskramen, die niet waren voor te komen.

Kraamvrouwen wierden ook ligter door buikpyn en diarhe aangetast, welke door pappen, emollierende dranken, clysteren, en zeer vermoogend door kleine giften van de *Ipecacuanna* gestild wierden.

Op 't eind der maand mengde zich meer gal met deze slymziekten, dewyl nu het weer byzonder warm was; hierom waren de netelroos, scheelehoofdpyn, rheumatique pynen, oogontstekingen meer galagtig, verdroegen geen zweetmiddelen, maar vorderden braak- en purgeermiddelen. Hierom werd de *febris erysipelato-sa* zelve door in 't begin een braakmiddel, en naderhand door zuure dranken met fenne aanzet, en door een kunstige diarrhe spoedig geneezen.

February.

De maand van February was over het geheel regenagtig, 'er waaide meest een ZW. wind. Van den 3 tot den 5 W. van den 6 tot den 8 ZW. van den 9 tot den 11 ZO, mistig en koud. Van den 11 tot den 15 was de wind W. met zagten regen, van den 15 tot den 18 hadden wy zulk een sterken vorst en sneeuw, dat alles daar mede dik bedekt was. 19 helder weêr met O. wind, den 21 sneeuw, N wind. 23 ZO. wind, heldere
E 3 vorst

vorst. Den 25 kreegen wy een zagten dooy met W. en ZW. wind tot aan het eind der maand.

Met het begin van February, waren 'er veel *febres pituitoso-biliose*, welke eenige dagen geduurd hebbende, meer catarrhaal wierden.

'Er waren veele *rheumatismi acuti* met tekenen van onreinheid in de eerste wegen. De ziekte nam haren aanvang met koude, daarna hitte en styfheid der ledematen. Het zweet vermeerderde de zwelling en pynlykheid der geledingen. Het water zette een vioolkleurig dik bezinkzel. Een of meer aderlatingen, waar door een dik en met een rheumatische korst bedekt bloed werd ontlast, verligteden de zieken. Door openende afkookzels met tamarinde en *sal glaub.* werd veel galagtige slym ontlast. Na genoegzame aderlatingen en ontlastingen, deden juleppen van *sp. minder. sp. Nitr. dulc.* met *laud. liquid.* nut, waar op de *sulph. aur. ant* met *camphor* en *opium*, tegelyk met een sterk afkookzel van den klittenwortel, met het beste gevolg gegeven wierden.

By een man van 50 Jaaren kwam een kwaadaartige koorts met zwaare benauwdheid, welke van zulk een menigte *anthraces*, welke als pestkolen waren, verzeld wierd, dat hy daar aan, na eenige weeken stierf.

Wanneer omtrent den 8 de wind N. wierd, zettede zich de catarrhale stof door de belette uitwaasfeming op de ingewanden, hieruit ontstonden veele *Colicae rheumaticae*. Zy begonnen

nen als gewoonlyk met vliegende pynen door de leden, die zich of paarden, of eindigden met fcherpe pynen in de ingewanden, welke door alle voedzel en vooral door warme dranken heviger wierden. De verzellende koorts was remiterende, en des nagts, en in 't bed erger. De afgangen waren of hard, of wierden door de ligfte prikkeling van *rhabarbarina* dun, pynlyk, en met persfingen verzeld; de pyn verbreidde zich tot de blaas, en 'er ontftond een pynlyke waterlofing, zo dat alle oogenblik de zieke met zeer veel pyn een weinig hoogrood water loofde. Zeer veel verdunnende dranken, kleine giften *opium*, *clysmata emollientia*, fpezeryagtige ftovingen des onderbuiks, en het vryven des buiks met het *linimentum opodeldoch* van den Heer VAN DER HAAR deden hier veel nut.

By sommigen was een zamenloop van galagtige ftoffen, die door braakmiddelen moesten ontlast worden.

Wanneer de wind wederom na het weften ging met warmen regen, veroorzaakte dit vele verkoudheden, welke offchoon zy meest *faburraal* fchenen te zyn, egter in 't begin geen onduidelyke kenmerken van bykomende ontfteking toonden.

Zy begonnen met een langdurige fterke koude, met inwendige rilling, verwarring der zinnen, yling, dorst, zwaare hoofdpyn, een witte flymagtige tong, walging, bitteren fmaak, en een zeer dik water. Een aderlating, een braakmiddel en daarna herhaalde *laxantia* namen deze ziekte weg.

In deeze koude dagen waren 'er veele *pleuritis rheumatico-inflammatoria*, *parotides*, *angina catarrhales*, *cephalea rheumatica*, uitslag en *peripneumonia notha*. Kraamvrouwen hadden veel geerst uitslag.

De uitbötting der tanden by de kinderen was moeilyk, en met ontsteking, stuipen, hoest, zuur en andere zwaare toevallen verzeld. In deze toevallen deden de *flores zinci* wonderen. De *flores zinci* heb ik lang en menigvuldig gebruikt voor dat ik daar van eenige uitwerking gezien heb; ik zag egter met verwondering, dat de *luna fixata* van LUDEMAN in die gevallen wonderen deed, en de stuipen bedaarde, waar in ik te vergeefs de *flores zinci* beproefd had, ik dagt dus eerst, dat de Heer GAUBIUS te onregt de *luna fixata* voor *flores zinci* hield. Dan by naaukeuriger onderzoek vernam ik, dat LUDEMAN altyd zeer zorgvuldig belaste, zyne poeiers met sulker vermengd, droog in den mond te laten stroomen, en een half uur voor en na dezelve de kinderen niet liet zuigen. Dewyl ik begreep, dat even als de *flores zinci* in roos en uitwendige ontsteking der huid, de hitte matigen, en de huidkramp wegnemen, dagt ik dat veelligt de plaatslyke aanbrenging dezer bloemen op de gevoelige tepeltjes der tong mooglyk een antispasmodische werking langs het geheele zamenstel zoude kunnen verspreiden, welke door dilutie met water of eenig ander vogt wierd weg genomen, en dat de zinkbloemen byzonder nuttig konden zyn, wanneer zy plaatslyk aan het ontstoken tandvleesch wierden aangebragt. De

on-

ondervinding heeft deeze gissing volkomen bevestigd, en zedert ik de zinkbloemen den kinderen droog toediene, heb ik genoegzaam altyd daar van in stuipen de schoonste en een meest onmiddelyke uitwerking gezien. Zedert het berigt in de vaderlandsche letteroeffeningen omtrent de bereiding van LUDEMAN van dezen metaalkalk, heb ik ook altyd dezelve laten afwasfen, en gezien, dat daar door aanmerklyk de braakverwekkende kragt gebroken wierd.

Men zorge egter altyd, dat men zuivere en wel gebrande zinkbloemen hebbe, dewyl ik meermaalen ondervond, dat de met kryt of op eene andere wyze vervalschte kalk geen uitwerking deed, en dat ik zeer wel slaagde met die zinkbloemen, van welke ik overtuigd was, dat zy wel waren toebereid.

Wanneer op het eind der maand het weêr droog wierd, vermeerderde het getal der zieken aanmerklyk; 'er waren veel verkoudheden, en zinkingagtige zeerekeelen, maar vooral heerschte 'er een *colica rheumatico inflammatoria*, waar in de pynen ondraaglyk waren, alle tekenen van onreine stoffen in de ingewanden waren hier afwezig, de koorts was zeer hevig, en de pols zeer zamengetrokken, herhaalde aderlatingen, en spaansche vliegen op den buik deden hier de beste uitwerking. Ik beschouwde deze ziekte als een roofagtige aandoening der darmen, en hierom waren de spaansche vliegen, welke de zinkingagtige stof na buiten bragten, hier zeer voordeelig.

Maart.

Het weêr was in het begin der maand zeer veranderlyk en regenagtig, de wind was W. ZW. NW. van den 7 tot den 14 kregen wy een strenge vorst met sneeuw, hierop volgde een malsche regen tot den 20, die weder door een koude heldere lugt met een N. wind vervangen wierd. Dit weêr duurde tot den 31, wanneer het weêr weder zagt wierd, terwyl de wind na het westen liep.

In de maand Maart zagen wy veele chronische ziekten by zwakke en slymagtige menschen, als *amenorrhœa*, *leucorrhœa*, zenuwtoevallen, slym en maaghoesten. De koortsen waren alle van een slymagtigen aart. Veele kinderen hadden stikzinkingen.

Na den 7 verminderde het getal der zieken langzamerhand, hoewel sommige door de schieleke verandering van lugtgesteldheid hardnekige en zwaare verkoudheden kregen, die, met ontsteking verzeld, aderlatingen vorderden.

Na dat de koude weder schielelyk tot een natte warmte overging, zagen wy veele zinkingagtige pleurissen, en rheumatique pynen.— De overgebleevene ontstekingagtige gesteldheid des winters, voegde zich nu dikwyls by de slym der lente, en veroorzaakte by bejaarde lieden een *peripneumonia notha*, welke in 't begin aderlatingen en purgeermiddelen, en daarna *oxym. scillit.* en *expectorantia* vereischte.

Een ongetrouwde Juffrouw van in de veertig jaren kreeg, ongeveer ses jaar geleden he-

vige tandpyn in de regter bovenkaak, en liet zich daarvoor een kies trekken, van dien tyd af aan gevoelde zy geduurige hevige pynen, welke als een bliksemstraal door de bovenkaak schooten, zich verspreidden door de slaap van het hoofd, en eene onwillekeurige zamentrekkende beweging van de spieren van het aangezicht der aangedane zyde veroorzaakten.

Deze schoten, die verschriklyk pynlyk waren, duurden slegts eenige minuten, dan langer dan korter, en hielden dan wederom voor eenigen tyd op. Zy was genoodzaakt om zo dra zy deeze pyn gevoelde, haar neusdoek na den mond te brengen en de kaak te vryven, 't welk haar eenige verligting schein toe te brengen, en hier door was de kaak zodanig rood en glad gevreven, dat zy 'er als rood turks leer uitzag; des nagts was zy veelal vry, doch ontwaakte somtyds schielyk uit den slaap, en moest dan overeind zitten en de pyn door vryven verdryven. De lichtste oorzaak en beweging der kaak bragt deeze pyn te weeg, vooral het kaauwen en spreken, zelf somtyds een schie-lyk op de kaak vallende zonnestraal. Het bed, en de verwisseling van koud of warm weêr hadden op de pyn geen invloed. Zy at smaaklyk, doch was dikwyls verstopt van buik, hare *mensjes* waren ongeregeld, en zy was van een zwaarmoedig en zwartgallig temperament. Zo als het met diergelyke zieken gaat, waren alle geneesheren geraadpleegd, en alle huismiddelen, zonder het minste effect gebruikt. Ik gaf haar, toen ik voor de tweede keer van haar geraadpleegd wierd, kwik met *opium*, welke eenigen invloed op

op de pyn fchenen te hebben, ten minften wierden de aanvallen daarvan minder. Ik was genoodzaakt deze middelen ter zyde te zetten wegens een verkoudheid, waar van zy vry hevig wierd aangetast, verzagtende en inwikkelende middelen fchenen den hoest en bykomende koorts te verminderen, na dat ik haar 'savonds vry wel verlaten had, zo dat zymy zelf tot aan de deur van haar kamer bragt, wierd zy in haar bed des morgens dood gevonden. Uit den mond liep een etterige stof, en het lyk rook reeds zeer fterk den volgenden dag.

Deze ziekte is ongetwyfeld dezelve welke SAUVAGES onder den naam van *trismus dolorificus* en FOTHERGIL onder dien van *dolor maxillæ* befchreven heeft. FOTHERGIL zag daarvan flegts zeer weinige voorbeelden, en THILENIUS getuigt, dezelve maar tweemaal gezien te hebben.

VOGEL, (*manuale t. II.*) noemde ze *rheumaticus dolor maxillæ*, en geeft daar van eenige voorbeelden op. Dan de Heer PUYOL heeft die ongetwyfeld het best en naukeurigst befchreven, in zyn werkje *sur le tic douloureux*. By BLUMENBACH (*med. biblioth. 2 b. 1 ft. p. 146*) LENTIN (*beytrage zur aufubend. arzneykunst p. 334*) BALDINGER (*Medicin. Journ. 7 ft. p. 55* en *neues magaz. fur artze t. IX. 1. ft.*) SAUTER (*musæum helv. t. 1.*) BLUNT (*London Med. Journal ann. 1786. p. 46*) en RAHN. (*mus. helv. t. 1. p. 302.*) vinden wy daarvan verfchillende en zeer leezenwaardige voorbeelden.

En ongetwyfeld zouden wy daarvan meerder

der waarnemingen hebben, byaldien men dit gebrek niet voor een hardnekkige rheumatique pyn gehouden had. Het is hier de plaats niet, dit gebrek uitvoerig te behandelen, 't welk ik egter nader in een ander werk doen zal, ik zal hier alleen aanmerken, dat deze ziekte uit verschillende oorzaaken voortkoomt, en dus ook een verschillende geneeswyze vordert.

Intusschen moeten wy met LENTIN zeggen, dat het een ongemak is, 't welk tot nog toe verre van altyd te kunnen genezen worden, somtyds de kragtigste geneesmiddelen weerstaat en daarom alzints de oplettendste aandagt der artzen vordert.

Offchoon ik met FOTHERGILL geloof, dat dit gebrek veelmalen in vrouwen, by welke de *menfes* zyn opgehouden, en dispositie tot *cancer* hebben, voorkoomt, en zeker veel overeenkoomt met die hardnekkige rheumatique pynen, die by zwartgallige vrouwen op dien tyd worden waargenomen, en die ik geloof van eene stof, die met de *carcinomateuse* stof *analogie* heeft, af te hangen, denk ik egter niet dat dit altyd de oorzaak is. Immers is dezelve ziekte ook by mannen waargenomen, en door geneesmiddelen genezen, welke op de kankeragtige stof geen werking doen. Na het my voorkoomt, is 'er een aanmerkelyk onderscheid tuschen de *dolor maxillaë*, die idiopatisch is, en die, welke uit een verstopping der ingewanden, en dus door sympathie geboren word.

FOTHERGIL genas de zieken door *cicuta*; by anderen deed dezelve niets af; sommige herstelden door de *bella donna*; andere door oplos-

lofende middelen; andere wederom door kwik en een sterke falivatie. Ik meen zoo wel de idiopatifche, als nu onlangs ook de fymptomatifche *dolor maxillae* te hebben waargenomen: beide myne lyders ftierven, ondanks alle aangewende middelen, aan dit hevig en verfchriklyk ongemak.

Den 20 volgde, op een zeer warmen dag, een ftrengte koude, hier door verloor ik een vrouw, die een ontftekingagtige buikpyn kreeg in 24 uren, na dat zy een meenigte fcherpe bloedige ftof door den afgang was kwyt geworden. — Zommige ftierven aan beroerte, terwyl 'er veele door duifeling en hoofdpyn aangetast wierden.

De geheele maand door, leden de kinderen door de groote veranderingen der lugt, meer dan naar gewoonte. --- Gedurende eenige dagen fchenen zy een verkoudheid te hebben, zy hoefden, en hadden een belemmerde ademhaling. Na dat dit eenigen tyd geduurd had, wierden zy door een hevige koorts met een ftekende pyn in de zyde aangetast, welke noch door aderlatingen, noch door fpaanfche vliegen verminderde, het bloed was ook byna niét ontftoken. De koorts verhefte geregeld des middags en des avonds, weldra voegden zich hier by ftuipen en trekkingen, welke tot flaapzugt overgingen, zommige kinderen lagen met ongevoelige opene oogen twee en meer dagen lang, de ademhaling was natuurlyk, de pols snel, by anderen zeer langzaam, de buik was zeer hard en opgezet, by de meeften was een doorloop, by zommige een hardnekkige buiksver-

verstopping , weldra beschoude ik toen de ziekte als een wormkoorts, en gaf *calomel*, *sal ammoniac* met *cremor tartari* en clysteren van een aftreksel van *tanacetum*, *santonie*, of *semen sabadilleos*, tusschen beide gaf ik sterkere *purgantia*, en hier door wierden niet alleen wormen, maar ook een menigte glasflym geloosd, waarna de kinderen zeer spoedig herstelden.

April.

Het weer was met den aanvang der maand regen- en stormagtig, de wind NW. Den 8 volgde er een heldere zuidelyke aangenaame warmte. Dit weer wierd op den 11 en 12 iets koeler. Van den 14 tot den 17 kwam 'er een O. wind met koude, dan op den 17 wierd de wind ZO, en het weer regenagtig en zoel, hierop volgde den 19 een N. wind met ruuw en nat weer. Op den 21 kreegen wy een schielijke sterke vorst, waardoor niet alleen de opene bloesems afvielen, maar zelfs 't groen verdorde. Den volgenden dag, 22, wierd de wind ZW. en op den 23 Z., wanneer wy weder tot aan het einde der maand zomersche dagen hadden.

De ziekten waren in 't begin der maand zuiver catarhaal, de hoesten, keelziekten, zwellingen der oorklieren, roos &c. genazen zeer wel, zonder eenige *laxantia*, door uitwaasfemende middelen, en spaansche vliegen, *spir. Mind. antimon. diaph. alkali volatil.*, *sulph. aur. antim.*, *camphor.* en vlier waren de eenige middelen, welke wy hiertoe nodig hadden.

De

De koortsen waren eveneens catarhaal, met plaatslyke zinkingen gepaard, en wierden door een critisch zweet en een waare rheumatische urine op den 9 of 10 dag gescheiden. Egter was het dikwyls noodig by de openende middelen *Cortex Peruv.* te voegen, dewyl zy schielyk zwakheid by zich hadden, en anders gevaar liepen van tot *febres malignæ catarhales* over te gaan.

Van den 9 tot den 15 was de warmte zeker voor dit jaargetyde boven-maten groot; en hierdoor wierd de slym nu meer beweeglyk en scherp; en veroorzaakte boorden, colicqpynen en doorloopen. Deze boorden waren egter zuiver slymagtig zonder eenig bymengzel van gal; de pynen waren scherp, en snydende; de buik pynlyk en opgezet; de tong zuiver of wit beslagen; er was benauwdheid, dorst en hitte; de pols was zeer snel en zeer geirriteert; zy braakten geduurig een dunne, galagtige smake-loose slym; de afgangen waren scherp, spaarsaam, dun, met persingen en gedurige neiging tot stoelgang; de pis helder en wateragtig. Oplossende zoute middelen en *emeticæ* namen de ziekte zeer schielyk weg.

By een kind van drie weeken zag ik een hevige ontsteking van het *scrotum*, die door pappen tot verettering overging en daarna toefloot, zonder dat de *testiculi* daar door eenig nadeel leden: veele eerstgeborene kinderen, en ook die in het tandkrygen waren, wierden door spruw, buikpyn en *diarhœen* aangetast en door kleine giften van *Ipecacuanna* geneezen.

Den 15 kreegen wy fchielyk koude met O: wind, waarop eerst warmte, naderhand koude regen volgde, hierop kwam den 20 een strenge vorst.

De roos, zinkingagtige *ophthalmie*, en catarrhale koortfen waren nu met gal vermengd; de galagtige *pleuris* was zeer menigvuldig. Deze was egter ontstekingagtiger, dan die wy te voren hebben waargenoomen, en altyd min of meer catarrhaal. Nadat de zieken reeds geduurende eenige dagen over walging, kwaaden smaak, benauwdheid, en dan over koude, dan over warmte geklaagd hadden, voegde zich hier by een ftekende pyn op de hoogte van de korte ribben, welke door de inademing en hoest vermeerderd wierd. Na een aderlating, die een kort durende verligting gaf, en fomtyds geheel niets hielp, gaf ik aanftonds een braakmiddel. Het bloed was ontftoken, de tong zeer galagtig, door het braken wierd een menigte dikke en taaye gal ontlast met de grootfte verligting, het water was heoggeel. Sommige wierpen door den hoest galagtige groene fluimen op, welke met bloed gemengd waren, zy hadden een gevoel van hitte in de borst en in den hartkolk. Na een of meer braakmiddelen, waren fmeltende en zuuragtige purgeerdranken hier zeer gefchikt om de overvloedige galftoffen, die zich in de ingewanden ophielden, te ontlaffen.

Eindelyk veroorzaakten de fpaanfche vliegen, op de pynlyke plaats aangelegd, niet alleen een oogenbliklyke verligting, maar deden ook de overblyffels der ziekte, door een zuur

zweet, en dik wit water ontlasten. Verscheide *cholerae pituitosa-biliose*, die op den 17 en 18 voorvielen, wierden door *emeto-catartica* hersteld.

Deeze galagtige gesteldheid veroorzaakte by twee vrouwen, doch van een zeer verschillend gestel, een geelzugt met ontsteking der lever.

De eerste was een Meisje van 16 jaar. Den 12 gevoelde zy pyn door de leden, walging en braaking, den 13 waren de oogen en huid reeds geel, de smaak was bitter, 'er was geen ontlasting, zy gevoelde een zwaarte in de lendenen, en in de regter zyde, zy was dorstig, de pols snel en de tong zuiver. Door het gebruik van een resolverende drank, had zy den 15 witte stoelgangen, en het water was saffraangeel. Den 16 kwam 'er een zware koorts met hitte, een drukkende pyn van de rugwervelen af tot midden in den buik, een korte afgebroken hoest, moeilyke ademhaling, inwendige hitte, en een kleine zeer snelle pols. Eeneaderlating, een verzagende drank en emollierende pap wierden nu voorgeschreven. Het bloed was dik en zwart, en naauwlyks ontstoken. De spanning was daar door merkelyk verligt. Den 23 waren de stoelgangen reeds natuurlyk, en de overige tekenen van geelzugt verdwenen, maar de keel, het weeke verhemelte en amandelen waren met vuile zweeren bezet, welke egter in korte dagen door het gebruik van gorgeldranken met *sp. sal. mar.* en rosenhonig, en door zuuragtige dranken genezen wierden.

De andere was een vrouw van jaaren, die
lan-

langen tyd met toevallen van zwaarmoedigheid was gekweld geweest. Den 20 dezer maand gevoelde zy koude rilling, die tot hitte overging, benauwdheid, pyn in het regter *hypochondrium*, welke door de inademing verhefte, walging, braaken, rood helder water met een snelle en harde pols. Den volgenden dag was zy zeer geel, de tong galagtig beflagen, onrustig, dorstig, braakte veel, en had gedurige hik. Den 22 was de koorts hevig, vermeerderde des avonds, de pyn verhefte op het aanraken, de pols was hard. Den 23 was 'er een groote hette, een harde pols, een zwaare drukkende pyn in de zyde met hik, welke door de ademhaling vermeerderde, het water was dik. Tot nu toe waren 'er niet als openende decocten en pappen gebruikt, dan nu, het welk veel eer behoorde geschied te zyn, wierd zy 10 oncen bloed gelaten. De pyn was in 't eerst hier door zeer verligt, dan verhefte des avonds met de koorts, de kleur van het aangezigt was nu geel, de afgang zwart, de tong droog, 'er waren gedurige oprispingen en hik. Hier op liet ik wederom 10 oncen bloed aftappen, 't welk met een dikke taaye rheumatische korst bedekt was. Den 25 was de pyn eerst beter, doch keerde des avonds weder, en verbreidde zich naar den schouder en het sleutelbeen, 'er was hik, en ydele braking, een groote inwendige hitte, drooge mond, dunne afgangen na koffydik gelijkende, en een zeer dik water. Na een aderlating van 8 oncen wierd de pols weeker, de

pyn minder, en 't bloed was rheumatisch, 'er wierd een spaansche vlieg op de zyde gelegd. Den 26 was de hoest sterker, als ook de braking, de buik aan de regter zyde pynlyk en opgezetz, de ledematen koud en de pols klein en ingetrokken. Ik liet wederom 6 oncen bloed aftrekken. Nu eerst was het bloed met een omgekrulde korst bedekt en de pols ruimer geworden. Den 27 was 'er een groote onrustigheid, hoest en zeer moeilyke ademhaling, de pyn bleef aanhouden en de buik zwol. Een aderlating van 6 oncen, een spaansche vlieg op de zyde, en een emulsie met lynolie en *syrup. diacod.* wierden nu aangewend. Den 28 vond ik het bloed met een zeer dikke spekhuid voorzien, en 'er brak des nagts een zeer sterk zweet uit, 't welk de pyn zeer verminderde, het water begon nu ook zuiverder te bezinken. Des avonds egter was 'er een beklemming op de borst en moeilyke doorslikking, waarop een drankje met *sp. Mind.* en *ant. diaph.* werd toegediend. Den 29 was de huid droog en het water helder, terwyl de benauwdheid dezelve bleef. Na een clysteer wierden 'er veele rotagtige stoelgangen met groote verligting ontlast. Den 30 was het water dik en de stoelgangen zwart. Den 1 Mey op den 11 dag der ziekte verspreidde zich de pyn langs de geheele streek der lever en breidde zich tot de keel toe uit, zy had veele zwarte stoelgangen. 's Avonds kwam de koorts met koude rillingen. 'Er was nu geen hik meer en langzaam herstelde de zieke door zwarte afgang en een zagt zweet

zweet des morgens, zy gebruikte geduurende die dagen een drankje van *Manna* met *Tart. Emeticus*.

Een beginnende cataract genas ik in een vrouw van byna 60 jaaren door het gebruik der snuifpoeders van KLEBER in weinige weken.

Omstreeks den 21 vertoonden zich tusschenpozende koortsen, welke reeds den 24 vry algemeen waren. In het begin waren zy met een catarrhale koorts vereenigd, welke door een aderlating, ('t bloed ontstoken zynde) en openende *decocta* wierd weggenomen. Na drie of vier dagen verliet de catarrhale koorts den lyder, en 'er bleef een eenvoudige anderen-daagsche koorts over. Somtyds egter waren by elken aanval der koorts catarrhale toevallen, als hoest, pyn op de borst, niesën &c., welke den aanval geeindigd zynde, verdweenen.

Dit was egter de aart dezer koortsen, dat offchoon de eerste wegen zeer wel gesuiverd waren, de koorts niet alleen niet verminderde, maar heviger wierd, verdubbelde, en de eetlust en kragten der zieken verminderden, en de koorts gemaklyk in een aanhoudende koorts overging. Hierom was het nodig den koortsbast in een genoegzame hoeveelheid in *substantie* toe te dienen, dewyl noch het afkooksel, noch het *extract* iets deden, om de koorts te verminderen, of weg te nemen.

Den 25 wierd het weêr wederom warm en hier door ontstonden die ziekten, welke uit een galagtige oorzaak ontspruiten. Behalven de gewoone tekenen van koorts, hadden de zieken een geweldige hoofpyn, en een drukkende zwaar-

te door het geheele lichaam, duifeling, walging en een zeer bitteren mond. Intusschen bleef 'er nog altyd iets ontstekingsagtigs over, waarom men de behandeling met een kleine aderlating beginnen moest.

Op het eind der maand heerschte een lastige scherpe hoest, welke door zweeten vermeerderde: in allen wierd een aderlating gevorderd, offchoon daarna een braakmiddel dezelve wegnam.

Mey.

Na een sterke warmte in de laatste dagen der vorige maand, volgde in het begin van Mey koude. Den 2 hadden wy donder en blixem, den 3 een koude N. wind, den 4 en 5 koud en regenagtig ruuw weêr. Den 6 volgde een koude O. wind, die den 7 N. wierd, en met helder weêr tot den 11 duurde, toen was de wind W., N. of NW. en koud. Op den 15 wierd de lugt meer gematigd met ZW. wind en zagten regen. Den 16 hadden wy wederom onweer, als ook den 20, wanneer de lugt veel koeler wierd. Den 23 hadden wy N., ZO, en NW. winden, met zeer veranderlyk weêr. Den 25 was de warmte matig. Den 26 was de wind NW. en helder, welke den 27 door warmen regen met W., ZW. en Z. winden vervangen wierd.

Uit den schielijken overgang van warm tot koud weêr ontstonden door belette uitwaasfeming veele catarrhale ziekten met gal gemengd. Jigt en rheumatieke pynen, pleurisen, uitslag, de wel-

welke met een catharrhale koorts gepaard gingen. — Ik zag in een bejaard man een *peripneumonia notha*, welke in het begin alle de tekenen van een ontstekingagtige *peripneumonia notha* hebbende, met een aandoening der lever verzeld was, en schielyk tot een *peripneumonia maligna* overging. Na voorafgaande ontlastingen deed hier het *Decoct. C. Peruv. cum Tamarindis* zeer goeden dienst.

Het koude weêr voortdurende, wierden de verkoudheden, zeere keelen, en intermitterende catarrhaal koortsen zeer algemeen. Vooral openbaarden zich buikpynen met hevige koorts verzeld, waarin de pols snel en klein, en de buik zeer pynlyk en gespannen was. Deze *colicae* waren ontstekingagtig en de aderlatingen toonden een zeer ontstoken bloed. In deze buikpynen deden de olieagtige dingen een uitnemenden dienst. De olie, waartoe ik de zachte amandelolie verre boven de lynolie verkies, bragt niet alleen een zagt zweet, 't welk gewoonlyk vet en kleverig was, maar ook een *hypostasis laudabilis* in 't water te weeg. Sedert weinige jaaren heb ik my met zeer veel vrugt van olie in inwendige ontstekingen zo wel der long, als vooral der ingewanden bediend, wanneer de pyn niet schielyk voor aderlatingen wilde wyken, en de oorzaak der ontsteking een rheumatische scherpe stof was, welke ingewikkeld moest worden. De aderlating konde hier wel de uitwerking doch de oorzaak niet wegnemen. Spaansche vliegen deden niet altyd die gelukkige uitwerkingen, welke ik daarvan verwagte, dewyl de stc

veel met de vogten verbonden, en dus hardnekkig de aangedane delen bleef bezetten.

Hier mede stemt over een het onlangs aange-
roonde nut der boomolie in de *rheumatismus*,
't welk de Heer J. A. MARINO in een byzon-
der stukje over dit onderwerp boven alle an-
dere middelen heeft aangepresen. (a)

In een *rheumatismus acutus*, waarby toeval-
len van *scorbutus* waren, heb ik het meeste nut
na genoegzame aderlatingen en spaansche vlie-
gen gehad van *Tart. Emetic* met *opium*. De-
ze vermenging nam de pyn weg, en bevorderde
een gemaklyke scheiding der ziekte door zweet
en het water.

Een *colica podagrica*, waarby zo wel de
borst als ingewanden pynlyk aangedaan waren,
genas ik door aderlatingen, pappen, en *decocta*
operientia en *laxantia*, waar door de pyn op
zyn vorige plaats gebragt zynde, de lyder herstelde.

In een *pleuritis inflammatorio-biliofa* zag ik
den 11den dag een gierstuitflag, 't welk zich eerst
rondfom den mond vertoonde, en vervolgens
over het geheel lichaam verspreidde, deze *crisis*
was egter onvolkomen, en wierd op den 14den
dag door een volkomene *crisis* door ontlastingen
gevolgd.

De wind warm en zuidelyk wordende, kwa-
men

(a) Saggio sopra l'efficacia dell' olio di olivo nell'
artritidi vaga, del sig. GIOV. ANT. MARINO, in 't Hoog-
duitsch vertaald uitgegeven in de Italienische Medici-
nisch-Chirurg. biblioth. von KUHŒ en WEIGEL, Leipzig
1793.

men 'er veele koortsen met oogontsteking verzeld, er wierden meer vrouwen dan mannen aangetast, en het linker oog was meermalen ontstoken, dan het regter; vooral werd ik deze ziekte gewaar by vrouwen, die zwakke zenuwen hadden. De oogen waren rood en opgezet, niet zeer pynlyk, traanden veel en waren des morgens gemeenlyk door een verdikte scherpe stof aaneengelymd, meest was deze ziekte van roos verzeld. By sommigen was de pyn in 't begin hevig, en dan hielpen emollierende stovingen met *opium* het meest. Wanneer de pyn en ontsteking verminderd was, gebruikte ik zagt zamentrekkende oogwaters met witte vitriool en *opium*. De oogleden zamengekleefd zynde, was een zalfje met *ung. rosac.*, zinkbloemen en roode præcipitaat vooral nuttig.

In de intermitterende koortsen, die den 20 en volgende dagen aankwamen, waren gewoonlyk de eerste twee of drie aanvallen zo zagt en gematigd, dat de zieken dagten, dat de koorts wederom van zelf zoude verdwynen, en daarom zelden hulp vroegen. By sommige was er een galagtige, en by andere een flymagtige complicatie, 't welk ook verschillende anomalien te weeg bragt. Wanneer er zich in 't begin gal byvoegde, hadt de zieke reeds verscheide dagen te voren gebrek aan eetlust, benaauwdheid, walging, een bitteren sinaak, pyn door alle leden, vooral in 't hoofd, koude en daarna brandende hitte, een roode gladde tong, en de koorts had geen volkomene tusschenpoozing. De koorts verhefte om den anderen dag met groote koude, gevolgd van hitte, zwaare

hoofd en lendepyn, sterke braking en doorloop. De koorts was zeer moeilyk, dewyl de zwakheid fchielyk de overhand nam en de koortsbast wel de bykomende intermitterende koorts wegnam, maar de galkoorts verergerde, welke zeer ligt in één *continua putrida* overging, verzeld, met een zeer drooge tong. Dat hier waarlyk een zekere maligniteit bykwam, toonde de uitwerking der *evacuantia*, waardoor de kragten vervielen en de tong droog wierd. Ik moet egter bekennen, dat ik dikwyls niet vroeg genoeg by de zieken geroepen wierd, en de ziektestof reeds in de tweede wege was overgegaan. Wanneer ik in 't eerste begin gelegenheid had een braakmiddel toe te dienen, wierd de koorts geregeld intermitterende, en kon gemaklyk door den koortsbast overwonnen worden. De ziekte tot een *febris biliosa putrida* overgegaan zynde, maakten de *camphor*, *radix. serpentariae* en *moschus* met wyn de pols traager en voller, en namen de droogte der tong weg; gemeenlyk fcheidde de ziekte zich dan door afgang en zweet.

Wanneer 'er integendeel een flymagrige complicatie was, begon de ziekte meer onverwagt, offchoon de zieken reeds te vooren verkoudheid, of ligte rheumatische pynen waren gewaar geworden. De koorts was van 't begin af aan gevormd, en de bykomende catarrhale toevallen hielden na den aanval op en de zieke gevoelde zich dan wel. De koortsaanval begon des morgens met hevige koude, benauwdheid en een fcherpe prikkelende hoest, zwaare pyn in 't hoofd, lendenen en beenen, en eindigde

digde met een zuurruikend zweet en een sterk wit zetzelsel in 't water. Gemeenlyk wierd deze ziekte door een braakmiddel, waardoor veel taaije slym ontlast wierd, en vervolgens door zachte afleidende openende dranken, uit middelezouten, vlier en *sp. Minder.* met het derde of vyfde acces weggenomen. By een zieke, die deeze zelve koorts had, wierd de koorts dubbel anderendaagsch, en offchoon er rykelyke ontlastingen van slym geweest, en de eetlust en tong natuurlyk waren, kwam 'er den 7den dag der ziekte een overvloedige witte spruw in de keel, die den zieken geheel van de koorts bevrydde. Den 9 den dag verdween de spruw van zelf, offchoon ik door pappen en weekmakende gorgel dranken dezelve zocht te bevorderen, de koorts kwam ook dien zelven dag weder, verdubbelde wederom onder het gebruik van resolverende middelen, en week eindelyk spoedig voor 't gebruik van koortsbast met rhabarber.

Op het einde der maand bleven de rheumatische ziekten aanhouden, 'er waren veel uitslagen by kinderen, colicquen, diarheen, roos en wormkcortsen. Veele bejaarde lieden hadden podagra, jigtpynen en aambeyen.

Juny.

- De eerste 4 dagen waren aangenaam warm, en helder, 'er waaide een ZO. wind, welke op den 4 na het N. ging, en eerst een drooge en naderhand een vogtige koude gaf.

Den 9 den bragt de W. wind, die weldra Z. werd

wierd ons weder een vogtige warmte aan, welke met een ZW. wind voortduurde tot den 16, wanneer wy een helderen warmen dag hadden. Van den 13 tot het einde der maand was het des daags regenagtig en des avonds helder en droog, de wind waaide meest uit het W.

De vogtige warmte der vorige maand, had de lichaamen aanmerklyk verzwakt, en de vogten verdikt, de afscheiding der slymklieren was zeer vermeerderd; door de hierop volgende drooge warmte, wierden deze stoffen in beweging gebragt, de gal scherper gemaakt, en de eerste wegen meer vervuild: hier door leeden vooral in het begin der maand het meest zwakke vrouwen en kinderen.

Dagelyks nam nu het getal der koortsen toe, welke offchoon zy den loop van anderendaagfche koortsen hielden, egter een bykomende onreinheid niet alleen der eerste wegen, maar ook der vogten zelve, aantoonde. Zy wierden voorgedaan door walging en pyn door alle leden. Zomtyds egter kwam de koorts zonder deze toevallen. Omtrent den middag begon de koorts met een allerhevigste koude, zeer zwaare pyn in 'thoofd, lendenen en beenen, hierop volgde de hitte, welke aanstonds verzeld was van kleine roode puisjes, die door het zweet vermeerderd wierden. Deze uitflag kwam zomtyds by den eersten, dan by zommigen ook met den tweeden aanval. Het scheen als of deze uitflag niet zo zeer fyntomatifch, als gedeeltelyk critifch was, dewyl zy niet gezien werd, voor dat 'er een aanmer-

merkelyke hoeveelheid gal en slymagtige stof door braken en purgeeren ontlast, en de zieke na deesen uitslag zonder koorts was, het water was zelf by deze lyders zeer met slym vervuld. Meestentyds wierd deeze koorts door twee of drie maal herhaalde braakmiddelen weggenomen. Dan somtyds wierd de koorts door de ontlastingen niet verminderd, maar verdubbelde veel eer en scheenden zieken te verzwakken, met dit alles kregen zy goeden eetlust en trek na vleesch en vast voedsel. De natuur toonde dus een *cardiacum* nodig te hebben, 't welk ik dus ook geredelyk toestond, terwyl ik tevens den koortsbast als het beste *cardiacum*, gepaard met camille bloemen, *sal ammoniac* en rhabarber toediende.

Met den N. wind en koude wierden veele door kliergezwellen aangetast; by sommige was alleen een enkele waterklier gezwollen, in anderen vooral, die aan *scrofula*, die met den winter bedaad was, onderhevig waren, vertoonde zich een jeukend rood schubagtig uitslag, vooral agter de ooren, aan den hoek van den mond, en op 't hoofd, 't welk zich langzaam over het geheel lichaam verspreidde. De klieren, die langs de halswervelen lopen, waren hard en gezwollen, by kinderen was tegelyker tyd de buik hard en gespannen, zy waren slaperig en zeer gemelyk. Ik tragtede de scherpte af te leiden door *bois de garou* op de arm te leggen, en de vogten te zuiveren en te verdunnen door kwiksmeringen, en inwendig kwik en spiesglasbereidingen te geven. Sommige hadden scrofuleuse oogontstekingen.

Men

Men konde een ongelooflyke hoeveelheid kwik invryven en laten innemen zonder dat de mond daar door eenigfints geraakt was.

'T weer wederom zagter wordende, zagen wy veele *morbi chronici*, hoesten, diarheen, *asthmata*, maaghoesten, heup en jigtpynen. Ook waren 'er nog veele fereufe keel en oogontstekingen.

Omtrent den 17 leeden 'er veele aan rheumatieke pynen, welke, offchoon gedeeltelyk galagtig, egter voor 't grootste gedeelte van belet- te uitwaasfeming afhingen, en hierom na behoort- lyke zuivering der eerste wegen door spaan- fche vliegen en *diaphoretica*, geheven wier- den.

Een zestigjarig man, die reeds lange jaren te voren een opzetting der milt, en nu zedert eenige dagen buikpyn gehad had, kreeg in het bukken om zyne fchoenen aan te doen, een hevi- ge bloedbraking, hy ontlastede den geheelen dag door potten vol geronnen en deels dun zwart bloed. 's Avonds by hem geroepen, vond ik hem doodsbleek, koud en als ftervende, hy was nog zeer benatiwd en de maag en buik waren nog zeer gezwollen, de bloedbraking was door het drinken van wáter en azyn opgehouden. Door het gebruik van *cassia*, *Manna* en amandelolie, en het toedienen van clyfteren, raakte hy nog veel ftukken zwart bloed door den afgang kwyt en genas al- leen door deze middelen in weinig dagen.

Omtrent den 20, wanneer des daags de hit- te lastig was, en de avonden zeer koud en nat waren, hadden wy veele anderendaagsche

koort-

koortfen, welke van het begin of aan gevormd waren. Na de ontlasting van veel gal eindigden zy met den vyfden aanval dooreene fterk zweet en dik wit bezonken water. Wanneer egter de zieken door gevatte koude inftorten, gaf ik met vrugt koorftbast met ammoniac zout en camillebloemen, waardoor de koorts aanftonds wierd weggenomen.

Een vyftigjarige vrouw kreeg een dubbele anderendaagsche koorts, en loosde door oplofende middelen niet alleen geheele potten vol taaye witte flym, maar kwyldé in de tufchenpozingen geftadig. Haar tong was met een dikke korst van een loodkleurige papagtige flym bedekt, het water bleef helder. In 't eerft waren de aanvallen zeer gematigd, dan in 't vervolg wierd elke aanval heviger. De koude en rilling en de pyn in de benen, waren zo hevig, dat zy eindlyk ftyf en gezwollen wierd, het wesen was ingevallen, de kaken waren zodanig krampagtig gefloten, dat zy niet drinken konde, zy waterde niet, de buik was ingetrokken, de oogen ftonden wyd open, en de mond en lippen waren droog. Deze ftaat duurde eenige uren, toen kwam 'er langzaam warmte, zy loosde een ligtgeel water, en kwam langzaam weer by, zonder eenig zweet. Ik gaf na dezen aanval aanftonds den koortsbast in fterke giften. In 't begin had zy fterke brakingen en benauwdheid; nadat ik door clyfteren, laxeerpillen, en het toevoegen van *sal. ammoniac* by den koorftbast veel taaye flym ontlast had, hield de koorts terftond op,
de

de eetlust kwam weder, en de zieke herstelde volkomen.

Van het midden der maand tot aan deszelfs einde heerschte een byzonder soort van uitflag, die epidemisch doch niet besmetlyk was. Er ontstond eerst een ligte graad van koorts, die met koude begon, hierop volgde een benauwde warmte, den derden dag begon het wesen te zwellen, en 'er ontstonden roode breede vlakken op de wangen, die daarna zich ook langs den hals en op de handen en by eenige weinige ook over het geheele lichaam verspreidden, deze vlakken bestonden uit zeer kleine puisjes, die naauw aan elkander zittende, de gedaante van roode vlakken hadden. Met den uitflag verdween de koorts, de vlakken bleeven twee dagen staan, en verdwenen daarna van zelf. — Hier en daar zag men ook bastaart pokjes.

Ik had deze maand twee lyders aan borstwater, de een genas door fontanellen aan de beenen, spaansche vliegen op den rug, en het inwendig gebruik der *scillitica* met speceryagtige middelen verbonden.

De andere stierf ondanks alle middelen door een verplaatfing des waters na de heftenen, de *digitalis purpurea* deed hier nadeel, niet tegenstaande het water helder was en in een vry goede hoeveelheid ontlast wierd. In 't begin gebruikte de lyderes 1 gr., zonder uitwerking, dan tot 4 gr. opgeklommen zynde, veroorzaakte dit middel droogte des monds, hitte en gedurige braken.

July

July

Van den eersten tot den zesden hadden wy vogtig en koud weêr met een W. wind. Na den 7 werd de wind, eerst NW. en daarna N. met een drooge en brandende hitte. Den 13 waaide een Z. wind, met koelen regen. De warmte werd daarna weer sterker, en bleef tot den 23 met veranderlyke winden aanhouden. Hierop volgden N. koude en buyagtige winden, welke buyen, offchoon de wind Z. werd, aanhielden tot den 28, wanneer wy tot aan het einde der maand droog en warm weêr met een O. wind hielden.

Door den kouden regen in 't begin der maand waren 'er veele zieken, meest catarrhaal, met iets galagtigs gemengd, *colicae*, *diarrhaeae catarrhi suffocativi* by kinderen, *anginae serosa*.

By kinderen heerschte nog het in de voorgaande maand beschreven uitflag, 't welke nu meer na pokjes geleek, en egter van de windpokjes, die ook heerschten, merklyk verschildte: somtyds kwam het schielyk en zonder koorts, bywylen na een koorts van eenen dag, het verdween na eenige dagen, kwam dan weder, verplaatste zich van het eene deel na het andere, en vermeerderde door de warmte in het bed. Het duurde langer by die genen, die van alle koorts bevryd waren gebleven.

Ik zag een zeer duidelyk gekenmerkte *angina biliosa* by een sterk volbloedig man, hy had een zwaare hoofdpyn, de huid, oogen

en de neus, waren geel, hy had een bitteren mond, de tong had een dik geel beflag, pyn en benaauwdheid in de maag, walging en ligte brakingen van gal, heete brandende huid met een volle en harde pols, de keel was purperrood, gezwollen en zeer brandig, het water was schuimende en saffraangeel. Een drank van vlier en *cremor Tart.* had de ziekte verergerd. Ik gaf hem een *emetico-catarticum*, 't welk een onnoemlyke hoeveelheid gal van boven en van onderen loosde en daardoor in eens de keelsontsteking wegnam.

Veele vrouwen liepen gevaar van miskraamen te krygen, en sommigen kreegen dezelve werklyk. Het zenuw en vaatgestel waren door de warme en vogtige lugtgesteldheid zeer verzwakt, en hierom waren de aamborstige, teringagtige, aan bloedspuwing onderhevige menschen, erger.

Na den zesden, wanneer de wind W. waai-
de, en de warmte meer en meer de overhand nam, begonnen die ziekten, welke uit een overtollige en scherp geworden gal voort-
spruiten, meer en meer het hoofd opteheffen. De voorgaande uitslagen bleven niet alleen voortduren, maar 'er kwamen nieuwe by, welke pynlyk waren, sterk jeukten en des avonds vermeerderden, doch door de warmte van het bed, en een zagt zweet verdweenen.

Deze uitslag vertoonde zich meest op de dyen en beenen met een wateragtige opzetting van het geheele been. Het scheen als of dezelve uit een opgenomene galstof, welke door de zweetgaten een uittogt zocht, voortsproot.

sproot. Verkoelende *laxantia*, en doeken met karnemelk en vlierbloemen uitwendig aangelegd, voldeden hier het best.

De genen, die met een galkoorts gedreigdt wierden, wierden daarvan bevryd door een braakmiddel, waarop terstond een purgeermiddel moest genomen, en de buik lang door zuure laxeermiddelen open gehouden worden.

Omtrent den 9, wanneer wy met een N. wind des daags sterke hitte en des avonds een zeer koude daauw hadden, zagen wy veel colicquan. Hetzelve begon met tekenen van ontsteking en zulk een hevige pyn, dat ik een aderlating nodig keurde, hierna verdween de pyn geheel en al, maar na dat de zieke te veel gegeten had, keerde de pyn weder, met een bitteren mond, geele drooge tong en hardnek-kige buiksverstopping. In 't eerst gaf ik te vergeefs openende dranken met *sal Epshamens.*, dan daar hier door de pyn verergerde, nam ik myn toevlugt tot olyagtige clysteren, en inwendig het *Oleum Ricini*, welke zeer sichielyk de ziektestof na beneden ontlasteden.

By volwasfenen zo wel als by kinderen zagen wy nu duidelyke kenmerken van scheurbuik. Dan wy namen hierin een aanmerklyk verschil waar.

De volwasfenen klaagden over mattigheid en pyn door de leden, en over een zekere droefgeestigheid: wanneer dit eenige dagen geduurd had, kwam 'er tandpyn met een inwendige zwelling der mond, het tandvleesch was rondsom de tanden loodkleurig en gezwollen, en kort daarna waren de tanden met etter omge-

ven, zodat het tandvleesch sponsagtig; en de tanden uit de kassen opgeheven wierden, en daaruit zeer gemaklyk konden geligt worden. In 't begin bezigde ik antiscorbutische mondspoe-lingen van lepelbladwater, met salie, tinct. van Myrrhe, rosenhonig, en om de pyn te bedaren *opium*, hierdoor werd de pyn wel gestild, doch de oorzaak niet weggenomen. Dan zodra ik zo wel in als uitwendig den *spir. salis marini* rykelyk bezigde, verdween de ziekte oogenschyglyk in weinige dagen. By kinderen was deze scorbutische gesteldheid met gal gepaard, zy hadden een ondraaglyken stank uit den mond, de tong was galagtig, 'er was een zwaare koorts mede verzeld, en een afkeer voor alle voedsel, de mond en het tandvleesch waren bezet met kleine witte platte zweertjes, welke ook de tong en het verhemelte bezetteden, en dikwyls van plaats verwisfelden, het overige van den mond en het tandvleesch, waren rooze-rood. Ik liet aanstonds een braakmiddel en daarna zuure laxermiddelen toedienen, waarna ik den mond met een zeer verdund *acid. salis* liet spoelen met een aangename stroop vermengd, en het zelve ook inwendig met zeer veel vrugt voorschreef. Deeze ziekte kwam veel overeen met het puistagtig uitslag in 't begin der maand by kinderen waargenomen, 't welk ook na dezelve behandeling luissterde.

Ik zag tegelyker tyd by verscheiden kinderen een koorts, welke volmaakt met de wormkoorts overeen kwam, en egter niet van wormen, maar uit een zwaare scherpe slym, met onverteerde spyfen in de ingewanden opgehoopt,

hoopt, ontstond. De ziekte begon met een gevoel van koude, 't welk gedurende verscheiden dagen onafgebroken aanhield, een walg van alle voedsel, en geduurige braking van dikke slym met gal vermengd, hierop volgde hitte, die des avonds altyd merklyk toenam, deze hitte wierd verzeld van zware krimpelingen in den buik met persingen tot afgang, de onderbuik was veerkragtig gespannen, de stoelgangen waren dun en slymerig, het water dun en raauw, het wesen bleek en ingetrokken, zy ploofen gedurig in den neus, de pols was snel en gespannen.

Deze toevallen duurden somtyds twee of drie weken, wanneer zy door het toedienen van geschikte middelen, ophielden. De ontlastende middelen na het behoorlyk zuiveren der eerste wegen, waren hier schadelijk en vermeerderden de koorts en pynen. Zagte opwekkende middelen, gepaard met inwikkkelende *mucilaginesa* en *oleosa*, speceryen met koortsbast, verzagteden en versterkten de verslapte spierveselen der ingewanden, en deden deze koorts bedaren.

Ik heb my dikwyls verwonderd, dat offchoon wy by kinderen toevallen van wormen zien, en 'er somtyds wel een enkele worm met deeze toevallen geloosd wierd, dat wy egter meer wormen zien losen van kinderen, waarvan wy dit niet verwagten, en die anders volmaakt gezond zyn, daar wy in tegendeel by de sterkste tekenen van wormen, door de beste wormmiddelen geen wormen zien voor den dag komen. Dr. St. CLAIR beschreef reeds in 't Jaar 1737. twee gevallen van kinderen, het een, 't welk een dusdanige wormkoorts had, en het andere, 't welk

alle tekenen van een epilepsie uit wormen had, waarby geen wormen door wormdrijvende middelen geloosd wierden: en by de ontleding van 't laatste bleek het, dat dit kind geen wormen, of eenige wormslym in de ingewanden had, maar dat de ziekte van een ophoping van water in de hersenen, na hem *hydrocephalus acutus* by de latere schryvers genoemd, gehad had.

Het is nu bekend, dat veele ziekten, die te voren met wormen verward waren, daarmede veele tekenen gemeen hebben, byzonder de *scrophula* en de *hydrocephalus acutus*: dan de Heer MUSGRAVE heeft ons in een byzonder stuk, (a) 't welk in de nuttige *auserlesene abhandlungen zum gebrauch practischer ärzte* vertaald is medegedeeld (b), geleerd, dat de koorts, die wy in den zomer by kinderen zien, en die alle tekenen van aanwezende wormen heeft, van een andere oorzaak afhangt, en veelal uit een onmatig gebruik van vrugten ontstaat, en dat hierin de herhaalde *purgantia* en scherpe wormdrijvende middelen nadeel doen. Na het toedienen van een braak- en laxermiddel raad hy, warme omslagen van aromatieke kruiden, en het eenvoudig gebruik van caneelwater met amandelolie en *syr. balsamic.* om de ingewanden te verzagten en te versterken. Ik heb meermalen gelegenheid gehad, de waar-

(a) Essay on the nature and cure of the (so called) Wormfever Lond. 1776.

(b) 3 band. 3 st. p. 554 sqq.

waarheid van deze waarnemingen op te merken, in zo verre, dat ik deeze zelve koorts met alle tekenen van wormen, door kwik en andere *purgantia* zag verergeren, en in tegendeel door 't gebruik van zagte *roborantia* en *demulcentia* genezen. Ik denk dus, dat in deze gevallen, waarin men twyfelagtig is omtrent het aanwezen der wormen, het altyd voorzigtig is, deeze scherpere middelen te vermyden, en liever die middelen te bezigen, welke door hare bittere aromatische kragt niet alleen de ingewanden versterken, maar ook tevens een wormdodende kragt bezitten. Ik heb my altoos in die gevallen met zeer veel vrugt van een eenvoudig aftrekzel van wormkruid op mee of witten wyn bediend, en dit even kragtig bevonden als de kwikmiddelen.

By volwassenen zagen wy ook tekenen van wormen, en nu en dan een worm loofen, zonder daartoe eenige middelen gebruikt te hebben. By deesen namen de *geoffrea*, *valeriana* en *calomel* wel veel slym, doch geen wormen weg.

Rheumatismi met zwelling der ledematen namen wy in flappe en zwakke gestellen waar, waarby een bitteren mond, geele tong, en bykomende buikpynen duidelyk toonden, dat 'er onzuiverheden der eerste wegen plaats hadden. Intusschen waren het geene zuivere *rheumatismi biliosi*, dewyl na genoegzame ontlastingen der eerste weegen openende en zweetdryvende middelen en spaansche vliegen de geneezing te weeg bragten.

Ik heb nooit op denzelven tyd zo veel vrou-

wen aan vloeden zien lyden, als op dit tydſtip, zy klaagden, dat zy reeds voor vier, ja zes weken nu meer, dan minder haare *menſes* gehad hadden, over pyn in de lenden, welke zich ſomtyds tot den buik verſpreidde, mattigheid en groote zwakheid, by zommigen waren de eerſte wegen ook met een ſcherpe gal en ſlym bezet. Alle de vrouwen, die deze ziekte hadden, waren ſlappe, wateragtige, ſcorbutiſche geſtellen; ik ſchreef hierom deze ziekte aan ſlapheid der vaten, en een *diathesis ſcorbutica* toe. Met dit oogmerk gaf ik na het zuiveren der eerſte wegen, zodanige middelen, welke het bloed verdikten en verbeterden, en de vaten verſterkten en zamentrokken, vooral minerale zuuren en koortsbaſt. De uitwerking dezer middelen overtrof zelfs myne verwagting, zodat alle binnen zeer korten tyd daardoor genezen waren.

Wanneer de wind zuidelyk, en het weer drukkend warm wierd, kreeg ik op een dag 5 lyders aan *colica* en *cholera bilioſa*, hiervan waren 4 vrouwen, en een zwak hypochondriſch man. Twee hiervan hadden een waare *cholera* met hevige braking en afgang, ſterke koorts, dorst en droogen mond. Drie andere hadden een *colica bilioſa*, welke op een galagtige diarhé uitliep. By allen egter, offchoon zy gal loosden, was de tong wit en papagtig, en zy hadden de ziekte bekomen door zich aan de koude avondlugt bloot te ſtellen. Hierom behandelde ik de ziekte niet na de wyze van SYDENHAM met *diluentia*, maar met *antispasmodica*, die te gelyk een weinig zweetdryvende waren. Hiertoe bezigde ik de *Ipecacuanna* met *rhabarber* en *Laud. Liquid*, wel-

welke ik in kleine en herhaalde giften met dit gevolg toediende, dat de ziekte in zeer korten tyd volkomen bedaard wierd

Deze geneigdheid tot *cholera* en *colica biliosa* bleef de geheele maand voortduren, en veele wierden tevens door een *febris aestiva* gedreigd, welke egter door het by tyds gebruiken van een braakmiddel en daarop volgende laxermiddelen, wierden voorgekomen, tevens liet ik egter een oelen, en uit zuuragtige vrugten met onthouding van vleesch, bestaanden leefregel in agt nemen.

Van den 21 tot den 28 hadden wy N. reegens, die door de schielyke op de hitte volgende verkoeling verkoudheden, zeere keelen, colicqpynen, rheumatische zydeween, en lende-ween te weeg bragten, welke alle ruime ontlastingen, en daarna spaansche vliegen en zweetmiddelen vorderden.

Den 29 wierd de lugt helder en warm, toen hadden wy veel galagtige roos en *colicae biliosae*.

In de voorgaande maand zond my de Heer HUFELAND van *Weimar* zyn stukje over het gebruik der *barytes muriatus*, en een proeve van dit zout ter onderzoeking. Ik liet aanstonds een zekere hoeveelheid van dit middenzout na het voorschrift van HUFELAND uit *spathum ponderosum*, welke ik uit Schotland voor myne verzameling had medegebragt, toebereiden, welke in alle opzigten met die van gemelden Schryver overeenkwam. Ik liet een half drachma van dit zout in een once gedestilleerd water ontbinden, en gaf daar van aan een scrofuleus kind van 15 tot 20 droppen met water, zo dikwyls het kind dit nam, gaf het braking en daarna

afgang. Een kind van 3 jaar, 't welk niet alleen klieren aan den hals, maar ook een verharding en verstopping der darmscheilklieren had, verdroeg zonder het minste ongemak van 30 tot 40 droppen: maar wanneer ik een dragma in dezelve hoeveelheid water ontbond, en het kind daarvan 30 droppen toediende, raakte het sterk aan het braken. By een jonge juffrouw die zedert langen tyd zeer groote en verharde klieren aan den hals had, veroorzaakten 30 droppen geen uitwerking, 40 droppen gaven walging, en 50 braaking. Ik bleef dus voor haar de gift op 40 droppen bepalen. — By de kinderen, waarin ik het tot nog toe beproefd heb, scheen het in 't eerst een zeer goede uitwerking te doen, doch daarna verergerden zy wederom.

Dan by de jonge juffrouw wierd de groote klier aan den hals zeer schielyk week, en verdeelde zich in verscheide kleinere, welke ook daaglyks verminderden, dan daar dit meisje cachectisch was, kwam 'er een schielyke bloedspuwing van zeer dun schuimagtig bloed, waaraan zy stierf: het is by my twyfelagtig of deeze bloedspuwing aan een sterke resolutie van 't bloed door dit zeer kragtig ontbindend middel, dan aan een toevallige bykomende oorzaak, moet toegeschreven worden.

De *calx salita* of het overblyfzel van de destillatie van de *spir. sal. ammon. c. calce viva paratus*, een oud geneesmiddel, waarvan wy in eenige oude apotheken nog gewag gemaakt vinden onder den naam van *lithontripticum Hofmanni*. Dit middel, 't welk in smaak en bestanddeelen zo veel overeenkomst heeft met de *terra*
pen-

ponderosa salita, heb ik ook met vrugt in *scrophula* beproefd. Dan daar 'er altyd nog *alkali volatile* aan de *calx salita*, op deeze wyze verkregen, blyft hangen, welke de zuiverheid aan dit middel beneemt, heb ik eenvoudige *calx viva* met *spir. salis* laten verzadigen, dit tot droogwordens toe uitwaasfemen, en vervolgens in de lugt smelten. Op deeze wyze verkreeg ik een zeer fterk zout *lixivium*, 't welk ik van 10 tot 20 droppen, in gedestilleerd water opgelost, aan kinderen gaf, dit middel werkte veel minder hevig dan de *barytes muriatus*, en veroorzaakte geen walging, het hield alleen den buik ruim open. Ik heb met dit middel, wanneer ik langen tyd vergeefs *calomel* met *Sulph. aur.* gebruikt had, hardnekkige klieren aan den hals in zeer korten tyd doen smelten. (a)

Augustus.

Met het begin van Augustus hadden wy droog helder weêr met een O. of N. wind, zodat de eerste van den 1 tot den 5, en de laatste van den 5 tot den 11 waaide. Den 11 begon de lugt zich meer met wolken te dekken, en de wind wierd westelyk, den 15 ZW. met zagten regen, welke het verdroogde aardryk zeer verfrischte, offchoon den 18 de wind O. was, hield het zelve weder aan, en bleef met onweers buyen en flagregens op den 28, tot aan den 29 voortduren, wanneer de wind tot aan het einde der maand N. bleef.

De afwisseling van O. en koele N. winden
maak-

(a) de Heer FOURCROY pryst ook dit middel aan in *Scrophula*, zie *Medecine Eclairée* t. I. p. 368 en 369.

maakte, dat wy een aangename getemperde drooge lugt in de eerste dagen van Augustus hadden, zodat 'er byna geen *colicae* of *diarhae biliosae* meer gevonden wierden. Op den 6de werd de hitte meer brandende en onaangenaam, te meer dewyl de avonden door de N. winden zeer koud waren. Het getal der zieken, welke een te overvloedige en scherpe gal hadden, vermeerderde dus aanmerkelyk, en wy zagen al aanstonds veele *cholerae*, *colicae biliosae*, *diarhae*, roos en andere galagtige uitslagen. De *cholerae* kwamen meest zeer schielyk en onverwagt aan, doch de gal zeer beweeglyk zynde, werd dezelve aanstonds door de natuur zelve uitgedreven, alleen op de wyze van SYDENHAM, door dezelve met veel drinken te ondersteunen. Na het aflopen der ziekte deed de rhabarber veel voordeel, welke ik in andere *cholerae*, waarin de natuur minder werkzaam was, en de stof niet volkomen ontlast was, nadeelig zag. In 't vervolg der maand, wanneer er tekenen van ophoping eener *saburra biliosa* in de eerste weegen aanwezig waren, was de ziekte moeilyker, en de toevallen zwaarder. By eene zieke waren de toevallen zodanig hevig, dat zy van de eene flaauwte in de andere verviel, onlydelyke angsten en brakingen, en onophoudelyke dunne stoelgangen had. Dezelve geneeswyze, welke ik in de *cholerae* der voorgaande maand gevolgd had, voldeed nu ook volkomen, dewyl de *Ipecac.* met *Laud. Rheum* en *lap. cancr.* in het begin de loofing van stoffen door braking bevorderden, de kramppynen bedaarden, en de stoelgangen zodanig bedwongen, dat 'er nu ou-

de

de en zwaardere stoffen met verligting ontlast wierden. Hierna volgde een goede uitwaasfening, welke geheel en al de gezondheid herstelde.

De *colicæ biliosæ* waren ook ligt en wierden aanstonds van een galagtige diarhé gevolgd, wanneer egter deze afgangten te sterk waren, werd de buikpyn zonder nadeel door *rhabarber* en *absorbentia* weggenomen.

De galagtige roos werd in galagtige drooge lichamen ook hier en daar waargenomen, doch alleen by die geene, die veel en vet aten, en zich aan de avondlugt onvoorzigtig hadden blootgesteld. 's Avonds hadden zy koorts met hitte en des morgens een bezwarend zweet, de kleur van 't weezen was meer purperagtig rood, en om den neus en mond waren de zieken zeer geel; voor 't overige hadden zy alle tekenen van scherpe gal in de eerste wegen. Braakmiddelen en *purgantia*, waar door veel dikke taaye gal geloofd werd, genazen hier de zieken spoedig. — De windpokjes, en netelroos, welke nu ook menigvuldig gezien wierden, hadden ook alle tekenen van gal by zich.

In deze maand zag ik wederom een en ander voorbeeld van *pemphigus*. Deze ziekte heb ik hier niet anders dan zeer ligt, en dan ook meermalen waargenomen. De ziekte was of verspreid over het geheele lichaam, of meer bepaald tot byzondere deelen: zy kwam te voorschyn onder de gedaante van kleine roode puijes, welke langzaam grooter wierden; eindelyk zich tot blaasen van een meerdere of mindere grootte verheften, en een dun geelagtig vogt bevatteden. De blaasjes doorgesneden zynde, viel de opperhuid tevens af. Deze ziekte zag ik
zel.

zelden met eenig teken van onzuivere ingewanden gepaard. Somtyds duurde deze uitslag eenige dagen, somtyds eenige weeken, terwijl telkens de afvallende blaasen door nieuwe vervangen wierden. Geduurende deezen uitslag, welke ik van eene zekere scherpte in 't bloed afleidde, heb ik ruime buiksonstlaftingen onderhouden, bloedzuiverende dranken laten drinken, en den uitslag zelve met doeken met karnemelk en vlierbloemen laten betten.

De *pemphigus* is een dier ziekten, welke minder bekend, en onder de meer zeldzame behoren, intusschen is 'er zekerlyk een merkelyk onderscheid tusschen de *pemphigus acutus* en *chronicus*. De *pemphigus chronicus* heb ik verscheide reizen gezien zonder eenige koorts, en langer of korter duuren, CULLEN zag de ziekte slegts eens, en hy dagt dat ze symptomatisch was, gelyk hy dan ook aan de beschryvingen van SAUVAGES weinig gewigt schynt te hangen (Nos. Method. g. 34.). Ik heb eens gelegenheid gehad, de ware *pemphigus acutus*, zoo als dezelve van SAUVAGES beschreeven word. sp. 3 onder de naam van *pemphigus Helveticus* te zien, hoewel dezelve noch doodlyk noch besmettelyk was. Deze vrouw kreeg na ongeregeldheeden der *menses* eerst bloedbraking, daarna een zekere blindheid, zonder dat men iets aan de oogen zien kon; vervolgens kwaamen 'er over het geheele lichaam blasen uit, die de grootte van een hazelnoot hadden, en met een helder sereus vogt vervuld waren, deze blazen kwaamen te gelyk op de tong, in den mond en keel, daarna in de maag en den geheelen loop der ingewanden.

wanden, zoodat zy van plaats tot plaats scheenen voort te lopen, zy was met geen hevige koorts, maar met sterke benauwdheid gepaard. De blazen droogende, gingen alleen in een afschilfering der huid over, die lang blauwagtig bleef. Deeze ziekte kwam op dezelve wyze drie agtereenvolgende jaaren weder in de maand April, en wierd door de Heeren HOME en GREGORY met koortsbast en wyn behandeld. Het laatste jaar, toen ik dezelve zag, was de aandoening der oogen sterk, doch de uitflag der blaazen niet zeer langduurig. Dewyl de ziekte haren oorsprong schein verschuldigd te zyn aan een opstopping der *menses*, zoude men dezelve mogelyk onder de 7 spec. van SAUVAGES kunnen brengen, die hy *pemphigus plethoricus seu inflammatorius simplex* noemt.

Geduurende deeze dagen hadden wy veele toevallen, welke alleen van gal moesten afgeleid worden, *anginae biliosae, pleuritides biliosae &c.* welke alie door braak en purgeermiddelen zeer schielyk verdreeven wierden.

De galkoortsen waren van een remiterenden aart, met sterke verheffingen des avonds, en remissie des ogtends door zweet, de zieken waren zeer zwak en tot flauwtens geneigd. Herhaalde braakmiddelen, zuuren en *laxantia acidula* voldeden hier zeer wel. Op den 9den dag zag ik by een sterk mensch in een *febris biliosa*, een absces in 't *perineum* geboren worden, waardoor de koorts ophield. By een ander hield de koorts op, wanneer de ziekte zich op de tanden zettede en een zwaare kiespyn veroorzaakte, na het gebruik van een zweetmiddel, ver-

verplaatste de stof zich wederom na de maag en ingewanden, en veroorzaakte alle de tekenen van *materia turgens*, er wierd door een braakmiddel veel dikke grauwe gal ontlast en de zieke was zoowel van zyn tandpyn, als van zyn galkoorts geneezen. Gewoonlyk eindigde de ziekte door ruime ontlastingen van stoffen door een diarthe op den 11den dag, wanneer 'er op den 14den een zeer vet zweet uitbrak, 't welk den lyder geheel en al van de koorts bevrydde.

Den 16 begon het weer te veranderen, nadat de wind na het W. gelopen was, de lugt wierd betrokken, en weldra kwam 'er een ZW. wind met regen, die nu de geheele maand bleef voortduren. De uitwaasfeming schielyk by veelen belet zynde, kregen zy verhardheden, zeere keelen en *dysenteriae*, welke egter van die *dysenteria* verschilde, welke ik te voren had waargenomen, en door GRANT als een gedeelte van de *constitutio biliosa* beschreven is. Deze dysenterie was geheel en al rheumatisch, en tastede alleen dezulken aan, die, na warm geweest te zyn, koude gevat hadden. Zy begon met of zonder walging, met een smakelosen mond, somtyds met, somtyds zonder koorts, met een gebrek aan eetlust, 'er volgden buikpynen in de dunne darmen, met zeer dikwyls herhaalde doch spaarzame en pynlyke afgangen van slym met bloedstreepen vermengd. Het water was dik, (*jumentosa*) met een rood of ook wel wit poejer op den grond, de tong was wit, of geheel zuiver; alle de tekenen van gal waren hier dus afwezig, die

die wy te voren gezien hebben. Rhabarber met *Laud. Liquid.* en *absorbentia* matigden niet alleen de buikpynen, maar bragten gemeenlyk in twee of drie dagen waare stoelgangen zonder persfingen te weeg, waarmede de geheele ziekte ophield. Een zuur en overvloedig zweet volgde of verzelde de ziekte, 't welk de pyn altyd verminderde.

Ik genas een asthmatisch meisje, die een *pleuritis inflammatorio-rheumatica* had door aderlatingen, spaansche vliegen en een afkookzel van *senegawortel* met *oxymel* en *kermes*. Wat ook de Heer THILENIUS omtrent het nut der *Senega* wortel mooge zeggen in het verdunnen van inflammatoir bloed, en het genezen der *pleuris*; wat ook anderen en vooral LENTIN daar omtrent mogen staande houden, ben ik verzekerd, dat de *Senega* in een zuivere ontstekingsagtige *pleuris* nadeel doet. Ik heb dezelve niet een, maar meermalen na genoegzame bloedontlastingen in *pleuris* toegediend, dan ook altyd my deszelfs gebruik beklaagd. Altyd was ik gedrongen op nieuw ader te laten, dewyl het bloed daardoor aangezet en de hitte in de maag en ingewanden ondraaglyk was, en de tong daarna droog wierd, terwyl niet alleen geen *expectoratie* volgde maar dezelve veel meer gesupprimeerd wierd. Dan in *inflammationes spuriae* en *erysipelatosae*, waarin de inflammatie maar *per accidens* komt, en gewoonlyk door een aderlating word weggenomen; waarin een byzondere scherpe stof de oorzaak der inflammatie is, en 'er tegelyk, zo als gewoonlyk is by alle rheumatieke ziekten, een tegennatuur-

H

lyke

lyke dikte der vogten, en flymagtige dispositie de overhand heeft, zal de *Senega* als een zeer vermogend *attenuans* en *incidens* de taaye flym verdunnen, in beweging brengen, en door den korsten weg ontlasten. Na myn inzien komt de *Senega* dus te stade, wanneer de *Helennium*, *sulph. aurat.* en *kermes* te pas komen en in dit geval heb ik meer dan eens desselfs uitstekend vermogen in het bevorderen der fluimlozing bewonderd.

September.

De maand begon met schoon en helder weer en ZO. wind, 's morgens was 'er een dikke koude mist, die zich weder na zonnenondergang vertoonde.

Van den 8 tot den 11 was de wind W. met reegen. Van den 11 tot den 18 was 'er storm en regen, de wind eerst NW. daarna N. Den 18 ZO. heldere koude. Van den 20 tot den 27 ZW. koud en regenagtig. Van den 27 tot den 30 was de wind 's morgens O. en helder, 's avonds W. en regenagtig.

In 't begin zagen wy veele tand- en oorpylen, zeerekeelen en *rheumatismi*, *pleuritides rheumaticæ*, *diarheæ* en *dysentericæ*. Die gezond en sterk zynde, deze ziekten door gevatte koude, kregen, hadden geene tekenen van gal; een spaarsche vlieg en een uitwaasfemend drankje van *sp. Minder. Laud liq, Ipecac. &c.* genas dezelve aanstonds.

Maar die zwak, en te gelyk met een moeilijke en kwade spysvertering behebt waren, en

en vooral kraamvrouwen, kreegen ligt de *febris dysenterica biliosa*. De kraamvrouwen kreegen aanstonds na de kraam zwaarte in 't hoofd, roodheid van weesen, en ongevoeligheid, daarna zware pyn door de leden, een geele kring omstreeks den neus en mond, een geele drooge tong, dorst, walging, pyn omtrent den hartkolk, buikpyn, persingen en zeer stinkende dunne afgangen. Het zog wierd egter behoorlyk afgescheiden, en de kraamvloed was niet genoegzaam, en zeer bleek. Ik gaf haar de *Ipecacuanna* met *sal polychrest* in kleine, doch genoegzaame giften om den vreemden gast uit te dryven; 'er volgden gemaklyke brakingen, en scherpe maar doorgaande en zeer verliggende ontlastingen. Terwyl 'er egter nog tegenatuurlyke stoffen in de ingewanden overbleven, kwam 'er des avonds koorts met koude en rilling, en braking, het hoofd wierd ligt en yl, wanneer de hitte aankwam en de aanval eindigde met een ruim zweet, en een volkomen bezonken urine. Afkookfels van tamarinde met *Ipecacuanna* en *sal polychrest* veroorzaakten dunne, galagtige en stinkende ontlastingen, terwyl de kraamvloed weerkeerde, en het zog meer na de borsten ging. — Daarna wierden de afgangen lyviger, meer gekookt en gunstig, de eetlust keerde weder, en zy herstelden volkomen door laxeermiddelen. De verloorene kragten wierden na het eindigen der ziekte door koortsbast en bittere middelen hersteld. Men ziet hieruit, hoe gevaarlyk het is by kraamvrouwen altyd een diarhé door *adstringentia* en *anodyna* te stuiten, daar zy tog

veel meer geschikt zyn om een heerschende ziekte, vooral van een gastrischen aart te krygen, 't welk door STOLL diensvolgens op veele plaatsen te regt errinnerd word.

Hoewel by kinderen nog veele wormen en vooral maden bespeurd wierden, heerschte 'er nog een *febris verminosa spuria*, welke uit een galagtige slym in de eerste wegen opgehoopt, zyn oorsprong had, en die van de voorgaande verschilde. De koorts kwam des avonds zonder koude, met hitte, rood- en opgezetheid van het aangezicht, droogen mond, roode tong, welke in 't midden met een witte slymagtige korst bedekt was, verwyderde oogappels, zy ploofen den neus en bragten de handen dikwyls na de *genitalia*, de adem was heet en stinkende, zy waren zeer afgemat, zomtyds hadden zy een kleinen hoest, geen lust tot eeten, en neiging tot braaken, de afgangen slymagtig, de buik gespannen en als trommelzugtig. Na de *Geoffrea*, de overige *amara* &c. te vergeefs te hebben toegediend, nam ik myn toevlugt tot zagte en inwikkellende *laxantia*: de *pulp. cassia* met *oleum amygdalarum* deed hier de schoonste uitwerking, zy bedaarde de koorts, en gaf veele slymagtige afgangen. Aan een kind, 't welk deze koorts gehad had, en by het welk ik nog vermoeden van wormen bleef houden, gaf ik het *lixivium* der *terra ponder. salita*, waardoor een lange worm ontlast wierd.

Een vyftigjarige vrouw, die haare gewoone aderlating verzuimd had, kreeg een sterke bloedbraking, die door een aderlating, en *cassia* met amandelolie spoedig weggenomen wierd.

Den

Den 8 werd het weêr koud en veranderlyk met een regenagtigen W. wind. Veele kree- gen nu zonder, andere merkbare oorzaak dan gevatte koude, een allerhevigste pyn in de maag, onder het zwaardwyze uitsteekfel van het borst- been, het was als of hier een scherpe priem in gestoken wierd; deze pyn kwam des middags na den eeten. De zieken hadden te gelyk win- den en oprispingen na boven, en waren tot flauw worden zeer geneigd. Zommige hadden zeer goeden eetlust, doch zo dra de spysverte- ring een uur byna na het eeten begon, braakten zy al het eeten weder uit met veel dikke groenagtige slym. Een braakmiddel hielp in het begin voor een of twee dagen. De *Ipeca- cuanna* met *Laudan.* en rhabarber deed geener- hande uitwerking. Na het braakmiddel keer- de de pyn na een of twee dagen weder, zo dat ik de slym eer als een uitwerkzel der kramp, als een oorzaak daarvan beschouwde. Een koud aftrekzel der valeriaanwortel genas ze alle, en scheen niet alleen als een kramp- stillend en versterkend, maar ook als een zagt uitwaasfemend middel te werken. Zomtyds was deze pyn van een hevigen aart, en vertoon- de een *inflammatio erysipelatoza* der maag. Een jonge gezonde vrouw was, terwyl zy een zware verkoudheid in 't hoofd had, op een kouden regenagtigen dag op een open rytuig gaan zitten, zodat zy door en door nat wierd, s'avonds hield de verkoudheid geheel en al op, zy gevoelde aanstonds zware pyn in de maag, walging, en braakte veel slym, dit duurde tot den volgenden dag. Des naden-

middags kreeg zy zeer zwaare pyn in 't hoofd met gedurige braking, zwaare benaauwdheid, egter had zy in de maag geen hevige pyn, maar alleen een drukking en zwaarte, dunne afgangen, rilling en koude, die met warmte verwisfeld wierden, de huid was matig warm, en de pols klein en ingetrokken, de tong zuiver en vogtig. Dewyl ik de voorgaande omstandigheden niet wist, en alleen aan een overlading der maag dacht, gaf ik haar een mixtuur uit rhabarber, *Ipecac.*, kreeftsoogen en een weinig *Laud. Liq.* bestaande. Na dat zy dit middel tweemaal gebruikt had, viel zy in een gerusten slaap, en zweete sterk met verligting, voor myn komst had zy egter het drankje doorgebruikt, dewyl haar tong zeer beflagen was: na dat zy slym gebraakt en ontlast had, kreeg zy des nagts wederom een zeer sterk zweet, een hypostatistische urine, en bevond zich des anderendaagsch gezond.

De koortsen waren geduurende de geheele maand zeldzaam; men zag egter nu en dan tusfschenpozende koortsen, welke van een galen zinkingagtigen aart waren. Zy hielden het beloop van een dubbele anderendaagsche koorts. De zieken hadden een gevoel van zwaarte in 't hoofd, een droogen hoest, die met den aanval vermeerderd wierd, benaauwdheid, en met het begin des aanvals braking, de tong was slymagtig en geel beflagen, het water dik, de ontlasting traag. De catarrhale en galagtige toevallen moesten eerst door openende en laxerende dranken worden weggenomen, wanneer de koorts door den koortsbast konde
ge.

gestuit worden. By eenen lyder zag ik een *febris rheumatico-biliofa*, zo als die by GRANT onder den naam van *febris biliofa* beschreeven word, die op den 15den dag met een koude rilling en sterkere koorts, waarop een goed zweet volgde, eindigde.

Zinkingagtige zeere keelen en tandpynen, als ook verkoudheden waren heerschiende. Verscheide menschen wierden door een voort van roode gierstkoorts aangedaan, die ook *rheumatico-biliofa* en goedaartig was. Zy begon even als andere koortsen, met verwisfelingen van koude en warmte, zware pyn in 't hoofd, rug en lendenen, walging, onrustigheid, een drooge en beslagene tong, hoest en benaauwdheid, te gelyker tyd brak over het geheele lighaam een rood puistagtig uitflag uit, 't welk zeer jeukte; dit uitflag vertoonde zich alleen zo lang de lyder te bed lag, maar zo dra hy buiten 't zelve was, verdween hetzelfde, en werd vervangen door heeschheid, angstvalligheid en moeilyke ademhaling. Het duurde 3 of 4 dagen, wanneer ruime ontlastingen, en een daar op volgend zweet, hetzelfde wegnamen.

Omtrent den 20 kwam de *febris dysenterica* wederom ten voorschyn. In het begin klaagden de zieken over afwisselende koude en warmte, de hitte werd daarna meer bestendig met grooten dorst, 'er volgde hevige buikpyn met persingen, en geduurige afgangen, waardoor een weinig bloedige slym ontlast werd, de mond was bitter, de tong wit beslagen, de pols snel en ingetrokken, het water dik en troebel. Door de *Ipecacuanna* met

rheum braakte de zieke eerst, en kreeg hierop dikke stofflyke ontlastingen. Somtyds bleef 'er egter een bloedige doorloop over zonder pyn, welke het veiligste door de *cortex angusturae* overwonnen wierd.

Met deze *febris dysenterica* heb ik een tusfchenpozende koorts verbonden gezien. 's Avonds kreeg de zieke den aanval met koude, en zwaare buikpyn, de hitte was verzeld met geweldige hoofdpyn, vooral van het voor en agterhoofd, zodat de lyder zyn gevoel uitdrukte, als of 'er een band styf om 'thoofd gebonden was, 's morgens zweefte hy sterk. Na den aanval was 'er walging en neiging tot braking, en een vuil beslag op de tong. Op den vryen dag bragt een braakmiddel veel taaye gal op, en daarna wierd de ontlasting door rhabarber met *sal. polychr.* bevorderd. De tweede aanval liep op dezelve wyze af, maar op den vryen dag, waren de afgangenvylviger. Na het derde *accès* hield de dysenterie op, maar de zieke hadde zwaarder hoofdpyn, yling, en een opzetting der maag, die op het aanraken pynlyk was. Om deze rede werden de ontlastingen meer bevorderd, en de volgende *paroxysmus* was van deze toevallen vry. Wanneer de zwakheid vermeerderde, gaf ik campher met *serpentaria*, waardoor van zelve, wel gekookte afgangenvylviger, en een dik wit water, volgden. Een spaansche vlieg in den nek aangelegd, nam niet alleen de hoofdpyn, maar de koorts zelve weg. Dan daar de koorts als een zuivere *tertiana*

ana wederkeerde, genas ik dezelve gemaklyk met den koortsbast.

De volgende dagen waren 'er door de koude en belette uitwaasfeming *rheumatique* pynen en *cholerae*, welke door openende *laxantia* verdweenen. Zommige daarvan wierden door een *critisch acces* van koorts met braking en stoelgangen, een sterk zweet, en een dikke wel besonkene urine geheel weggenomen.

October.

Van 1 tot den 11 was het weêr helder en koud met een O. of NO. wind, op dien dag veranderde het weêr geheel en al, zodat wy met een W. wind warmen regen hadden. Den 13 was de wind Z., welke dus met regen tot den 20 bleef voortduren, wanneer 'er heldere en zomersche dagen kwamen. Den 24 hadden wy weder een plotslyke verandering van weêr, het welk nu koud, en regenagtig wierd met NO. wind, die den 26 O. wierd, maar helder en koud. Den 28 wierd de wind Z. laauw, regenagtig. Van den 29 tot den 31 stormagtig met regen, terwyl 'er een ZW. en W. wind waaide.

De *febres bilioso-catarrhales* der vorige maand bleven nog aanhouden, waarby zich hier en daar een inflammatoire dispositie voegde. *Rheumatique* pynen, catarrhale koortsen, *pleuritides rheumatico-inflammatoriae*, wierden nu over het algemeen waargenomen: een galagge flym voegde zich gewoonlyk by een scherpe zinkingagtige stoffe, zodanig dat een schielyk

lyk belette uitwaasfeming de toevallige oorzaak fcheen te zyn, waardoor eene opgehoopte galagtige ftof in werking gebragt wierd. Met een fcherpen hoest, opprefie, en pyn op de borst was meest een geele tong, walging en drukkende pyn in de maag gepaard, die op het aanraken erger wierd. Hierom was een braakmiddel uitftekend nuttig, waardoor na het ontlasten van veel flymagtige gal een fterk en waar critifch zweet veroorzaakt wierd, zodanig, dat de natuur zich hierdoor zonder eenige purgeermiddelen redde.

Dezelve oorzaak maakte de diarheen menigvuldig, welke in 't eerst met zwaare pyn, walging, en bitteren fmaak verzelde, door purgeermiddelen verergerd, maar kragtig door een braakmiddel en vervolgens door zweetmiddelen genezen wierden. In fommige gevallen wierden zy egter langdurig, zodat zy oogenfchynlyk nadeel deden, hierom heb ik gedagt dezelve door een kragtig verfterkend middel te moeten bedwingen. Ik liet tot dit einde een *Dr. cortex augufturae* in 6 oncen van een fpeceryagtig water aftrekken, en in 24 uren gebruiken. Dit middel 2 of 3 dagen gebruikt zynde, bedaarde niet alleen de diarhé, maar nam ook tegelyk de walging en bittere fmaak weg. Dit middel komt dus in veel opzigten met de *radix arnica* overeen, waarvan ik de uitftekende uitwerkingen te voren heb medegedeeld.

By die gene, welke te voren tekenen van kwaade ftoffen in de ingewanden gehad, en dezelve verwaasloofd hadden, brak de netelroos uit, die door *laxantia* weggenomen wierd.

Moet-

Moeijelyke waterlofing met buikpyn, fcherpe maagpynen met zuuragtige oprispingen, uit onderdrukte uitwaasfeming voortspruitende, wierden op dezelve wyze als in de vorige maand door een aftrekzel der valeriaanwortel genezen.

Sommige vrouwen kreegen zonder uitwendige aanleidende oorzaaken flauwtens, en wierden daarvan hersteld door *antispasmodica*.

De moeijelyke en belette neerzweiging was dit jaar meer gemeen dan in de voorgaande jaaren, zo dat ik daar aan drie vrouwen verloor. Offchoon ik zo wel by jonge als oude menfchen deze kwaal heb waargenomen, zag ik dezelve egter meer op dien tyd, wanneer de *menfes* ophouden. By een anderzints gezonde vrouw, wier ftonden twee jaaren te vooren waren opgehouden, kwam in de verlopen maand van April een zekere fcherpte in de keel met een gevoel van droogte, welke de flikking moeijelyk maakte, wanteer ik de keel met alle oplettendheid befchouwde, vond ik dezelve bleek en verflapt; deeze moeijelyke flikking wierd allengs grooter, en nu vertoonde zich in den nek by de doornachtige uitfteekfels der halswervelen een verharde klier, welke langfaam grooter wordende, zeer lastig wierd. In de maand van September wierd deeze moeylykheid in 't flikken grooter, en tegelyk met het voedzel wierd 'er veel taaije flym uitgeworpen. Zy kreeg een zeer fchielyk verval van kragten, en ftikte onverwagt. Zeldzaam of ooit heb ik gezien, dat de ziekte in zulk een korten tyd zodanig verergerde, als in dit geval. Meest altyd was de verergering on-

onmerkbaar: een vrouw van 80 jaar stierf aan dit gebrek, nadat zy het reeds dertig jaar gedragen had.

In deeze Maand vertoonde zich hier dezelve epidemifche catarrhaal koorts, welke onder den naam van *Influenza* in het jaar 1782 geheel Europa bezogt heeft, en vooral in de maanden van Mey en Juny hier in Nederland algemeen was. — De eerfte, die hiervan aangetast wierd, kreeg ik op den 9, wanneer een koud en regenachtig weer, tot helder en koud met een NO. wind overgegaan was. De ziekte verspreidde zich dagelyks meer en meer, doch vooral den 24, 25 en 30, wanneer de lugt zoei en vogtig was. — De toevallen, welke deeze epidemifche ziekte kenmerkten, waren de volgende.

Onverwagt wierden zy aangetast door een pyn door alle leeden, matheid, en een ligte rilling en koude, het hoofd was vooral pynlyk, doch zodanig dat 'er als een band boven de oogleden gebonden was; de oogen waren rood, pynlyk, traanende, en konden geen fterk licht verdragen; 'er was een gedurige niesing, in de *uvula*, het *velum pendulum* en de keel voelden zy een ligte prikkeling, en hierdoor was de flikking pynlyk, de ſtem was eenigfints heesch, de hoest was geduurig en heesch, by sommige was zy byna niet aanwezig, de ademhaling was moeilyk en 'er was als een gevoel van zamentrekking over de geheele borst, 'er was altyd een pyn en drukking op de *scrobiculus cordis*, walging, neiging tot braken, de ſmaak of zoet, of papagtig of bitter, by sommige

mige was de tong wit en papagtig, by andere geel en galagtig; de pols was in 't eerst klein en ingetrokken, doch daarna wierd zy vryer en meer vol, te gelyk kwam 'er een brandende hitte; het water was dik en liet een onvolkomen wit zetzal vallen; des nagts vermeerderde de hoest, en 'er volgde een symptomatisch zweet. — Den tweeden dag vermeerderden alle de toevallen, vooral de braking, en veele braakten van zelfs veel slym, met zeer veel verligting. Den derden dag verdween de koorts reeds en 'er volgde een zagt aangenaam verliggend zweet, en een gescheiden wit water, waardoor de ziekte volkomen geeindigd wierd. — By sommige waren flegts geringe tekenen van koorts, maar by alle het gevoel van drukking op de maag, en tekenen van verkoudheid. By andere waren alle toevallen van koorts zwaarder, en de koorts een remitterende catarrhaalkoorts. Sommige hadden alleen des avonds een aanval van koorts, welke des morgens afging met zweet en een zeer overvloedig wit zetzal in 't water. Deze hadden alle sterkere tekenen van koorts. Somtyds bepaalde zich de ziekte alleen tot het hoofd en de keel, en vertoonde een *angina serosa*, dan de walging en drukking op de maag, de korte duur der ziekte, en de genezing door een verliggend zweet, toonden genoegzaam dezelve natuur der ziekte. Niet zelden koos de ziekte stof de waterwegen, de maag of ingewanden, en veroorzaakte moeilyke waterlozing, pyn in de maag, een boord of doorloop, welke binnen drie dagen door

door een rheumatische urine, en een sterk zweet geoordeelt wierden.

De ziekte was dikwyls verzeld van een scherpe pijn in de borst, die de ademhaling belemmerde, intusschen luisterde dezelve niet na de gewoone middelen, had zulk een hevige koorts niet by zich, als de *pleuris*, en werd door zweet in weinige dagen geheel weggenomen. — Was de catarrhale koorts met een tuschenpozende verbonden, dan maakten de catarrhale toevallen de koorts zeer moeilyk, en deze bleeven de *intermittens* lang verzellen; dan wanneer zy eens overwonnen waren, kon men de koorts veilig met den koortsbast wegnemen.

Met opzigt tot de behandeling, beschouwde ik de ziekte als zamengesteld uit het rheumatische en gastrische, (als een *febris rheumatico-gastrica*) en hierom liet ik aanstonds een *decoc-tum aperiens laxans* gebruiken, 't welk in 't begin een ligte braking, en daarna veele flymagtige stoelgangen te weeg bragt, terwyl 'er des nagts een zeer verliggend zweet volgde. In de meeste gevallen was geen ander geneesmiddel nodig, en binnen drie dagen werd de zieke daar door hersteld. Was de walging sterker, dan gaf ik de *ipecacuanna* in kleinere giften en hierdoor werd zeer dikwyls de hoest weggenomen. De aderlating was zo schadelyk, dat daar door aanstonds de benauwdheid, en de iteking der borst, ja zelf de koorts aanmerklyk vermeerderde. By eenige zwangere vrouwen liet ik een ader openen, om dat zy meer oppresie, sterker hoest, en een harder pols hadden, deeze egter bleven veel erger en langer ziek. Ik heb

naderhand, niet tegenstaande een plaatslyke pyn en benaauwdheid op de borst een aderlating scheenen aan te wyzen, dezelve niet in 'twerk gesfeld, maar op de pynlyke plaats een warme pap gelegd, en tegelyk een openende drank met *Manna* en *sal polycr.* rykelyk laten drincken, waardoor de ziekte na voorafgaande behoorlyke ontlastingen door een goed zweet gescheiden wierd. In 'tbegin der ziekte heb ik nooit aanstonds spaansche vliegen gebezigd, maar zo dikwyls 'er een kittelende hoest overbleef, welke vooral des nagts lastig zynde den slaap belettede, liet ik een groote spaansche vlieg tusschen de schouders leggen, welke niet alleen de hoest verminderde, maar ook een goede ophoesting gaf. Wanneer de ziekte na het einde liep, liet ik gedurende verscheide dagen zagte uitwaasemende middelen gebruiken, welke de fynere overblyvende stof langs den weg der huid loosden. Bittere middelen voldeden my zeer wel om een instorting voor te komen.

Opiaten vermeerderden den hoest en de koorts, en maakten de ziekte hardnekkiger. Maar byaldien de hoest en heeschheid langdurig wierden, en de borst door een spasmodischen hoest, die diep uit den buik scheen te komen van tyd tot tyd krampagtig werd samengetrokken, was de *opium* met *castoreum* en *tinct. Succini* zeer heilzaam.

Wanneer de zieken niet aanstonds zich te huis hielden, en zich van de vrye lugt wagteden, waren zy veel erger ziek, en hadden een veel zwaarder koorts. Het te vroeg uitgaan was zelf zo nadelig, dat zy den zelven
dag

dag reeds weder instorteden, zy wierden op eens overvallen door een zwaare oppresie die een onmiddelyke stikking dreigde, met zwaare pyn boven de oogleden, benaauwdheid, en een snelle en gespannen pols. Een kleine aderlating scheen in dit geval goed te doen, niet tegenstaande het bloed niet ontstoken was; maar een clysteer, en een buikzuiverend middel, bragten een onmiddelyke verligting te weeg.

Offchoon de ziekte het meest by mans en vrouwen van middelbaren ouderdom gezien wierd, en over het algemeen de kinderen scheen te sparen, wierden deze egter, by aldien zy de ziekte kregen, zwaarder aangetast. Zy kregen wel dra een waare ontstekingagtige peripneumonie, welke voor een tyd door aderlatingen verligt wierd, offchoon het bloed alleen met een *crusta rheumatica* bedekt was. 'sAvonds wierden zy door een aanval van droogen hoest, met oppresie en benaauwdheid aangetast, met een hevige koorts, welke door een aderlating moest weggenomen worden. Emollierende dranken, spaansche vliegen tusschen de schouders, clysteren en *laxantia* genazen ze alle.

De ziekte was voor geen van myne lyders doodelyk, offchoon by veele zwaare toevallen plaats gehad hebben.

Een *delirium ferox* met toevallen van *epilepsia apoplectica* door schielyke gramschap ontstaan, genas ik, na aderlatingen en spaansche vliegen, door campher met *opium* en azyn, welke na een ruim zweet, en galagtige ontlastingen de ziekte geheel wegnamen.

November.

De W. wind bleef met regen en zagt weêr geduurende de eerste dagen van November voortgaan, van den 4 tot den 7 hadden wy schoon helder weêr met een O. of ZO. wind, des nagts vorst. Den 7 en 8 miste het sterk, van den 9 tot 11 bleef de stinkende koude mist aanhouden met W. wind. Den 15 ZW. met zoelen regen. De drie volgende dagen stormen en regenbuijen uit het W. en NW. welke nu meer, dan minder aanhielden tot den 24. 'Er volgde den 24 helder weêr met vorst tot den 28, de wind N. of O. Den 28 wierd de wind ZO. met dooy weêr en mist tot het einde der maand.

De *catarrhus epidemicus*, die de voorige maand zo algemeen geweest was, bleef nu nog aanhouden; de ziekte scheen nu egter een ernstiger keer te nemen. De benauwdheid was groot, de hoest zeer droogen kittelende, zonder de minste opwerping, by zommige was een plaatslyke pyn in de zyde, by anderen begon de ziekte met een hevige koude koorts, waarop hitte en zweet volgde, de kenmerkende drukkende pyn in den hartkolk was altyd by deze ziekte tegenwoordig, de pols was snel en week, de tong wit of geel, 'er was walging, het water was zeer diep gekleurd, helder of ook bezonken. De ziekte was over het algemeen sterker, hardnekkiger en langduriger. Zomtyds was zy met een plaatslyke zinking

king op de borst, de keel, of de ingewanden verbonden.

In het behandelen dezer ziekte begon ik met het zuiveren der eerste wegen door resolverende dranken, door *Manna*, *Tamarinde*, *oxymel*, middenzouten &c. wanneer de natuur of na boven, of na beneden een menigte galagtige slymstoffen ontlastte, of ten minsten de stof zodanig beweeglyk maakte, dat dezelve door kleine giften *Tart. Emetic.* gemaklyk ontlast wierd. Over het algemeen heb ik niets in deze ziekte zodanig zien voldoen, als de kleine en aanhoudend toegediende giften der braakmiddelen, zonder welke de overige middelen weinig dienst deden. Zomtyds egter was de benaauwdheid en de doorloop des bloeds door de longen zodanig moeilyk, dat men verpligt was een ader te openen. Het bloed was dik, galagtig, zonder wey, doch ook zonder de minste korst. Intusschen wierd dezelve meest vrugtloos en verkeerd in 't werk gesteld, wanneer 'er een scherpe stekende pyn in de borst plaats had; de aderlating nam deze pyn niet weg, maar een spaansche vlieg, zo na mogelyk aan de plaats der pyn aangelegd.

'Er was geen maand, waarin zo veel *rheumatisimi* en rheumatische koortsen waren, als deze. By zommige waren 'er eerst tekenen van verkoudheid, by andere begon de rheumatische pyn met zwellling en roodheid van het deel aanstonds met de koorts, terwyl wederom by andere de koorts by de plaatstlyke *rheumatismus* bykwam.

Over

Over 't algemeen was de ziekte in haar eerste begin zeer inflammatoir, het aangedane deel was zeer rood, gespannen, pynlyk en kloppende, zo dat 'er herhaalde aderlatingen en weekmakende pappen vereischt wierden om dezelve weg te nemen. Hier door het ontstekingsagtig tydperk overwonnen zynde, begon de koorts remitterende en *gastrisch* te worden, terwyl de verheffingen des avonds aankwamen, en des morgens wederom met een vettig, en niet verliggend zweet, nalieten. De tong werd geel, het water dik, 'er was walging en alle andere tekenen van onzuiverheid der eerste wegen. Kleine giften van braakmiddelen, openende en buikzuiverende dranken ontlafden veel galagtige slym, en maakten, dat de pyn van de een na de andere plaats telkens verschietende, eindelyk verdween. Deze *rheumatismus* verdroeg geen *opium* of *pulvis doveri*, maar na een vry langdurig gebruik van *laxantia* waren pillen van *gum. guajac.* met *sulph. aurat.* en *rheum* zeer geschikt. De overblyvende styfheid der ledematen en vliegende pynen, wierden door campher met *sal. volatile C. C.* en bittere extracten weggenomen. De spaansche vliegen deden in den beginne hierom nadeel, dewyl zy de *fomes gastricus* en de koorts vermeerderden, en dus middelyk de ziekte voedden.

Offchoon 'er weinig heldere koude was, voegde 'er zich egter hier en daar een weinig ontsteking by de *morbi rheumatici*, vooral by die geene, welke natuurl'k daar toe weinig geschikt schenen. Vooral waren 'er

veele vrouwen, die een *inflammatio testis par-ticulae pulmonis* hadden, een ziekte zo wel door STOLL beschreven, en die helaas nog zo dikwyls door onze geneesheren, als een ligte verkoudheid tot schade der lyders behandeld word.

De kraamvrouwen, vooral die voor 't eerste kraamden, hadden een langdurig en moeilyk kraambed.

Een jonge, sterke, gezonde vrouw, kraamde voor 't eerst moeilyk na langdurige valsche pynen, de nageboorte was zodanig vast vereenigd met de lyfmoeder, dat de vroedmeester genoodzaakt was dezelve voorzigtig met de vingeren af te pellen. Den volgenden dag was de kraamvloed gering. Op den derden dag kwam de zogkoorts, en de kraamvloeide sterk. Den vierden dag bleef de koorts voortduren, en hierom was ik verpligt, door een clysteer en een manna drankje, den buik te openen. Op den 6 dag kreeg zy een geregelde koorts met koude, hitte en zweet, waarna zy door middel van een clysteer veel oude stoffen loofde. Op den 8, 10, 12, dag kwam de koorts weder, doch nu verzettede zy zich op den 13; terwyl de eetlust wederkwam, en de urine afzettede. Dewyl de koorts nu geregeld op den 15 terug keerde, gaf ik den koortsbast. Den 17 was zy zeer slaprig en het zog verdween langzaam, egter keerde het langzaam onder het gebruik van kina weder; niet te min bleef 'er zeer lang een groote snelheid van pols en zwakheid over.

Ik ben lang van begrip geweest met de
mees,

meeste hedendaagsche vroedkundigen, dat men de nageboorte niet terstond na de kraam behoorde aftehalen. Dan ondanks de redenen door den Heer VAN DER HAAR (Bataafsch genoodf. 6. d.) RUISCH en CAMPER hier voor ingebracht, ben ik, en met my veele kundige vroedmeesters, van myn gevoelen te rug gekomen, en raade nu om zo het mogelyk is, dezelve niet te lang te laten zitten. Immers heb ik een en andermaal gezien, dat 'er by het agterblyven der *placenta*, zonder dat daaraan eenig geweld gedaan was, de kraamvloed te rug bleef, de lyfmoeder hard wierd, een sterke inflammatoire koorts gebooren wierd, welke zeer spoedig in een *gangraena uteri* en den dood overging. Meer dan eens zag ik, dat de *placenta* agterblyvende, na twee of meer dagen met klonters bloed wierd uitgedreven, dat zo wel de *placenta* als de *grumi*, welke tegelyk ontlast wierden, bedorven en zeer stinkend waren, de kraamvloed weinig was, en dat 'er langen tyd een dunne stinkende stoffe geloosd wierd. Dat deze dunne etteragtige stof in 't bloed opgenomen, een soort van *febris lenta naturae putridae* veroorzaakte, en op den 20 of 22 dag eindelyk nog dodelyk wierd.

In deeze zelve maand heb ik een kraamvrouw aan *rheumatismus acutus* gehad, welke door zagte *involventia* en *diaphoretica* met een weinig *opium* gemengd, herstelde.

Wanneer in het verder beloop der maand het weer stormagtig, vogtig en koud wierd, waren de *rheumatische* ziekten menigvuldiger, en kwamen nu onder de gedaante van tand- en oorpy-

nen en zeere keel menigvuldig voor. Zy waren egter alle min of meer met een remitterende *febris gastrica* gepaard.

De *influenza*, die nu eenigen tyd verminderd was, hefte nu ook wederom het hoofd op. De borst wierd nu daar door sterker aangetast, de oppresie was grooter, en de zieken gevoelden nu meer stekende pynen in de zyden, en een zekere hitte in de borst. De aderlating deed nu meerder nut, en het bloed had een dikke zamengesrokken korst. De *influenza* verzuimd zynde, kreegen de zieken een zeer gevaarlyke *pleuritis rheumatico-inflammatoria*, waarin aderlatingen, en daarna spaansche vliegen, maar byzonder het *oleum lini* nut deden. Op het sterk aanprijzen van THILENIUS heb ik in deeze ziekte een *infusum* van de *radix senega* gegeven. Dan de hitte en vermeerdering der koorts, welke daardoor spoedig verwekt wierden, deden my overtuigend zien, dat dit prikkelend middel geheel ongeschikt is om de *dispositio sanguinis inflammatoria* weg te neemen, daar het integendeel zeer nuttig is om in die gevallen gebezigd te worden, waarin een dikke taaije slym de longen verstoppt, en een genoegzame veerkracht aan dit ingewand ontbreekt, om zich van deeze stoffen te ontdoen.

Ik heb meermalen gezien, dat zwangere vrouwen in de laatste maanden van haare zwangersheid, schielyk en zonder uitwendige oorzaak een geelzugt krygen. Offchoon de vrouwen op dit oogenblik in een gevaarlyk tydpunt van haar leven verkeeren, is deeze geelzugt, ook volgens de herhaalde waarneeming van BURSERIUS,

niet

niet gevaarlyk. De ziekte, welke uit een drukking der lyfmoeder op de lever en deszelfs ontlastbuis voortspruit, laat dikwyls geene genezing gedurende dezen tyd toe, en word aanstonds na de kraam, door het wegnemen der oorzaak, geheven. Intusfchen kan de in het bloed opgenomene gal een koorts doen geboren worden; en dat zelve vogt, 't welk in de galblaas, en de *ductus hepatici* opgehoopt is, kan hierdoor fcherp worden, prikkeling, pyn en ontsteking in deeze deelen te weeg brengen; het gebrek aan gal in het *duodenum* en de andere ingewanden, kan niet alleen de natuurlyke neiging der kraamvrouwen tot zuur merkelyk vermeerderen, en daardoor een fterke hardlyvigheid veroorzaaken, maar ook andere aanmerkelyke ongemakken te weeg brengen.

Een zwangere vrouw van een droog en galagtig geftel, kreeg op de agtste maand een fterke jeuking en rood uitflag over de geheele huid, haar mond was bitter, zy had pyn door de leden en koorts. Na het gebruik van zachte *laxantia* wierden de huid en oogen geel, zy klaagde over een fpannende pyn in de regter zyde, haar water was groengeel, de pols hard en snel, de pyn week voor een aderlating, en voor verdunnende en verkoelende dranken. Egter keerde de pyn den volgenden dag weder, de huid was geeler, de ontlasting grys, en de keel zeer flymagtig. Dewyl zy na het gebruik van *clysmata* en zachte *laxantia* geen ftoelgang kreeg, gaf ik haar een openend *decoctum* met een weinig fennebladen, hierop ontlastte zy veele harde afgangen, die welgekleurd waren. Dit middel hield

den buik dagelyks open, en de geelzugt vermin-
derde. Niettemin kwamen 'er onverwagt pynen,
en de vrouw verlostte van een kind, 't welk geen
t-kenen van geelzugt had, doch des anderen daags
aan hevige stuipen stierf. Alles schikte zich met
deze kraamvrouw wel, en op den derden dag
kreeg zy een behoorlyke zogkoorts, waarna een
geel en met gal besmet zog uit de borsten ont-
last werd. Zy herstelde door het gebruik van
resolverende extracten.

Na den 24. werd het weer geheel veranderd
en koud, gedurende dit vorstig weer, vermeer-
derden de *rheumatismi acuti*. Omtrent den 27.
werd het weer mistig met O. wind. Wy had-
den toen veele *anginae inflammatoriae*, de
amandelen waren hier geheel riet aangedaan,
maar alleen het *palatum molle* en *uvula*, dee-
ze waren zeer rood en pynlyk, de zieken had-
den daarby een *febris acuta inflammatoria*; de
ziekte ging in drie dagen tot *suppuratie* over,
dan meestal werd de hand des heelmeeesters
vereischt om deeze afteesfen te openen, eer dat
zy volkomen ryp waren, dewyl een langer uit-
stel een stikking zoude te weeg gebragt heb-
ben. Dit was een ware *angina inflammatoria*,
die hier zeldzaam is, zy had haar zitplaats niet
in de klieren, maar in de vleefige deelen der
keel, en suppureerde daarom spoedig. Onze ge-
woone keelziekten zyn meest rheumatisch, heb-
ben haar zitplaats in de amandelen, en zyn lang-
duriger, offchoon zy zelden tot een volkomene
suppuratie overgaan.

December.

In het begin deezer maand hadden wy vorst met O. wind, en zeer koud weer. Wanneer de wind den 4 na het Z. liep, kreegen wy fchielyk een warmen reegen en stormbuijen. Van den 7 tot den 11 kreegen wy storm uit het N. en NW. met zeer kouden regen, de wind wierd toen ZW. en het weer iets warmer, den 16de en 17de ZO. den 18 en 19 ZW. van den 20 tot het einde der maand NW. Van den 4 tot het einde der maand hadden wy niets als regen en storm.

Gedurende de eerste koude dagen waren veele menschen verkoud en heesch.

Een byzondere soort van zinkingagtige zee-re keel vertoonde zich by verscheide menschen. Deeze ziekte was niet zeer hevig maar uitermaten lastig en langdurig. Het was een *angina pharyngea*, waarvan dit het beloop was.

's Avonds kwam 'er een aanval van koude koorts, gevolgd van brandende hitte, waarby zich aanstonds voegde een zekere ruuwheid in de keel by het slikken, het aangezigt en de hals waren gezwollen, en uitwendig aan de hals konde men gezwollene klieren gewaar worden. Diep in de keel zag men niet alleen de amandelen rood en opgezet, maar overal zag men diep in de keel veele kleine roode opgezette kliertjes, welke in het slikken zeer veel pyn gaven. Na den derden dag waren alle tekenen van koorts reeds verdwenen, de tong was zuiver en vog-

tig, en de eetlust zeer goed. Zy verdroegen gene adstringerende gorgeldranken, maar emollierende en slymagtige dingen, en de damp van warm water, het vryven van den hals met het *linimentum volatile*, purgeermiddelen, en des avonds het *serum lactis vinosum*, bragten de meeste verligting aan. De ziekte, welke ook vooral deszelfs catarrhale natuur daardoor verraadde, dat zy met verkoudheid gepaard, of de eene ziekte in de andere overging, was ook somtyds hardnekkig en langdurig.

Wanneer de vorst in een zagte dooy overging, hadden wy veele verkoudheden, die verwaarloosd zynde, in een catarrhale koorts overgingen. By een jong scorbutisch mensch wierd deze koorts kwaadaartig en eindelyk dodelyk. In het eerst was de verkoudheid eenvoudig en zonder koorts, en hierom bleef hy met dezelve uitgaan, en zich aan 't guure weêr bloot stellen. Eindelyk kreeg hy zwaare pyn in 't voorhoofd, roode oogen, een drogen hoest en benauwdheid op de borst, pyn door alle leden en 's avonds een vry hevige koorts, het water was zeer dik, de tong wit, en de pols snel. Na dat men een aderlating, spaansche vliegen en openende en losmakende middelen had toegediend, wierd de koorts heviger met yling en verhefte twee maal in 24 uren met koude, en schein met zweet te remitteren. Op den elfden dag wierden de toevallen meer bedenkelyk, de yling heviger in de verheffingen, de ademhaling moeilyker, en de pols meer krampagtig, ik oordeelde daar

daarom nodig de campher te geven. Op den 13 dag vertoonde zich aan de lippen en in den mond stippen van witte spruw, de urine was moeilyk en 'er kwam een zekere beving by. Op den 14 was 'er buikloop, veel sereuse urine, en de geheele keel droog en spruwagtig. Men gaf toen een afkookzel van koortsbast, hierna wierd de tong vogtiger en de koorts, minder. Den 16 was de tong droog en vuil, opspringingen der peesen, de pols intermitterende, de buik gespannen. Deze convulsive bewegingen vermeerderden van tyd tot tyd, en hy stierf den 17 dag. Deze ziekte was in 't begin eenvoudig catarrhaal, op den agtsten dag kwamen 'er tekenen van *typhus nervosus*, welke ik door campher zocht weg te nemen, dewyl de ondervinding my geleerd had, dat de koortsbast te vroeg in deeze koortsen gegeven, de huid en tong droog maakte, en de hitte vermeerderde. Op het laatst egter was ik genoodzaakt tot dit middel mynen toevlugt te nemen, dewyl 'er een groot verval van levenskrachten kwam. In dit tydperk was het ook zeer merkbaar, dat de koortsbast, de campher en wyn, de tong vogtig maakten. 'Er waren geheel geene *symptomata putrida*, de *urina stranguriosa*, welke op den 4den dag wierd waargenomen, toonde een poging der natuur om de ziekte te scheiden. Op den 13 poogde dezelve een bezinkzel in 't water te vormen, dan dit was een vergeeffsche poging, dewyl de krachten te veel vervallen waren. De *aphthae* waren hier niet waare *aphthae criticae*, offchoon
'er

er na het verschynen derzelve een mindere ophoping na de borst was, zy waren wit en gescheiden, maar zy kwamen niet uit de keel, zy waren niet doorschynende, en verliggende, men kon dezelve eer als *miliaria* beschouwen, welke hier en daar in den mond onder den naam van spruw voortkwamen.

Met opzigt tot de spruw, heb ik in myne practyk daarvan verschillende soorten opgemerkt, welke alle in aart verscheiden zynde, een verschillende behandeling vorderden. De spruw by jonge kinderen schynt thans niet zo menigvuldig te zyn, als in voorgaande jaren. Deze schynt niet van een zuur geworden zog af te hangen, dewyl de kinderen, die niet zuigen, en pap eeten, ook dikwyls spruw krygen. Alle ophopingen van zuur, slym en onverteerd voedsel, geven spruw, en deeze houd op, zodra de oorzaak word weggenomen. De *Ipecacuanna* en de *Tinctur antimonii Huxhami* zo zeer door ARNEMAN aangeprefen, kunnen, door de maag onmiddelyk door braken daarvan te ontlasten, hier zeer veel nut doen, purgeermiddelen werken langzamer, en behagen gewoonlyk meer aan de moeder en minnen, en ik heb dezelve ook meermalen met zeer veel vrugt gegeven. Alle stroopen doen nadeel. De *borax* neemt wel de spruw, maar geenzints deszelfs oorzaak weg. Om de spruw te verzagten, liet ik de kinderen dikwyls een eyerdojer met regenwater en suiker gemengd nemen, dewyl dit door deszelfs inwikkende en seepagtige kragt de slym ontbind, en het zuur

in

inwikkelt, hierom laat ik heurtlings het zelve met een rhabarber drankje verwisfelen. In veele zwakke kinderen heb ik de spruw zonder purgeermiddel alleen door een eyerdojer overwonnen. Zomtyds voegt zich de spruw by tanden of koortfen van kleine kinderen; de spruw is dan meest een zeer lastig toeval, en ik heb de *borax* in dit geval veel nut zien doen.

De spruw by volwasfenen is van een geheel anderen aart. Zy is een toeval van koortfen, en of fymptomatisch of critisch. Ik heb dezelve nooit dan op een *dies judicatorius*, zelf in het begin der ziekten, gezien. De catarrhale koortfen, die eenigfints kwaadaartig zyn, en een foort van roosagtige ontfteking by zich hebben, hebben dikwyls spruw by zich, en zeeker moet men dan met de ontlastingen voorzigtig zyn, offchoon dit ook wel eens een uitzondering hebbe: gewoonlyk zyn zy eenigfints critisch, en verliggende, en toonen dat 'er een *crisis per evacuationem serofam* op een andere *crisis* dag volgen zal. De spruw, die vroeg by de catarrhaal koortfen komt, verheft zich om den anderen dag, en heeft gewoonlyk een groote zwakheid by zich. Ik meen dezelve meer by lieden van hoge jaren, dan by jongere menfchen te hebben waargenomen. De spruw, die goed en waarlyk critisch was, heb ik genoegzaam altyd op den 17 dag zien koomen, wanneer zy wit, doorschynend en zuiver, onder uit de keel kwam, en zich geregeld tot voor aan in den mond, en tot op de lippen voortplantte.

In

In alle spruw heb ik my onthouden van veel ontlastingen te bevorderen; ik zag by een oud man een *metastasis* na de borst gebeuren, die doodlyk wierd, door een zeer eenvoudig laxeerdrankje.

Ik heb altyd door emollierende mondspoelingen, en een warme pap om de keel te leggen, getragt, deeze heilzaame uitbotting te bevorderen. Inmiddels kan ik met VAN SWIETEN zeggen, dat de spruw zeer wel den koortsbast, ja zelf de *serpentaria*, *moschus* en campher verdroeg, en dat ik door de levenskrachten op te beuren, uitstekend deeze heilzame poging der natuur bevorderde. Gewoonlyk wierd hierdoor een volkomene *crisis*, door gebondene stoelgangen, en een dik water, op den 20 dag te weeg gebragt.

Nimmer zag ik spruw van een ophoping van kwade stoffen in de eerste wegen, of van een verwaarlosing van behoorlyke en tydige ontlastingen, ontstaan. Zomtyds heb ik in de *febris aestiva* en *dysenterica* op het einde der ziekte zwarte drooge stinkende spruw zien opkomen, welke met andere zeer slegte toevallen gepaard, een voorbode des doods was.

Eindelyk heb ik te voren een chronische spruw waargenomen, waarvan KETELAER, BOERHAVE en GRANT ook gewag maken, dan wy vinden daarvan als een endemische ziekte het beste verslag in HILLARY die dezelve op 't eiland BARBADOS menigvuldig opmerkte, in het werk, 't welk alzints opmerklyk en lezenswaardig is (*observ. on the changes of the air & the concomitant epidemic*
dis-

diseases in the island of Barbados by W. HILLARY p. 276 tot 297.) Deeze spruw schynt ook van een catarrhalen oorspronk te zyn, en van een belette uitwaasfeming af te hangen, zagte *emollientia* en *diaphoretica*, genezen deeze ziekte het best.

De *aphthae* der ouden, of de roode zweertjes des monds met een wit stipje in 't midden, welke gemeenlyk voortlopende zyn, heb ik meest al by kinderen in den zomer epidemisch zien heerschen. Deze verschillen van *ulcera scorbutica*, en hebben egter daarmede zeer veel overeenkomst, zy schynen uit een catharrhale ongesteldheid, te gelyk met een phlogistische dispositie te ontstaan; een antiphlogistische geneeswyze, en zuure mondspoelingen scheenen hierin het beste te voldoen. Ik heb diergelyke zweeren ook in *febres catarrhales gastricae* gezien, dan offchoon zy met *ulcera scorbutica* de naaste overeenkomst hadden, waren zy pynlyk, minder uitgebreid, geelagtig en spekkig, en weerstonden alle *collutoria antiscorbutica*. Na het zuiveren der eerste wegen voldeed hier de koortsbast het best.

Van den 8 tot den 11 vermeerderde de N. wind de rheumatische ziekten, zodat 'er veele *febres rheumaticae*, *rheumatismi* en hoesten waren.

Den 11den begonnen de stormen en plasregens, die byna zonder ophouden voortduurden en in 't begin van een ZW. warmen wind verzeeld wierden.

De *rheumatismi* waren, zelf in sterke en volbloedige menschen, niet zuiver inflammatoir, maar

maar waren met een *febris pituitosa gastrica* gepaard. By minder sterke lieden, waren wel in 't begin toevallen van ontsteking, die door een lating moesten weggenomen worden, maar de voornaamste ziekte was by allen een flymkoorts. Alle de zieken hadden een remitterende koorts, welke des avonds sterk verhefte, des nagts het hevigste was, en tegens den morgen in een sterk, niet verliggend, zuur sweet overging; het water, het welk in het begin dik was, wierd daarna helder, de stoelgangen waren dun en flymagtig, de tong papagtig en geel, de geledingen waren gezwollen, maar de zwelling was niet rood, maar bleek en wateragtig, en niet pynlyk op het aanraken. De zwelling en pyn verwisfelden dikwyls van plaats, en bezetteden dan het hoofd, dan wederom de borst en de ledematen. De ziekte was verdrietig, langdurig en vermagerde de zieken sterk. De aderlating was slegts in het begin van dienst, de spaansche vliegen bragten een zeer kortduurende verligting te weeg. De uitwaasfemende middelen als de *antimonialia spir.* Minder &c. vermeerderden de koorts en de icherptheit der vogten. By eenen lyder zag ik op den 13den dag witte geerstuitflag, en daarna groote blafen op de borst, die in 't begin schenen te verligten, dan hoewel zy lang duurden en veel ongemak veroorzaakten, verminderde de ziekte niet. De koortbast met de *sarsaparilla* deden zeeker een goede uitwerking om de kragten te onderhouden, dan de ziekte zelf verdween langzaam, zonder merkbare *crisis*.
de

De melkdiët, en koortsbast herstelden daarna de verlorene levenskrachten.

De netelroos, verkoudheden, *colicae rheumaticæ*, *angina*, *parotides* waren hier en daar te zien. De *scorbutus* of *stomacace* was vrij algemeen; 'er was een bezwaarende en drukkende pijn in 't hoofd, een traagheid tot alle beweging, het tandvleesch was rood en gezwollen, daarna week en sponsagtig, de tanden waren met etter omgeven, en zaten los in de kassen. Over het geheele lichaam waren blaauwe vlakken verspreid, op de beenen waren de aders uitgezet en vol spatten, en des nagts was 'er een zwaare pijn in de beenen. De *stomacace* was een toeval van de scheurbuik des geheelen lichaams, dewyl gedurende de aandoening des monds, alle de toevallen in 't lichaam zelve op het hevigste waren, en daardoor niet verligt wierden. Ook dwalen na myn inzien die gene, welke de scheurbuik als een ziekte der eerste wegen beschouwen, dewyl de eetlust en spysverteering, gedurende deeze ziekte, gewoonlyk zeer goed zyn. Ook helpen de eigenlyk gezegde maagmiddelen in deeze ziekte niet, maar zulke dingen, welke de byzondere alcalische scherpte wegnemen. By zommige genas eenvoudig citroensap den mond zeer schieelyk, by anderen was ik verpligt het *unguent. Aegyptiacum*, in lepelblad of saliewater ontbonden, als mondspoeling te geven. Het *cerevisia antiscorb. Sydenhami*, de koortsbast en vooral het *elix. vitrioli* deden inwendig het meeste nut. Intusschen moet men alle oplettenheid gebruiken om de scheurbuik wel

ten onderscheiden, dewyl in volbloedige en sterke menschen de scheurbuik meer heet, en als van een impure inflammatoiren aart kan zyn, daar zy in tedere en magere gestellen meer na het tegenovergestelde over slaat. By de eerste zyn dus zuure dingen en *spir. vitrioli*, of *sp. salis.*, by de laatste *amara sinceriora* en zomtyds *aromatica* nuttig.

Omtrent het midden van December begon de scharlakenkoorts zich hier en daar te vertonen. Een jongman van 30 jaar kreeg op den 27 deezer maand koude en rilling, benauwdheid, walging en braaking van slym, de keel was rood en pynlyk, de tong wit: ik gaf hem een braakmiddel. Nadat hy met veel verligting gebrakt had, wierd het wesen en het geheele lichaam rood, de keel was ontstoken en de amandelen gezwollen, de oogen waren rood, de pols hard en snel, hy was zeer heesch, en de tong beslagen. Ik liet een ruime aderlating doen en een *Dec. aper.* met *manna* geven. Het bloed was rozenkleurig en iets ontstoken, de koorts was sterker, de urine rood, de amandelen ontstoken en bedekt met een geulcereerde korst; een pap van mostert en zuurdeeg, en een verzagtede gorgeldrank wierden van het begin af aan voorgeschreven. Na een ongedurigen nacht was de koorts den derden dag minder hevig, de keel vryer, maar de borst heesch en raauw, hy had walging en dunne afgang; het water was rood, dik en slymagtig. 's Avonds was de koorts sterker, de pols voller, en een zagte uitwaasfeming; des nagts wierd de zieke onrustiger, de pols snel.

sneller, en 'er kwam een gedurige neiging tot braken met een inwendigen brand, terwijl de uitslag staan bleef. Na het geven van een verzagkend clysteer, en het toedienen van een emulsie met *syr. Diacod.* bedaarde de braking, en hy had een rustigen nacht, intusfchen had hy geweldige pyn in 't slikken, de scharlaken uitslag had zich meer over het lyf en beenen verbreid, het water was als bruin bier; ik liet een spaansche vlieg tusfchen de fchouders leggen. Hierop volgde een goed zweet en verligting in de keel. Den 5den dag was de keel purperrood, en de tong groen beflag, aan de linker zyde was een diepe zweer, die groene etter gaf, de uitslag wierd bleeker en de braking hield op. Den 6den dag kreeg hy des nagts koorts met yling, terwijl de uitslag verdween, en de keel droog en rood zag. Na het toedienen van een *decoct laxans* bedaalden deeze toevallen, terwijl de uitslag den volgenden dag zich wederom vertoonde. Den 7den dag was hy flaperig, maar by zyn verftand, des avonds had hy koortsverheffing. Den 8 kreeg hy gekookte ftoelgangen, gevolgd van een fterk zweet, waarna de uitslag verdween, en nu tragtte ik door rhabarber en *Tra. ant Hux.* de uitwaasfeming en den buik open te houden, en hield hem lang buiten de lugt.

Ik heb deeze ziektegefhiedenis hier alleen zo breedvoerig opgegeven omtetoonen, dat deeze zwaare ziekte zeer wel na de eenvoudigfte behandeling -luifterde. Deeze ontftekingziekte wierd in 't begin antiplogiftisch behandeld, op den 3den dag wierd een *symptoma terrens* door

een eenvoudig verkoelend *anodynum* weggenomen. Op den 4den dag gaf ik geen *cortex* of *acida mineralia*, ofschoon de keel purperagtig zag. Ik maakte de ziekte door deeze middelen niet kwaadaartig, en liet dezelve byna aan de natuur over, en myn zieke herstelde in agt dagen.



L Y S T

D E R

G E S T O R V E N E N

In 's GRAVENHAGE

I N D E N J A A R E 1792.

<i>January</i>	.	.	.	100
<i>February</i>	.	.	.	89
<i>Maart</i>	.	.	.	96
<i>April</i>	.	.	.	104
<i>Mey</i>	.	.	.	81
<i>Juny</i>	.	.	.	82
<i>July</i>	.	.	.	83
<i>Augustus</i>	.	.	.	84
<i>September</i>	.	.	.	72
<i>October</i>	.	.	.	84
<i>November</i>	.	.	.	104
<i>December</i>	.	.	.	106

Totaal

1085

K 3

WEERS-

WEERSGESTELDHEID

EN

ZIEKTEN

VAN

's GRAVENHAGE,

van 't Jaar 1793.

January.

Van het begin van January tot den 5 bragt de N. wind een heldere vorst aan, hierop volgde storm met sneeuw en veranderlyk ruuw weêr tot den 12, de wind NW. Na de nieuwe maan hadden wy een ZW. wind met een zagten reegen tot den 14. Toen hervatte de koude N. wind weder met vorst en sneeuw tot den 16, het weêr wierd daar na helder tot den 20 met vorst. Van deesen dag af tot het eind der maand was de wind W. met mist en donker weêr.

De roodvonk wierd nu meer epidemisch, en 'er stierven drie kinderen aan deszelfs gevolgen. Een kind kreeg naderhand een sterke neusbloeding, daarna een ontlasting van bloed

bloed uit het oor, eindelyk waterde het ook bloed, en stierf. Een ander kreeg een verzwering in de long en stierf uitgeteerd.

Door den langdurigen zagten regen, verzwakten de vaste deelen des lichaams, de vogten verloren hare behoorlyke menging, de uitwaasfeming wierd ongeregeld, en de scherpe deelen, welke van dezelve moesten afgescheiden worden, bleven met de vogten vermengd, hier uit ontstond eene byzondere *dyscrasia humorum*, welke by de kinderen vooral zeldzame toevallen gaf. 'Er wierd door de bykomende vorst eene *febris inflammatoria* verwekt, welke een soort van *scorbutische* scherpte by zich had, en dus een *inflammatio impura* te weeg bragt. Deze *scorbutische* gesteldheid was niet alleen by kinderen, maar ook by volwasfenen zichtbaar, 'er was een loom en traagheid, blaauwe vlekken over het geheele lichaam verspreid, *scorbutische* zweeren in den mond, dorst, terwyl de eetlust zeer goed bleef. Deze gesteldheid voegde zich meer of min by alle ziekten, en maakte hier door een zamengestelde ongesteldheid, welke door de natuur en geneesmiddelen moeilyker te overwinnen was. Op deesen tyd nam de inflammatoire gesteldheid wel de overhand, doch zodanig, dat zy de *scorbutieke* constitutie niet wegnam, maar daarmede gepaard zynde, een *morbus protheiformis* voortbragt. Van dezen zamengestelden aart waren de pleurissen, &c. *rheumatismi*, keelziekten, colieken, en koortsen, welke zo wel door my,

als de overige geneesheeren wierden waargenomen.

De koorts, die de *pleuris* vergezelde, was minder hevig, begon met geringe rilling, matige hitte, maar werd door een zeer scherpe pijn verzeld, de ophoefing was zuiver bloederig, de pols klein en zagt, en niet sneller dan natuurlyk. De lating verlichtte weinig, en 'er werd spoedig een tweede bloedontlasting gevorderd, het bloed had een dunne groene lymige korst, die doorschynend was, en 'er met de vingeren zeer gemaklyk konde afgeligt worden, egter was ze eenigfints omgekruld, de bloedkoek was zwart, stroopagtig, vloeibaar, als teer, en gemaklyk met de wey te vermengen. Na een of meer aderlatingen, pappen, en emollierende dranken met veel *oxymel simplex*, scheidde de ziekte zich niet door ophoefing, maar door een olieagtige dikke urine, welke een vetagtig zetzelt liet vallen, vergezeld van een kleverig zweet.

De peripneumonien waren van den zelven aart, langdurig, maar wierden tegelyk door ophoefing en dik water en zweet gescheiden.

— Veele hadden bloedspuwingen van dik zwart, veneus bloed, zonder hoest buiten de bloedspuwing, en het afgelaten bloed was, even als by de *pleuritici*, ligt ontstoken, maar scorbutisch. — By anderen zagen wy *colica*, *rheumatismi*, *podagra*, *adfectiones hystericae* en *hypochondriaca*. In deeze maand alleen sloegen zeven menschen, die zeer hypochondrisch waren, de handen aan zich zelve. — Veele stier-

sterven schielyk of aan beroerte, of aan een schielyken dood, zonder uitwendige of bekende oorzaaken.

February.

Het weêr was koud en vogtig tot den 12, wanneer 'er een ZW. wind waaide, tusschen beide had men den 13 een helderen dag, dan de ZW. wind stelde zich nu aanstonds weder in tot den 19, de wind was toen O. en wy hadden schoon weêr, maar den 20 kregen wy W. wind, ende de 2 volgende dagen N. wind met sterke koude, den 23 was de wind weder W. met regen, dan van dien tyd af hadden wy tot aan het eind der maand aangenaam helder en warm weêr.

In het begin der maand waren 'er veele *colicæ rheumaticæ*, zo als ik dezelve te voren beschreven heb. Ik heb verscheide van deeze *colicæ* gepaard gezien met een geregelde anderendaagsche koorts, en zy gingen daarna in een zuivere *tertiana* over. Tegelyk waren 'er veele andere *rheumatische* ziekten, welke door zagte openende middelen best geneezen vierden: gewoonlyk duurde de ziekte zeer lang, en zy herstelden eerst, wanneer 'er een zeer overvloedige pisyloed van een heldere strookleurige urine kwam. By enkele menschen heb ik de natuur zich spoedig zien redden door een grooten toevloed van dikke, zeer stinkende, taaye slymstoffen, na de ingewanden, welke door een diarhée ontlast wierden.

Offchoon 'er nu veele *colica rheumatica* waren, welke met de beschryving van STOLL (zie anno 1791.) zeer overeenkwamen, fcheen het als of de natuur elke ziektestof meer op de ingewanden bepaalde. Hier door greep de *inflammatoire constitutie* nu ook vooral de ingewanden aan. De *colica inflammatoria*, of *inflammatio intestinorum*, welke ik wel eens nu en dan gezien had, doch nimmer epidemisch heerschen, was nu zo algemeen, dat ik daar aan verscheide menschen te gelyk had.

De ziekte begon schielyk en onverwagt, vooral na dat het lichaam schielyk aan koude was blootgesteld. Zy nam haren aanvang, met walging, braking, en een zekere scherpe pyn, welke in de maag begon, en zich door den geheelen onderbuik langzaam verspreidde, de braking wierd aanhoudend, de dorst zeer groot, de tong wierd droog, de buik was zeer gevoelig by de minste drukking, zeer opgezet en gespannen, het water was zeer rood en helder, de pols was klein, ingetrokken en snel, het weefen bleek en samengetrokken, de handen en voeten waren koud, de ledematen en het hoofd waren pynlyk. Clysteren, *opium*, een aftreksel van camillebloemen, en alle andere middelen, die men in *colica spasmodica* toedient, en daar men zyn eerste toevlugt toenam, waren niet alleen vrugtloos, maar vermeerderden de pyn en braking. In het begin fcheen de ziekte zonder aanmerkelyke koorts te zyn, dan den eersten avond reeds kreegen de zieken een sterke rilling, waarop een branden-

dende drooge hitte volgde, zonder eenig zweet, de afgang was niet versloopt, integendeel hadden de zieken veele dunne stinkende afgangen, met hevige persingen. Zodra ik de natuur der ziekte kende, zag ik de noodzaaklykheid, van aanstonds ruime aderlatingen te doen. Het bloed was zeer ontstoken, zomtyds met een dikke rheumatische korst bedekt. De zagtste *laxantia*, de amandelolie met *cassia* zelf, wierden niet van de maag verdragen, maar ten eersten weder uitgeworpen, alle warme dranken veroorzaakten de onlydelykste pynen. Zeltzer water, met een weinig witten wyn, of koud gerste water, wierd nog het best binnengehouden. Verzagtende pappen op den buik gelegd, maakten de pyn wel iets draaglyker, dan de vryving des buiks met het *linimentum volatile cum camphora* bragt de meeste kalmte aan. Na een voorafgaande aderlating, was niets van een betere uitwerking, dan een geheel warm bad, waarin de lyder een half uur gelaten wierd. Hier door wierd de pyn op eens gestild, en de zieke raakte daarna in een zeer zagt verliggend zweet. Deeze ziekte was zeer halfstarrig en wierd van alle uitwendige oorzaken vermeerderd, en offchoon de zieken zeer verzwakt waren, bleef zy weeken aanhouden. Wanneer namentlyk de grootste kragt der ziekte door aderlatingen, emollierende pappen, het warme bad &c. gebroken was, bleef 'er een zekere plaatslyke pyn in den buik, welke vooral zich op die plaats in de regterbuiks holte deed gevoelen, daar het *ileum* zich met het *colon* vereenigd, deeze pyn strekte zich dikwyls tot aan de blaas uit,

uit, en hier door wierd een moeilyke pislozing veroorzaakt, waar door een dikke, flymagtige en met een dik rooferood poejer bezwangerde urine ontlast wierd. De stoelgang wierd nu ook verftopt, en daar alle *laxantia* en *clysmata* &c. de zeer gevoelige ingewanden zeer prikkelden, veroorzaakte deeze hardlyvigheid een zeer groot ongemak. De *oleosa*, de *oleum ricini* &c. wierden aanftonds weder uitgeworpen. By een tedere en aandoenlyke vrouw, die door dit colyk zeer hevig wierd aangetast, kwamen de *menfes* op den 4 den dag, en op den 5 den een zwaare neusbloeding, die beide de ziekte verligteden. Zy wierd daarna door een *intermittens quotidiana* aangetast, die geregeld alle avonden met koude aankwam, en des morgens met zweet en een dik water eindigde, wanneer alle buikpyn wierd weggenomen. Daar ik, zag dat de ziekte op deeze wyze door de natuur geneezen wierd, liet ik *decoct. sassaparillae, bardanae* &c. gebruiken, welke zeer wel verdragen wierden, zeer goeden afgang gaven, en de ziekte langzaam wegnamen. Om de ingewanden te verfterken gaf ik haar een aftrekzel van de *lichen islandicus* en eindelyk de *yitr. mart.* met *extr. agrimoniae* en myrrhe.

In de behandeling van deeze *colica inflammatoria* heb ik naderhand aanftonds een ruime aderlating laten doen, en dezelve fomtyds 2, 3 ja zelf 5 of 6 maalen laten herhalen, alle ontlastende middelen, welke de reeds al te gevoelige ingewanden prikkelden heb ik vermyd, olieagtige dingen, welke van veele

zo zeer geprezen worden, worden te ſchielyk ſcherp, en doen dus meest al meer nadeel dan nut, ik heb dezelve altyd moeten nalaten. Een *decoct. Emolliens* van *althæa*, *malva* met een weinig *diacodium* deed het meeste nut en verzagte de pyn. Broodwater met harsthoorn, of enkel water en melk, liet ik de eerste dagen alleen voor spys en drank dienen. Na dat de eerste kragt der ziekte gebroken was, gaf ik met veel vrugt een *decoct. Lichenis* met *sarsaparille*, en daarna *martialia*. De clysteren prikkelden te veel door de uitzetting, welke zy in de ingewanden veroorzaakten, en deden dus meer nadeel. Zwangere vrouwen en kraamvrouwen hadden ook veel *colicae inflammatoriae*, welke op dezelve wyze moesten behandeld worden.

Maart.

Deze maand begon met storm en regenagtig weer, en een Z. of ZW. wind. Den 6 wierd de wind NO. en daarna O., welke een heldere vorst tot den 12 te weeg bragt. Na den 12, wanneer wy een zoneclips hadden, volgde een Z. wind met ſchoon warm weer, hierop volgde regen met W. wind tot den 20, van den 20 tot den 22 was het weer helder en warm met ZW. wind. Den 23 was het koud en regenagtig, de wind N. Deeze ging den 25 na het NO. en bragt vorst en wind aan, den 27 wierd het weer iets zagter en helder met N. wind.

In het begin van Maart heerschten dezelve ziekten, welke wy in February gezien hebben, voor-

vooral *colicae inflammatoriae*, *pleuritides rheumaticae*, en *febres catarrhales*. Maar het weer meer helder en koud wordende, wierden 'er veele door een gierstuitflag aangetast, welke zonder koorts zynde, door de ontlasting der eerste weegen en de herstelling der uitwaasfening wierd weggenomen. *Diarrhoea*, *ophthalmia* en *angina serosae*, welke uit een belette uitwaasfening en ophoping van slym ontstonden, wierden gemaklyk genezen.

Omtrent den 6, terwyl 'er N. en NO. winden waaiden, zagen wy uit dezelve oorzaak, veel tandpyn met zwelling van het inwendig gedeelte des monds en van het tandvleesch, welke dikwyls tot verettering overging.

Het getal der geene, die aan hoest, rheumatique borstpynen en verkoudheid onderhevig waren, was nu ook zeer groot. De kinderen leeden veel aan de tanden en stuipen, en de *flores zinci* dedden hierin veel nut.

Na de zoneclips, veranderde de lugt zodanig schielyk, van warm in koud, dat 'er veele *cholerae*, welke in dit jaarfaisoen niet gewoon zyn, zich openbaarden, dezelve waren zeer kort van duur en veel minder hevig, dan men die in de maand Augustus pleeg waar te neemen. De *colicae inflammatoriae* waren niet minder ontstekigagtig, maar hadden nu nieuwe toevallen by zich, die de ziekte erger maakten. Zy begonnen als een boord met een sterke ontlasting van slym en galagtige stoffen, de buik was steenhard, de afgangen meer stinkende, 'er was meer inwendige hitte, zy waren alle zeer tot flauwtens geneigd. Dezelve behandeling door vry-

vin-

vingen, aderlatingen en pappen was hier ook dienstig; maar de pijn kwam gedurig weder, de zieken konden geheel geen vogtige dingen verdragen, offchoon zy by het genieten van vaster voedsel geen ongemak bespeurden. Daar alle vastere ontlastingen zeer verligteden, en alle tekenen van ophoping van stoffen in de ingewanden gevonden wierden, maakte ik van den raad van PRINGLE hier gebruik, om kleine, doch dikwyls herhaalde giften van *sal. Epsshamense* toe te dienen, waardoor gemaklyke en verliggende stoelgangen ontlast wierden. Om de ingewanden hare groote gevoeligheid te beneemen en tegelyk haare verlorene veerkragt weder te geven, gebruikte ik vervolgens rhabarber met kreeftsoogen en een weinig *opium*. En eindelijk liet ik lang yslandsche mosch, *catechu* en *martialia* gebruiken.

De koortsen hadden ook meest in het acces zwaare buikpynen by zich, welke na hetzelfde ook verdwenen. Er waren veele catarrhale koortsen met een weinig ontsteking verbonden, welke door een aderlating en zagte *catartica* verdreven wierden.

Intusschen gingen deeze *catarrhi* ligt in *pleuritis* en peripneumonie over, wanneer zy verzuimd, of het bloed door hevige zweetmiddelen aan het gisten gebragt wierd. Er waren egter geene tekenen van waare *pleuritis*, dan in zo verre de ziektestof zich op de long plaatste. 's Avonds kwam 'er een koorts met koude rilling, gepaard met benaauwdheid en pijn op de borst, te middernagt volgde hitte, en des morgens een sterk bezwaarend zweet, de buik was

was, matig open, 'er was walging, braaklust, een vogtige witte tong, met den hoest werd alleen een dunne witte slym in een kleine hoeveelheid ontlast, het water was of zeer overvloedig en dun, of weinig en dik. Deze *pleuritis* werd niet door de gewoone middelen bedwongen, de aderlating dikwyls herhaald zynde, nam de kragten der lyders zonder vrugt weg. Zeer veel verdunnende dranken, openende en zagt laxerende *decocta* met een verkoelenden leefregel, deden hier het meeste af. De *antimonialia*, *kermes*, *sulph. aurat.* *Tart. Emetic* deden geen nut. De ziekte duurde veel langer, dan de gewoone *pleuritis*, en werd niet door ophoesting gescheiden. Een spaansche vlieg tusfchen de fchouderen by tyds gelegd, deed zeer veel nut. Deze ziekte kwam overeen met dien hoest en *pleuritis*, welke SYDENHAM in 't jaar 1675 gezien en zo naaukeurig beschreeven heeft (a) „ *Materia tantum febrilis cum*
 „ *stimulante tusfi in pleuram ac pulmones ube-*
 „ *rius deponeretur, symptomata dictas partes*
 „ *attinentia excitabat, attamen febris, quan-*
 „ *tum mihi licuit observare eadem prorsus cum*
 „ *illa fuit, quæ ad eum usque diem fuerat de-*
 „ *populata, quo hæ tusfes primum compare-*
 „ *bant, quin & remedia, quibus promptissime*
 „ *parebat, idem plane demonstrabant. Et quan-*
 „ *tum lateris dolor punctorius, spirandi difficul-*
 „ *tas, color detracti sanguinis & reliqua signa*
 „ *pleu-*

(a) SYDENHAM opp. pag. 150.

*pleuritidi familiaria essentialē pleuresin su-
 „ besse innuerint non aliam tamen medendi
 „ methodum postulavit hic morbus, quam quae
 „ feбри hujus constitutionis quadrabat, ab illa
 „ vero, quae verae pleuritidi conveniebat abhor-
 „ rebat admodum.”*

Hy behandelde deeze ziekte met eene aderla-
 ting, een spaansche vlieg in den nek, en alle dag
 een clysteer. Hy liet de zieken dagelyks eenige
 uren opzitten, zich van vleesch onthouden, dun
 bier, of water en melk, of zomtyds een verkoe-
 lenden en verzagtenden drank drinken. Hy genas
 ze op deeze wyze alle, en zegt verder „ *Cum
 „ qui morbum ferocius atque hostili manu adgredie-
 „ bantur, ingenti remediorum molimine bellum
 „ inferentes, vel suos aegros amitterent, vel
 „ saltem phlebotomia repetita saepius, quam
 „ vel postulabat morbi genius, vel etiam tuto
 „ ferebant, eorundem vitam redimere cogeren-
 „ tur.”* Deeze bastaart *pleuris* is hier waar-
 lyk meer gemeen, dan men wel oppervlakkig-
 zoude denken, en ik heb my in de behandeling
 daarvan dikwyls deeze beschryving van SYDEN-
 HAM errinnerd, en 'er my met vrugt van bediend.
 'Er heerschten egter hier en daar te gelyker tyd
 waare pleurissen, waarin de aderlating alles af-
 deed.

De *febris depuratoria* SYDENHAMI, of de
Synochus imputris van GRANT, die ik te vo-
 ren reeds meer dan eens heb opgemerkt, heer-
 schte nu ook, en wierd op de te voren beschre-
 vene wyze behandeld. De tusschenpozende
 anderendaagsche koortsen, welke of na de *syno-
 chus imputris*, of aanstonds gevormd, reeds in

de maand van February, zich geopenbaard hadden, begonnen zich nu meer en meer te verbreiden, zy waren egter dikwyls zo hardnekkig, dat zy ter wegneming den koortsbast vorderden.

De kinkhoest, welke de voorgaande maand reedsepidemisch begon te worden, zag ik nu, doch ook flegts hier en daar, onder de kinderen. By een kind was by elken aanval een zeer lastig niezen, 't welk oegter met de ziekte zelf, door kleine giften *Tartar. Emeticus*, door het ontlasten van veel slym, verdween. De yslandsche mosch voldeet my in deeze epidemie uitnemend na genoegzaame voorafgegaane ontlastingen.

Het afkookzel der yslandsche mosch heeft my dikwyls uitnemende diensten gedaan by het kleine traage koortsje, 't welk wy by kinderen ontmoeten en van een bleek wesen, en groote vermagering vergezeld zien, dit koortsje word veelal aan wormen toegeschreven, dan ik heb dit meest gezien by kinderen die bovenmaten sterk groeiden. Meermalen zag ik met het grootste genoegen, dat de kinderen na het gebruik van dit middel gezond en sterk wierden.

April.

De eerste twee dagen der maand, was de wind W. en regenagtig. Den 3 N., den 4 begon een NO. wind te waijen, die tot den 11 den met schoon en helder weêr voortduurde, wanneer na de nieuwe maan eerst een W. en daarna een N. wind met regen volgde, hierop werd het weêr schoon en helder tot den 15. De W. wind

wind bragt toen doordringende koude reëgens aan; met smeltende sneeuw, welke door Z. N. NO. en dikwyls veranderende winden opgevolgd wierden. Den 22 was de wind ZO. Den 23 O. tot den 25 met schoon weër. Hierop volgde een groote verandering in den dampkring, wanneer de wind schielyk Z. werd met regen. Den 26 was het weër weder helder met ZW. wind, maar van den 27 tot den 29 wierd de wind N. koud en mistig. De laatste dagen der maand hadden wy warmen reëgen met ZW. en W. winden.

De ziekten, welke in dit seizoen gewoonlyk voorkomen, waren nu in volle kragt, de *synochus imputris*, de anderendaagsche en dubbelde anderendaagsche koortsen.

Hier en daar zag men verkoudheden, hoest, colyckpyn, doorlopen, perslopen en roos.

De *synochus imputris* toonde geen tekenen van *fordes* in de eerste wegen in 't begin der ziekte, voordat dezelve door de koorts losgemaakt waren; zy kwam ongemerkt met koude en beëving aan, na eenige uren volgde hitte en hoofdpyn, en vooral een algemeene matheid met een snelle en matig sterke pols, den volgenden dag kwam een overvloedig en zeer verliggend zweet, 't welk somtyds twee dagen duurde, terwyl het water een rood zetzal liet vallen. Intusschen bleef de hoofdpyn, de tong wierd wit, de buik opgezet en 'er kwamen andere tekenen van een *materia deorsum turgens*. Gedurende de koorts gaf ik alleen clysteren en verkoelende dranken, na dezelve was een zagt *laxans* genoegzaam om de ziekte geheel

en al weg te neemen. Terwyl van den 3 tot den 15 de N. en NO. winden byna onophoudelyk waaiden, was de *synochus imputris* of schielyk geheel gescheiden, of zy ging zeer spoedig in een enkele of dubbele anderendaagsche koorts over. In het begin was zy of met hoest, of met een *pleurispyn* verzeld. Een of twee aderlatingen nam dezelve weg, en na een ruim zweet, wierd de ziekte gemeenlyk geheel en al weggenomen. By anderen egter kwamen 'er toevallen van *febris pituitosa* by, wanneer 'er dikwyls gedurende verscheide dagen veel dikke slym door braak- en purgeermiddelen wierd afgevoerd. De koorts hield geen vasten loop, en begon nu vroeger dan later. Wanneer na den 16 het weêr regenagtig wierd, verloor de koorts langzamerhand deszelfs rustschepingen. Elk acces wierd heviger, de koude was zeer sterk, de hitte brandende met yling, een rood opgezet aangezicht, drooge tong, sterke dorst, roodheid en branding der keel, waarby zich dikwyls een *angina* voegde. In dit geval was het nodig aanstonds den koortsbast in een ruime maate toe te dienen, waardoor de ziekte schielyk en zeer veilig genezen wierd.

Kinderen wierden in deeze maand ook door intermitterende koortsen aangetast. Zy hadden alle kentekenen van veel slym in de eerste weegen. De koude was by dezelve zo langdurig en hevig, dat het wesen en de handen blaauw waren, en het koude tydperk dikwyls den dood dreigde. De koorts was dubbel anderendaagsch, zodat op den eenen dag een zeer he-

vige, en op den anderen een minder zwaare koorts bespeurd wierd, egter kwamen beide koortsen geregeld op een en 't zelve uur. Het tydperk der hitte was geheel niet evenredig aan dat der koude, en het zweet ontbrak zomtyds geheel, en was meestal onbeduidend. De koortsbast moest in dit geval aanstonds, en in een ruime mate, worden toegediend. Het afkookzel of extract deed geen uitwerking, hierom moest ik de poeder geven, welke by verscheide een moeilyke waterlozingen een leucophlegmatISChe opzetting van het geheele lichaam te weeg bragt, deeze wierd egter door gepaste *diuretica* spoedig geholpen. De koortsbast veroorzaakte daar en boven of een heilzaamen uitslag rondsom den mond, of een uitslag over het geheele lichaam, of een zeerekeel, die de koorts geheel scheidde. Om de verlorene kragten te herstellen gaf ik gemeenlyk koortsbast met *tinct. mart. aper.*

Geduurende het midden van April, wanneer de W. winden waaiden, waren de anderen-daagsche koortsen over het geheel meer gepaard met een *saburra pituitoso-biliofa*, offchoon zy met een geregeld acces met koude om den anderen dag aankwamen, was de hoofpyn zwaarder, de hitte sterker, de tong drooger, en een grotere geneigdheid tot braaken, het zweet was langdurig, lastig, benauwd en verzwakkend (*colliquativus*), na den aanval remitteerde de koorts, maar ging niet zuiver af. Na een aderlating en herhaalde braakmiddelen, het toedienen van *decocta* van Tamarinde met *oxymel* en middenzouten, waardoor niet alleen de onreine stoffen ontlast, maar ook de sterke gisting

ting der vogten bedaard wierd, ging deeze koorts tot een tusſchenpozende over. Maar dewyl het weer koud en vogtig was, verminderde de koorts niet, en verteerde zodanig de kragten der zieken, dat men ze door den koortsbast moest wegnemen.

Men kan dus niet zeggen, dat in dit land de voorschriften van SYDENHAM in de voorjaars koortſen kunnen gevolgd worden, wanneer hy zegt, dat de voorjaars koortſen zeldzaam langdurig zyn, en altoos den lyder nuttig zyn, zodanig, dat de oudſte en zwakſte lieden, door de onkundigſte behandeling niet kunnen gedood worden „ (*Officiosaſſima dam-*
 „ *noſſimaque imperitiſſimi cujuſlibet periergia*
 „ *modo probus iſ fuerit e medio vix tolli*
 „ *queat*) ” en dat men deeze koortſen altoos aan de natuur moet overlaten.

Ik heb in deeze koortſen dikwyls den koortsbast moeten gebruiken, ik heb dezelve egter altyd met *ſal. abſinthii.* en *ſal. ammoniac* en *Tart. Emetic* verbonden, op dat tegelyker tyd alle overblyvende onreinheden op deeze wyze zouden ontlaſt worden.

Het is opmerklyk dat de koortsbast de kragt van den *Tart. Emetic* zodanig breekt, dat ik zeer dikwyls 18 greinen zeer goeden *Tart. Emetic* met een once koortsbast zonder walging geeve. Deeze bereiding bevordert egter een goeden ſtoelgang en een zeer nuttige uitwaasſeming. (a)

Op

(a) Dit effect is door andere geneeſheren dikwyls waar

Op het einde der maand, het weêr warm en regenagtig zynde, nam de gal meer de overhand, het wesen was geel, de tong galagtig, 'er was walging en neiging tot braaken, de hitte en hoofdpyn waren zwaarder. De ziektestof scheen nu meer de maag en ingewanden aan te doen, en hier door wierd de koorts door braak- en purgeermiddelen, waar door veel heldere groene gal ontlast wierd, zonder koortsbast meestal weggenomen. By zommige scheen de koortstof na de ontlasting der eerste wegen zich na de borst te begeven, en veroorzaakte hoest en een stekende pyn in de zyde, vooral wanneer het tydperk der hitte aankwam. De aderlating verligtte de pyn, offchoon het bloed niet ontstoken was. De koortsbast wierd niet te min veilig toegediend en nam de koorts zonder overblyfzel weg.

Het blykt uit al het geen wy hier gezegd hebben, dat offchoon een tegennatuurlyke ziektestof aanleiding tot de tusschenpozende koortsen geven, en andere toevallen by die der tusschenpozende koorts te weeg brengen kan, en dat dikwyls de afgaande koorts, door het wegnemen der bykomende of aanleidende oorzaken, geheel of door uitwaasfeming, of door een zetzel in 't water, geheven word, dat 'er egter een andere oorzaak of ziektestof, (*miasma*).

waargenomen en word nader verklaard in het eerste deel van de *Medicine éclairée par les sciences physiques* t. 1 p. 261. in een verhandeling van den Heer BERTHOLET.

ma) der tuffchenpozende koortfen aanwezig is, het welk geenzints in een vogtig weêr door de natuur uit het lichaam kan gebragt worden, maar het welk veel eer uit den vogtigen dampkring fchynt te worden aangetrokken, in het lichaam word opgehoopt en de kragten verteert, of eindelyk, dat 'er een zekere koortsagtige hebbelykheid geboren word, welke niet anders dan door den koortsbast kan worden t ondergebragt, en dat men dus in dit vogtig land, zelf in de voorjaarskoortfen den koortsbast niet kan misfen. Dit word ook van GRANT, geen vriend der koortsbast, toegestemd. Hy zag dat veele zieken, die uit Holland na Engeland kwamen, zeer gemaklyk en zonder koortsbast herstelden, en meende toen, dat dit even gemaklyk in Holland met deeze zelve behandeling zoude toegaan: dan hy vond zich zeer in zyne meening bedrogen, en zag zich genoodzaakt ook hier den koortsbast te bezigen. Wy behoeven ons ook zo zeer niet te verwonderen, dat wy in de jaarboeken van VAN SWIETEN, door STOLL uitgegeven, vinden, dat de voorjaarskoortfen door hem beschreven zo eenvoudig en gemaklyk te genezen waren, daar oude Geneesheren eenpaarig getuigen, dat zy die middelen, welke zy in hunne jeugd gebruikten, om de tuffchenpozende koortfen te ftuiten, nu veelal onvermogend vinden. Ongetwyfeld hangt dit af van de grotere vogtigheid des dampkrings, onze veel koudere zomers, en onzen verflappenden leefregel, waardoor de natuur minder geschikt is, dan te voren, om de koortsstof t onder te brengen en uit te dryven.

ven. Om deeze zelve rede zyn alle *febres gastricae* en *pituitosa* veel menigvuldiger, en hierom is de eenvoudige geneeswyze van SYDENHAM, die veel aan de werking der natuur betrouwde, nu minder geschikt, dewyl veelal de oorzaak der koortsen in een vervuiling der eerste weegen en onderdrukte uitwaasfeming moet gezocht worden.

Gedurende dit flappe weêr heerschten 'er veel wormen zo wel by volwasfenen, als by kinderen, en by de laatsten was meest een koorts tegelyk aanwezig, welke in veele opzichten van de *febris verminosa spuria* verschilde. Zy hadden benauwdheid, een zwaare pijn in de maag, vooral na den eeten, hierby kwamen hyfterische toevallen, zy spraken verward, ylden, en hadden stuiptrekkingen, de pijn was hevig maar met tusfchenpoozingen en kruipende rondsom den navel. In jonge kinderen was een kleine koorts, die tegens den avond zich verhefte met hitte, de ontlasting was of zeer hard, of zeer dun. Nadat ik door een braakmiddel veel flym ontlast had, gaf ik *cremor Tartari* met *sal ammoniac*, of *fabadillen* zaad tot 2 of 3 greinen in poeder, waardoor veel bloederige flym met wormen ontlast wierd. Om de ingewanden te versterken liet ik langen tyd de yslandsche mosch gebruiken. Verkoudheden, roos aan de beenen en netelroos waren 'er deeze maand ook overvloedig. De *rheumatismi* waren in't begin der maand meer ontstekingagtig, en genazen alleen door aderlatingen, en verkoelende middelen, maar op het einde der maand

wa en zy meer flymagtig en weeken voor het gebruik van braak en purgeermiddelen.

Mey.

Het weêr bleef warm en vogtig met Z. wind van den 1 tot den 3den, van den 3 tot den 5 kouden regen met NW. winden, van den 6 tot den 10 ZW. met matig warm en vogtig weêr. Den 10 kregen wy ZO. wind, welke schoon en zeer warm weêr aanbragt, dan hierop volgde den 13 een koude doordringende N. of NO. wind met sterke vorst, welke tot aan het einde der maand voortduurde.

In het begin der maand waren 'er veele anderendaagsche koortsen, welke in 't begin met eenige ontsteking verzeld waren, doch naderhand een grooten overvloed van gal vertoonden, zy waren gepaard met geweldige hoofdpyn, en een zeer groote benaauwdheid, galagtige oprisping en walging. Na een aderlating, welke zeer ontstoken bloed ontlafte, gaf ik een braakmiddel en daarna zuure *laxantia*. — 'Er waren veele hardnekkige buiklopen, met een bitteren mond, en persingen, en een galagtig water. — Veele hoesten sterk met een scherpe druiping van stof op de keel, met zweet, en een bitteren mond; eene aderlating, *emetica*, en *resolventia salina* &c. namen dezelve weg.

Van den 16 tot den 31 waren 'er veele *anginae* en *colicae inflammatoriae* — als ook hier en daar kinkhoest.

De roodvonk wierd nu zeer epidemisch, zo dat

dat 'er 15 kinderen aan stierven. De ziekte was zeer ontstekingsagtig, zo dat men zelfs kleine kinderen moest aderslaten, het bloed vertoonde altyd een dikke ingetrokkene korst, gemeenlyk wierd de uitbotting een of twee dagen voorafgegaan door een buikloop, welke aanstonds ophield, zodra de ziektestof zich op de huid genoegzaam vertoonde, maar wanneer deeze buikloop aanhield, was de uitbotting gering, de koorts wierd hevig, en de kinderen kreegen zwaare buikpynen. Een aderslating en verzagende *decocta antiphlogistica* namen de buikpyn en diarrhe weg, en bevorderden de behoorlyke uitbotting der roodvonk, alle die deeze ziekte hadden, wierden zeer wel door een antiphlogistifche methode genezen, en hebben gene nadelige gevolgen naderhand onder-vonden. (a)

Juny.

Den eersten nagt deezer maand hadden wy zulk een strenge vorst, dat alle de bladeren der bomen en de jonge takken daardoor verzeugd waren, met een NO. wind, dit weer duurde egter maar drie dagen, op deeze ongewoone koude volgde aanstonds hitte, met een ZO. wind en onweer,

(a) Daar ik zelve geduurende een gedeelte van Mey, Juny en July afwezig was, heb ik deeze berigten ontleend van een myner vrienden, een kundig en zeer oplettend geneesheer, waarop men den besten staat kan maken.

van den 3 tot den 9 helder warm weer met NW. wind. Van den 10 tot den 12 W. wind, wolkig. Den 13 was het weer onstuimig met NW. wind. Van den 15 tot den 20 koude reegen met W. wind, welke de volgende dagen, door dien de wind ZW. wierd, warmer waren. Van den 24 tot het einde der maand bragt de Z. wind warm en helder weer aan.

Er waren nu veele *febres rheumaticae*, die de keel, vooral de longen, en fomtyds de maag aandeden. De keelziekten gingen vooral nu tot verzweering over. — De peripneumonien wierden fomtyds door ophoefing, maar meest door zweet en het water gescheiden.

Na voorafgaande aderlatingen waren de spaansche vliegen hier vooral nuttig. Het bloed vertoonde een platte rheumatische korst. — De roodvonk bleef nog aanhouden, en 'er stierven drie kinderen aan deeze ziekte.

July

De eerste dagen van July was het helder en warm met storm en ZW. wind. Den 3 W. daarna ZW. tot den 7. Van den 7 tot den 9 N. helder en warm, en NO. tot den 17, wanneer wy drie dagen warmen regen hadden. Den 22 kwam het schoon weder terug, terwyl 'er een ZO., en daarna een ZW. wind waaide, en duurde tot den 28. De wind nu N. wordende, wierd de lugt koeler, vooral toen 'er reegen bykwam, welke dus tot het einde der maand met veranderlyke winden voortduurde.

De *febres rheumatico-saburrales* wierden nu voor-

vooral waargenomen, welke alle egter in 't begin ontstekingsagtig waren, en dus eene aderlating vorderden, daarna moest men *emetica* en *catartica* bezigen. Zy wierden meest door het zweet en de urine gescheiden, en gingen zomtyds in *intermittentes* over, welke door het aanhoudend gebruik van *resolventia* en *laxantia*, zonder den koortsbast, wierden weggenomen. De roodvonk hield met dezelve hevigheid aan, en 'er stierven 10 menschen aan, waaronder een vrouw van 50 jaar. De ziekte was nu met saburrale tekenen gepaard, en vorderde een herhaald gebruik van braakmiddelen.

Augustus.

Van het begin der maand tot den 14 hadden wy meestal schoon en helder weer, met een O. wind en matige warmte. Van den 14 tot den 16 W. wind met regen en storm. Den 17 Z. wind 'savonds NW. en regen. Den 19 was 'er een hier zichtbaare maaneclips, waarop een N. wind volgde. Van den 22 tot den 25 W. wind en kouden regen. Den 25 en 26 N. of O. wind met helder weer. Den 27 en 28 W. wind. Den 29 en 30 N. en den 31 NW. met regen.

Gedurende de eerste dagen van Augustus waren 'er zeer weinig zieken.

In het naburig dorp RYSWYK waren de pokjes zeer epidemisch, zo dat zy byna niemand spaarden, egter waren zy zeer goedaartig, zo dat 'er zeer weinigen van stierven. Zy wierden nu ook hier en daar in deeze stad waar-
ge-

genomen, maar ook zeer goedaartig, egter stier-
ven er deeze maand drie kleine kinderen aan.

De roodvonk, welke nog van denzelven gal-
agtigen aart bleef, doodde ook nog 4 kinderen.

De galkoorts begon nu meer de overhand te
neemen, geduurende verscheide weeken hadden
de zieken winden, gebrek aan eetlust en be-
zwaardheid na den eeten, deeze toevallen ver-
meerderden, en hierby voegde zich een zwaar-
te door het geheele lichaam en hoofdpyn, ein-
delyk vertoonde zich onverwagt de koorts met
koude en een zeer zware kloppende hoofdpyn,
welke eerst met hitte verwisselde, en daarna in
zwaare hitte overging, 'er waste gelyk walging,
bittere smaak, een drooge witte tong, doch geen
byzondere drukkende maagpyn. Des morgens
had de zieke een vet kleverig zweet. Geduurende
den dag was 'er weinig of geen koorts, het water
was helder en rood, de zieke gevoelde een sterk
verval van kragten. Offchoon de grote hoofd-
pyn en hitte een aderlating schein aan te wy-
zen, verdroeg de ziekte gene bloedontlastingen.
Het bloed was dun, helder rood, en tot ontbin-
ding geneigd, de wey was zeer geel. Een braak-
middel ontlaste veel galstoffen. Den volgenden
dag gaf ik een drank van *Tamarinde*, *Cremor*
Tartar, en *Manna*, welke de ingewanden van
een menigte gal bevrydde. De koorts schein
hierop minder hevig te zyn, de pols was min-
der ingetrokken en het water wierd helderder
en in groter hoeveelheid afgescheiden. De slaap-
loosheid was den zieken vooral lastig en de koorts
altyd des nagts het sterkste. Dezelve middelen,
het gebruik van vrugten en zuure dranken namen
de-

deze koorts langzaam weg. De *spir. vi rioli* was byzonder nuttig om na genoegzame zuivering der eerste wegen aan het bloed deszelfs behoorlyke *consistentie* weder te geven,

De *colica*, *diarrhaeae* en *dysenteriae biliosae* waren van dezelve koorts verzeld en vorderden dezelve behandeling, na genoegzame braak- en purgeermiddelen, bedaarden de zuuren, en verzagten de pyn, en namen de koorts weg; om egter voor instortingen verzekerd te zyn, moest men zeer lang met een dieet van vrugten, karnemelk en zuuren voortgaan, dewyl de minste vette dingen en vleesch dezelve toevallen deden te rug koomen.

De ontstekingagtige gesteldheid, welke zich dit jaar meer dan in eenig ander vertoonde, en die door de hitte in de maanden July en in 't begin van Augustus scheen 't onder gebragt te zyn, begon het hoofd aanstonds wederom op te heffen, zodra na den 7 de O. en N. winden een droogere koele lugt aanbragten. Alle de koortsen, de *cholerae* de welke zich dezer daagen vertoonden, hadden alle iets phlogistisch.

Een kloek sterk man, die met een zeer geel weezen, een bitteren mond en vuile geele tong, brakende en reeds verscheide dagen aan den afgang geweest zynde, my om raad vroeg, gaf ik een braakmiddel, dit veroorzaakte zulk een hevige *cholera*, dat die door geene middelen aan het bedaren kon gebragt worden, een aderlating en verzagtede drank, bragten dezelve aanstonds tot stilstand. In een volbloedige vrouw, die een zware *cholera* had, nam een aderlating en zuure dranken, in eens deze ziekte weg.

weg. In beide gevallen was het bloed geweldig ontstoken. Men kan dus altyd niet zeggen, dat in alle galziekten de aderlating nadelig is, en zeker kan men in dit geval de zagtheid der pols niet vertrouwen, dewyl ik in deeze beide gevallen niet de minste opzetting of hardheid der pols bespeurde, hoewel het bloed zeer ingetrokken en de wey groengeel was.

De *pleuritides rheumatico inflammatoriae, anginae, erysipelas &c.* offchoon van een belette uitwaasfeming oorspronglyk, kregen, na dat de ontsteking was weggenomen, zeer schielyk alle tekenenen der heerschende galkoorts en moesten dusdanig behandeld worden. Kleine kinderen hadden veel stuipen en doorloop, welke galagtig zynde, door kleine braakmiddelen genezen wierden.

Omtrent het midden der maand zagen wy by volbloedige oude lieden veel beroerten, herhaalde aderlatingen, en hierop volgende en van zelf ontstaande brakingen verligteden dezelve, waarna zuure laxeermiddelen, na het ontlasten van veel galstof, dezelve ten vollen herstelden.

Veele klaagden ter zelve tyd over walging, zonder beslagen tong of bitteren smaak, alle hadden een dunnen afgang, andere hadden zonder eenige tekenen van *fordes* een scherpe maagpyn. Dit was een roosagtige ongesteldheid der maag, welke door veel drinken, maar vooral door aderlatten genezen, wierd.

De *causlus biliosus* met een *tertiana* verbonden, of de *febris hemitritica* heb ik deeze maand

maand eenige reifen ontmoet. Wanneer in 't begin de aderlating en braakmiddelen verzuimd waren, waren de accessen zeer gevaarlyk, en met zeer zwaare toevallen verzeld. Ik was in meer dan een geval genoodzaakt aanstonds een aderlating te doen, en hierop ruime giften koortsbast te geven, welke ik egter met *sab. ammoniac* en *Tart. Emetic.* paarde, om op deeze wyze dezelve te stuiten. — Wanneer ik in 't begin by deeze zieken geroepen wierd, genas ik dezelve genoegzaam aanstonds door eene aderlating, een braakmiddel en een purgatie.

Op 't eind der maand schein de gal meer verdikt te zyn, en hier uit ontstonden uitslag en andere tekenen van opgeslorpte en verdikte gal.

September.

Het weêr was van het begin der maand af stormagtig en buijig met een W. wind. Na een voor ons zichtbare zoneclips op den 6, hadden wy een kouden N. wind. Van den 8 tot den 11 was de wind W. en het weêr veranderlyk, dan nu wierd de wind weder N. en eindelyk O. met warmte. Van den 13 tot den 19 kreegen wy weder W. wind met regen. Hierop volgde een N. wind, en koude regen. Den 24 bragt de Z. wind een vogtige warmte aan, dan den 25 wierd het weêr helder en aangenaam met O. wind. Op den 30 wierd de wind Z. met regen.

In de eerste buijige dagen van September
M had.

hadden wy *catarrhi*, *angina*, *odontalgia*, *diarrhœa*, *colica* en *febres rheumatico-biliofa*, welke uit een belette uitwaasfeming, in een met galagtige ftoffen opgevuld lichaam ontftonden. Zomtyds hadden zy in 't begin ontfteking by zich.

De koortfen, welke nu heerschten, waren alle *cauffi* of *febres ardentes*. Zy waren verzeld van alle tekenen van galstoffen in de maag en ingewanden, de tong was geel en als met moftert bedekt. De koorts begon met beurtlingsche koude en warmte, zwaare hoofdpyn, brandende hitte met ylhoofdigheid en neiging der vogten naar boven, het water was of bleek of dik en ongekoekt, zomtyds met een glinsterende huid bedekt, de ftoelgangen waren zeer galagtig, de dorst was onlefehbaar, een lastige prikkelende hoest met benauwdheid en zomtyds ftekende pyn in de borst, verzelde deze koorts.

De koorts nam aanftonds den vorm van een anderendaagsche aan, offchoon de zieke nooit geheel vry was, de verheffing was by zomigen met koude, by anderen met hitte; de hoest was het lastigfte geduurende de hitte der koorts, zo dat zomtyds bloed uit de longen kwam, offchoon 'er in de remisfies geen hoest was. Een zeer ruime aderlating, waar door waar ontftoken bloed wierd afgetapt, en de wei donker groen was, en daarna een braakmiddel, maakten de ziekte ligter. Na het braakmiddel maakten oploffende *decocta* met een goede hoeveelheid *fenna* aangezet, een groote menigte zeer dikke gal los, en eindigden

den de ziekte spoedig. Wanneer deze behandeling in het begin der ziekte verzuimd was, was 'er meer moeite om dezelve weg te nemen. De *resolventia*, *emetica*, *emetico-cathartica*, en *purgantia* hielden wel de koortstige aanvallen min of meer in bedwang, maar de galstof eens geheel en al in het bloed opgenomen zynde, liet zich niet gemaklyk weder na de ingewanden brengen. De scherpe hoest, welke uit eene na de longen gebragte scherpe galstof ontstond, vorderde dikwyls het gebruik van spaansche vliegen, waardoor de stof naar de huid gebragt zynde, een lastig St. anthonies - vuur veroorzaakte. En hier uit bleek my op nieuw de galagtige oorsprong van deezen uitslag, waardoor als een weg van scheiding de gal van 't bloed wierd afgescheiden. Dan daar deeze weg moeilyk en langdurig is, heb ik denzelven geenzints bevorderd. Ik liet verzagtende pappen op het aangedane deel leggen, om de scherpe stof een gemaklyken uittogt te geeven, maar tegelyk sterkere *laxantia* toedienen, om een nieuwe ophoping na de huid voor te komen.

Gewoonlyk heb ik het St. anthonies vuur waargenomen op het einde des zomers, of ook veel vroeger, wanneer een vogtige koude de galstof schielyker verdikt en minder gangbaar maakt. Ik heb een *ignis sacer* in *podagra* zien overgaan, en dit schynt eenigzints de oorsprong der *podagra* uit de eerste wegen te tonen.

Den 5 den hadden wy een hier zichtbare zon eclips, de lugt was wolkig en de hitte zo drukken.

kende, dat ik daarvan een ongemene zwaarte op de borst gewaar wierd. By myne zieken bespeurde ik egter geen merkbare verandering.

Omtrent den 10 waren 'er veele *cholerae* en *febres biliosae* met de gewoone toevallen.

Den 12 volgde op warme heldere dagen, een W. wind met regen, hierdoor ontstonden *febres inflammatorio-biliosae*.

De keelziekten waren heviger dan gewoonlyk, maar zy verschilden zeer in toevallen. By zommige was 'er geduurende eenige dagen een moeilyke slikking met roodheid van keel, gebrek aan eetlust en een beslagen tong, hierop volgde een koorts met sterke koude, gevolgd van hitte, de keel was nu van het voorste gedeelte van het verhemelte af tot aan de *pharynx* purperrood, egter was de keel noch de amandelen zeer gezwollen, 'er was tevens een zwaare hoofdpyn, en gewoonlyk eindigde de koortsverheffing met zweet. 's Avonds verhefte de koorts aanmerklyk, 'er was een gedurige neiging tot braken, het water was dik en troebel, en de stoelgangen waren galagtig. Na een tydige aderlating, waar door een zeer sterk ontstoken bloed wierd afgetapt, terwyl de wey groen was, en daarna door een braakmiddel veel gallstoffen ontlast zynde, wierd de ziekte in een paar dagen weggenomen. Na de aderlating verligtte een spaansche vlieg tusschen de schouders met een *decoct. Emetico-catarticum*, zeer de ziekte. Dan
noch

noch braakmiddel noch laxeermiddel alleen was instaat de ziekte weg te nemen, en wanneer men niet in 't begin een aderlating deed, volgde 'er een *febris ardens*. De *decocta laxantia* ontlasteden veel galstoffen, en hierop volgde gewoonlyk den 5 of 7 den dag een *urina hypostatica*, en een verliggend zweet des morgens.

Omtrent het *aequinotium*, kreegen veele kinderen en ook volwassnen, die aan deze toevallen onderhevig waren, sterke aanvallen van *epilepsie*, welke by de eene meer by de andere minder hevig waren en meermalen des daags wederkeerden, zy gevoelden zelden eenig ongemak voor dat zy het toeval kreegen. Veele ontlasteden een menigte slym, hoewel de ziekte door *resolventa* en *laxantia* verergerd wierd.

De *asafœtida*, *castoreum*, *tinct. succini*, *valeriana* &c. deden geen nut. De zinkbloemen scheenen hier de beste uitwerking te doen, offchoon ik in de meeste gevallen meen waargenomen te hebben, dat de ziekte langzamerhand van zelf afnam.

De *peripneumonia Notha* was thans ook menigvuldig, inflammatoir met slym gepaard, en luitteerde zeer wel na de Boerhaviaansche behandeling. Op het einde der ziekte deden *detergentia balsamica* den overblyvenden hoest ophouden.

De roodvonk bleef nog even sterk aanhouden zo dat 'er nog 10 aan stierven.

De *variolae spuriae* waren zodanig overeenkomstig met de waare pokjes, dat zy daarvan

alleen in het beloop der ziekte te onderscheiden waren. De uitbottingskoorts was zomtyds zeer sterk, de braking en pyn in den rug geweldig, de uitbotting gebeurde op den 3den of 4den dag, dan de schielyke rypwording en afvalling dezer pokjes toonden genoegzaam derzelver aart. Zy waren des te moeilyker in het begin van de waare pokjes te onderscheiden, daar deze zich op eens de geheele stad door in deze maand schenen te verspreiden.

Zy waren doorgaans zeer gunstig, geregeld en liepen zeer wel af, 'er stierven slegts 8 kinderen aan, waar van 4 jongens en 4 meisjes.

Van 6 tot 12 maanden 4.

Van 1 tot 5 jaar - - 1.

Van 5 tot 10 jaar - - 3.

Ik had in een huis drie kinderen, welke alle zeer gevaarlyk waren, zo dat 'er twee van stierven. Het eerste kreeg op den 5de de eerste tekenen der ziekte, het 2de op den 20, en het 3de op den 22. Zo dat zy 14 en 16 dagen na de eerste besmetting wierden aangetast. Ik heb zo wel in deeze als in voorgaande epidemien opgemerkt, dat over het algemeen de 15de dag kan gerekend worden voor den juistten tyd, waarop zich de besmetting door koorts openbaart, dit heeft echter zeer veele uitzonderingen, dewyl dikwyls, ook vooral wanneer 'er een schrik by de besmetting koomt, het gif zich zeer schielyk, ja zelf oogenbliklyk in werking zet. Deeze drie kinderen waren alle klieragtig. De ziekte begon

gon met een zeer matige koorts, met een snelle maar zwakke pols, benauwdheid en hevige braking, hoofdpyn, het water was bleek, zy niesden, hoesteden, en hadden van het begin af tranende oogen; de huid was nu droog, dan wederom zweetende, by alle drie was 'er doorloop, dan by het eene met persing en bloed. De uitbotting begon reeds op het einde van den tweeden dag zeer menigvuldig en klein. De huid was naauwlyks rood en de volgende dagen begonnen ze zich niet in de hoogte maar alleen in breedte uit te breiden. Den sesden dag was het aangezicht een weinig gezwollen, maar bleek en wateragtig, en 'er was naauwlyks eenige koorts. De pokjes waren ingedrukt, navelagtig (*umbilicatæ*) en in 't midden zag men een blaauwagtige vlak. Den agtsten dag wierd de koorts meer merkbaar met hitte en een snelle pols, hier door wierd intusschen de pokstof niet meerder na de huid bepaald, maar scheen haar kragt meer op de inwendige deelen, vooral op de longen, uit te oeffenen, en verwekte hoest, benauwdheid, heeschheid, en een verzwakkende diarhé. Offchoon 'er salivatie was, verligtede dezelve niet: de huid wierd meer en meer droog en op het lichaam vertoonden zich enkel ledige blaasen. Den 10 dag was het aangezicht geslonken, de leden vertoonden zich niet gezwollen, maar de kinderen begonnen te ylen en stuipagtig te worden, en stierven zeer benauwd op den 11den dag. — Deeze pokjes waren van catarrhale toevallen verzeld, in het begin hadden zy een onbeduidende

M 4

koorts

koorts, en kentekenen van groote zwakheid en van een *febricula lenta nervosa*, de pokjes waren zodanig als van SYDENHAM *cruda* genoemd worden, en door SARCONÉ zeer naaukeurig beschreeven zyn. In deeze pokjes waren geene tekenen van *coctie*, dewyl zy zich tegens den 8 of 10 dag naar de inwendige deelen begaven. De diarhé was vooral in dit geval een zeer ongunstige voorbeduiding.

Alle ontlastende middelen waren in deeze gevallen gecontraindiceerd, ik zocht veel meer op alle mogelyke wyzen de levenskrachten te ondersteunen. Intusschen beantwoordde aan dit oogmerk geenzints de *regul. antimon. medicin*, zo zeer door den Heer van den Bosch aangeprezen, noch ook de *flores zinci*, waarvan de Heer HUFELAND zo veele uitnemende uitwerkingen gezien had: rhynsche wyn, spaansche vliegen, koortsbast, en *spir vitrioli*, welke door SYDENHAM in dit soort van pokjes zo uitstekend nuttig gevonden was, deden alle geen de minste uitwerking. Dewyl deze kinderen noch pappen noch doeken met water en melk om de beenen wilden dulden, kon ik dezelve hier niet beproeven. Intusschen zag ik wederom de beste uitwerkingen van een warm bad met aromatique kruiden. Na de indompeling in dit bad schein door de opening der huidporen, en door de prikkeling der kruiden, de pokstof zich naar de huid te begeven, het aangezicht wierd rood en opgezet, de blaasen begonnen zich te vullen en de borst wierd ruimer. Maar wanneer daarna de kinderen zich ontbloteden wierd de stof te rug gedreven, en een

een stikking veroorzaakt. By het jongste kind, 't welk offchoon distincte pokjes hebbende, dezelve toevallen, en raauwheid der pokjes plaats hadden, en op den 10 dag alle de pokjes droog en blaasagtig stonden, terwyl de borst zeer benaauwd was, liet ik driemaal daags een kruidenbad nemen, en aanstonds daarna het kind in flenelle lappen in dit kruidenaftreksel natgemaakt winden, hierdoor wierd een gedurig zweet onderhouden, waardoor het kind, zonder zweeren der pokjes, en zonder dat 'er eenige napokken volgden, gered wierd. By een ander kind, 't welk in confluyente pokjes, door het schieelyk inslaan derzelve op den 10 den dag, door zwaare stuipen, en een diarhé wierd aangetast, zag ik door het zelve bad, en het inwendig toedienen van *sp. C. C.* binnen een half uur de pokjes te rug komen, alle de toevallen verdwynen, en het kind uit het grootste gevaar gered.

October.

Na een helder koud weêr en N. wind, kwamen 'er nu ſchielyk warme regens uit het Z. van den 1 tot den 10. Nu hadden wy zeer warm doch veranderlyk weêr tot den 17. Wanneer de N. wind zeer koud waaide tot den 20 en toen NW op den 21 W. wierd, met regen. Eindelyk liep de wind door het N. na het O. op den 23, wanneer wy tot den 25 koud en helder weêr hadden. Van den 25 tot den 31 was het weêr regen- en ſtormagtig, met een W. kouden wind.

Dezelve koorts, die in September geheerscht
had, had nu ook nog de overhand, zodanig,
M 5 dat

dat men ze by zommige *febris inflammatorio-biliofa*, maar by andere *febris hyberna* of *pituitofa* kon noemen. By de eerften waren kente-kenen van waare ontsteking, niet met *faburra gastrica*, maar met gal gepaard, of om met GRANT te fpreken, de *lentor biliofus* was nog geheel in het bloed aanwezig. De ziekte begon met verkoudheid met een droogen hoest, hierby kwam een benaauwdheid omftreeks de maag, een zwaare drukkende pyn in het hoofd en in de lendenen, walging, de ontlasting was of gemaklyk en dun, of met perlingen vergezeld, het aangezigt was rood, en de pols snel en hard, het water was fchuimend en geel, fomtyds drabbig met een rood zetzel. De aderlating gaf onmiddelyke verligting, en deeze was des te grooter naar mate de hoest heviger was. By deezen moest de aderlating ook herhaald worden. Het bloed was zeer ontstoken, de wey was als klaare gal. De aderlating maakte gewoonlyk, dat de gal zich langs de ingewanden ontlastede, of ten minften hiertoe gereed wierd. By sommige ging dezelve gemaklyk na beneden, by anderen vermeerderde de buikzuivering de koorts, welke herhaalde braakmiddelen wegnamen. Gemeenlyk wierd door een braakmiddel veel zuivere gal ontlast, en daarna van zelve na beneden gevoerd, waarop de avond verheffing ophield. Maar dewyl de koorts niet voortkwam uit ftoffen in de ingewanden, maar de gal uit het bloed gedurig na de maag en ingewanden aangevoerd wierd, kwamen de koortfige toevallen weder en hielden zo lang aan, tot dat op deeze wyze de gal genoegzaam uit het bloed ontlast was. Hierom

wa-

waren bittere middelen en rhabarber niet geschikt om de nieuwe voortbrenging van gal te beletten, zy vermeerderden veel eer de hitte en de koorts. Diluerende zuure dranken waren hier veel meer geschikt om de gal te verbeteren en te ontlasten.

By zommige was de galkoorts zuiver en zonder de minste ontsteking. In het begin was by deezen de koorts aanhoudend, doch 's morgens remitterende, de hoofdpyn was zo sterk, dat zy zich niet overeenind in het bed konden houden. De koorts begon met koude, waarop brandende hitte en zweet volgde, des anderendaags avond kwam de koorts weder, zonder koude, met hitte, sterke walging, een bitteren mond, een zeer geele tong, en geduribenauwdheid. Herhaalde braakmiddelen en *laxantia* deden hier het meeste nut. By deezen had dezelve galagtige ontlasting uit het bloed naar de ingewanden plaats, en hierom moest men zeer lang zuure *laxantia* en galverbeterende middelen gebruiken, voordat de ziekte geheel overwonnen was.

Wanneer de koorts in het begin verzuimd was, bragten de zelve ontlastingen, welke in het begin der ziekte gebruikt, dezelve spoedig wegnamen, gevaarlyke toevallen, zwakheid, ylhoofdigheid, beeving, groote benauwdheid, hartkloppingen en een ongeregelde pols te weeg, de zieken stierven ondanks het gebruik van spaansche vliegen, campher, koortsbast, *moschus*, &c. met hevige trekkingen, op den 11den dag.

In eenige deezer koortsen schein de gal tra-
ger,

ger, minder beweegbaar en minder gemaklyk van de gefonde vogten afgefcheiden te worden. In deezen was de oorfprong der ziekte meer in de vaten des onderbuiks en der poortader vastgezet. De ziekte begon, met een drukkendende pyn op de hoogte van het *colon transversum* en de lendenen, hierop volgde de koorts met koude, de hitte aankomende, was 'er walging met een fcherpe hoofdpyn, welke naderhand meer drukkende wierd en in flaperigheid overging, het water was helder rood, de tong vogtig, de pols snel en hard, 'smorgens remitteerde de koorts met een gering zweet: in 't begin verlichteden een aderlating en buiksontlastingen, zodat zich de zieken gedurende eenige dagen beter bevonden, daarop volgde onverwagts een nieuwe en zwaare aanval van koorts met ylhoofdigheid, braking en een beflagen tong, alle aanvallen vermeerderden dagelyks in hevigheid, en de tong wierd zwart, terwyl 'er een gedurige flaapzugt en yling mede gepaard ging. In dit geval heb ik my met een uitftekend goed gevolgd bediend van een afkookzel van koortsbast met tamarinde, waardoor niet alleen de levenskrachten onderfteund, maar ook de aanvallen van koorts getemd, en veele zwarte galagtige ftoffen ontlast wierden. Tegens het einde van den iiden dag kwam 'er een ruim en gemaklyk zweet over het geheel lichaam, de tong wierd vogtig, de pols zagt en minder snel. 'Er volgden niet te min jigtpynen, welke naderhand door vryvingen en zachte *laxantia*, waardoor de gal na de ingewanden gelokt wierd, verdwenen.

De

De intermitterende koortsen waren ook ontstekingsagtig en met gal gepaard, hoewel zy zuiver afgingen. Egter vervroegden de aanvallen, en verdubbelden ligt, het was daarom altyd raadzaam na een ruime aderlating en het geven van braak- en laxeermiddelen, niet te lang met den koortsbast te wagten. Ik onderzond daarvan niet het minste nadeel zodra ik genoegzaam de ontstekingsagtige gesteldheid door aderlatingen, en de galagtige door ontlastingen bedwongen had.

By twee kinderen zag ik deeze maand geelzugt zonder koorts of hitte, alleen was de buik hard en pynlyk op het aanraken, zagte *laxantia*, waardoor veel taaye stoffen ontlast wierden, genafen beide.

Ronde wormen en maden plaagden niet alleen kinderen, maar zelfs volwasfenen. By een volwasfene veroorzaakten zy zwaare stuip-trekkingen, flauwtens en brakingen, en by een kind een zeer langdurige lastige kramphoest. By andere duifelingen, en epileptische toevallen, alle hadden een verbasende ophoping van dikke taaye flym, die de ingewanden als bedekte. Clyfteren van een sterk afkookzel der *geoffraea*, het *Electuarium* van STÖRCK met *semen santonici*, zo als het van LENTIN word voorgeschreven, deden hier de uitmuntendste werking.

Omtrent den 18, wanneer de wind uit het W. na het N. ging, kregen veele door belette uitwaasfeming roos, *ophthalmia*, *febres dysentericae* maar vooral *anginae*, welke alleen van
el.

elkander verschilden, naar mate 'er verschillende *organa* waren aangedaan.

De *angina* waren even als in de voorgaande maand, *inflammatorio-bilioſe*, na een aderlating, wierd aanſtonds een braakmiddel genomen, waardoor de koorts en ontſteking bedaalden. De koorts keerde egter als een *intermittens quotidiana* gedurende eenige dagen weder, maar wierd alleen door zachte *laxantia* en zuuren 't ondergebragt. Eene aderlating was by allen nodig, doch ook genoegzaam om de ziekte te overwinnen, en offchoon het bloed van boven ontſtoken was, vertoonde het zich egter van onderen teder en dun.

By eenige menſchen zag ik een *angina ſubmaxillaris*, deeze klieren waren zeer gezwollen, zodat en de ſlikking zeer moeilyk was, en de mond niet konde geopend worden: ſpaanſche vliegen in den nek, het *linimentum volatile* en verzagtende pappen om de keel, &c. deden deeze klieren niet ſmelten, welke eindelyk aan het zweeren gingen, wanneer na een ontlaſting van veel etter, de keelziekte bedaalde. De *colica*, welke den 24 zeer gemeen waren verdroegen geene pynſtillende middelen, maar herſtelden ſchielyk door middel van zachte *reſolventia*, welke veel ſlymagtige gal ontlasteden.

Alle ſoorten van uitſlag waren nu zeer gewoon, maar vooral nam ik een zeer laſtig ſoort van ſchurft waar: in 't eerſt waren 'er kleine puisjes, welke daarna grooter wierden, tot ettergezwelletjes overgingen, en een geelen

len etter voortbragten, de randen waren zeer ontstoken, te gelykertyd hadden de lyders walging, een bitteren mond, en 's avonds koorts; alle opdrogende middelen maakten dit uitflag erger, daar emollierende pappen, en afleidende en purgerende dranken, het schielyk wegnamen.

De roodvonk bleef nog voortduren, en ofschoon 'er slegts drie doden aan waren, behield zy nochtans desselfs kwaadaartigheid.

Onder myne lyders aan deeze ziekte, had ik een byzonder geval van scheurbuik, welke met roodvonk gecompliceerd was. De zieke was een man van omtrent 40 jaren, die dikwyls zeer zwaar aan de scheurbuik geleden had. Hy werd eerst door pyn in alle leden, en in de keel, met een doorgaande koorts aangetast, hy werd daarvoor adergelaten en het bloed was met een taaye korst bedekt. Den volgenden dag was de keel zeer rood en gezwollen, de huid droog, de pols hard, en de tong galagtig. Na dat de aderlating herhaald was, en het bloed minder ontstoken scheen, kwam 'er op den 3den dag een uitflag van groote purperagtige vlakken, die verre boven de huid opkwamen, vooral was deeze uitflag op het aagezigt en de handen, men gaf verkoelende *decocta*. Op den 4den dag waren deeze vlakken nog donkerder van couleur, en het hoofd en handen nog meer gezwollen. By het onderzoek der keel bleek, dat dezelve vervuld was met bruine korsten met aschgraeuwe stippen bezaaid, de koorts bleef aanhouden. Het scheen my dus toe als of 'er hier een *inflammatio impura ad putredinem vergens* plaats had, hier.

hierom liet ik een *gargarisma detergens* uit een *infusie* van de *flor. rosar.* met *sp. sal. marin.* en een *decoct. Tamarind* met *cortex Peruv.* gebruiken, waardoor de keel gezuiverd en de ziekte in zeer weinige dagen hersteld wierd. By het kind van deezen man, waarby ik het eerst geroepen wierd, vond ik na de roodvonk een uitterend koortsje, zeer drooge brandende huid, een kittelende hoest met groote benaauwdheid, zwaren brand in de keel, en een gedurige ontlasting van groene dunne carieus-ruikende etter uit de neus, welke uit een verzwering van den neus door het gift der roodvonk, waarin een verkoele geneeswys versuimd was, veroorzaakt, voortsproot.

De pokjes waren vooral onder de geringere liepen zeer epidemisch, maar goedaartig, zodat ik by die geene, welke ik gezien heb, geene geneesmiddelen nodig had. Er stierven 10 kinderen aan, waarvan 5 jongens en even zoveel meisjes.

Van 9 tot 12 maanden	. . .	2
Van 1 tot 5 Jaar	. . .	6
Van 5 tot 10 —	. . .	2

November.

Met het begin van de maand November was 'er een heldere koude met een N. wind, den 3 was de wind O. met regen, den 4 weder N. Den 8 was het weer vorstig en helder, de 2 volgende dagen regende het met een O. wind. Van den 11 tot den 15 was het weer regenagtig en de wind W. Den 16 en 17 ZW. van den

den 18 tot het einde der maand was 'er een dikke nevel met een kouden O. wind.

In het begin der maand waren 'er veel ziekten, welke alle de kenmerken der overblyvende zomergal, en de beginselen der winterontsteking vertoonden. De koortsen, als ook de oogontstekingen, waren gal en ontstekingagtig, aderlatingen braak- en purgeermiddelen, waren hierin alleen nuttig.

'Er waren thans ook veele *pleuritides*, maar alleen by zwakke vrouwen, en mannen, die zwak en aandoenlyk van gestel waren: zy wierden voorgegaan van pyn door alle leden, matheid en koorts, welke niet te min zeer ligt was, de pyn verhefte met koorts tegens den avond, de ademhaling was niet zeer moeilyk, maar steekende, vooral by een diepere inademing, de hoest was droog en kort, en vooral des nagts zeer lastig, 'er wierd niets dan een weinig dunne schuim, opgeworpen, de pols was zwak en vooral des avonds zeer snel, zy waren zeer tot zweeten geneigd, de tong was wit, kleverig of geel, het water was raauw en dun, zy hadden gedurige walging en braking. De aderlating verligte de altyd, en moest zelf herhaald worden, het bloed was waar ontstoken, by zommige zeer dik en met een gevlaakte korst bedekt. Warme pappen op de pynlyke zyde gelegd, verminderden dezelve, doch geenzints de spaansche vliegen. De ziekte duurde by zommigen zeer lang, en de koorts was vooral hardnekkig. De *Tartarus Emeticus* in kleine giften, zo dat dezelve ligte brakingen verwekte, en laxeermiddelen verligten de ziekte voor een korten tyd, maar een

morgenzweet door *antimonialia* en campher verwekt, of van zelf voortkomende, en een dik wit en effen bezinkzel in het water bragten de wesenlykste verligting aan. Dit was dezelve *pleuris*, welke STOLL in de maand van January 1778 te WEENEN zag, en die hy in zyne *Rat. Med.* t. III. p. 63. beschreeven heeft. In deeze *pleuris* was een groote zwakheid van pols, welke door de aderlating wierd weggenomen, vrouwen vooral, die een slap gestel hadden, wierden daarvan aangetast, „ *nempe virile* „ *robur, aut viraginum conditio inflammanti* „ *aëris hyberni stimulo hucusque resistere vide-* „ *batur, cui delicatior & irritabilis magis foe-* „ *minarum fibra male obsecundabat.* De meeste braakten in deze epidemie van zelf gal met verligting, de koorts bleef ook na het verdwynen der pijn zo lang over, tot dat zy door buiksontlastingen, het water, of zweet gescheiden wierd, men moest egter deeze scheidingen niet dwingen, maar eens door de natuur voortgebragt, helpen. Wanneer 'er te veel bloed wierd afgelaten, wierd de ziekte rotagtig. De geneesheer moest met diluerende middelen en *nitrosa* aanhouden, en zich zelf dikwyls toeroepen, spoed langzaam.

De *pleuritides* waren egter somtyds met veel gal gepaard, wanneer de zieken over zwaare drukking omtrent den hartkolk klaagden; behalven een aderlating, wierden dan braak- en purgeermiddelen, welke zagt en gemaklyk werkten, gevorderd.

De *cholerae*, welke deeze maand heerschten, waren hevig, maar kortstondig, men had hier geen

era-

evacuantia nodig om de natuur, die uit zich zelve zeer werkzaam was, te helpen. Men behoefde hier niets dan doorspoeling, waardoor veel dikke gal geloosd wierd. Na het aflopen der ziekte waren hier *rhabarbarina* en zagte *aromatica* nuttig om de ingewanden te versterken.

Kinderen hadden deeze maand wederom een *febris remittens*, welke met de te vooren beschrevene *febris verminosa spuria* overeen kwam, doch niet na ontlastende middelen wilde luisteren, maar veeleer daardoor verergerd wierd en kwaadaardige toevallen aannam. De koortsbast met *sp. vitrioli* en wyn bevorderden een zagte uitwaasfeming en deden deeze toevallen verdwynen.

By een kind, 't welk deeze ziekte zeer erg gehad had, ging deeze koorts in een *rheumatismus* over, welke eerst den buik en daarna de beenen aandeed, de *gum guajac* met *sp. Minder*, *sp. CC.*, spaansche vliegen, maar vooral het warme bad, deden hier zeer goede diensten.

Deeze koorts scheen tot de *febres catarrhales malignae* te behoren, welke, offchoon uit een belette uitwaasfeming voortspruitende, niet door eenvoudige zweetmiddelen moesten behandeld worden, om dat de vogten bedorven en de vaste deelen te veel verzwakt waren, hierom waren versterkende en bloedverbeterende middelen, welke aan de vaste deelen de behoorlyke kragt en aan de vogten haare voorgaande lyvigheid en menging wedergaven, hier noodzaaklyk. Deeze maakten,

dat de natuur behoorlyk ondersteund, zich zelve redde, en de gezonde vogten van de schadelijke afgescheiden en uitgedreven zynde, weder in staat gesteld wierd, om haare verschillende werkingen weder te kunnen uitoeffenen.

Wanneer 'er omtrent den 10 een schielyke verandering in den dampkring voorviel en de koude O. wind in een W. veranderde met warmen regen, kreegen wy netelroos, St. antonies vuur, diarheen en colicquen; alle deeze ziekten hadden in het begin tekenen van *ja-burra biliosa* in de eerste wegen by zich, welke eerst door een braak- en purgeermiddel moest ontlast worden, voor dat deeze ziekte konde hersteld worden.

De geheele maand door, maar vooral om deezen tyd, heerfchte 'er een ongesteldheid der maag, zodat alle ziektestoffen zich op dit ingewand schenen vast te zetten, terwyl de overige werkingen des lichaams geregeld haren gang gingen. Deze aandoening der maag wierd vooral bespeurd by die geene, welke anders gewoon waren jigtpynen te lyden, en by deezen wierd de pyn in de maag gemeenlyk door jigtpynen voorafgegaan. By anderen waren deeze pynen afwezig. Eenige hadden walging en gebrek aan eetlust, andere daarentegen hadden veel honger, doch moesten na den eeten aanstonds alles weder overgeven. Na het eeten volgde spanning en opzetting der maag met een scherpe en snydende pyn, welke zo lang duurde tot dat alles uitgebraakt was, of 'er rommelingen ontstonden, die pyn in de buik gaven, welke langzamer-

merhand verdween; gedurende deezen aanval was het aangezicht bleek en ingetrokken, en de pols zeer klein. De huid was by deeze lyders droog en zy waasfemden des nagts zelf niets uit. De afgang was hard en kleiagtig, of dun met perfingen, die voor een tyd de pyn wegnamen. Het water was rood en dik met een wit poejeragtig rheumatisch zetzel. Deze pyn plaagde zomtyds ook de zieken des nagts: alle dranken, maar vooral warm genomen, bragten den aanval van pyn meest oogenbliklyk aan.

In 't eerst dagt ik, dat 'er een taaye flym in de maag was, welke deeze toevallen te weeg bragt, maar dewyl ik zag, dat alle ontlastende middelen nadelig waren, fchreef ik dezelve aan een andere oorzaak toe. Ik oordeelde, dat het langdurig vogtig weêr de ingewanden verzwakt en daardoor een moeilyke spysvertering te weeg gebragt had, dat hierdoor krampen en winden ontftonden, welke tot deeze toevallen aanleiding gaven. Hierom fchreef ik eerst verfterkende en windbrekende *aromata* voor, dan daar deeze veel nadeel deden, raakte ik in 't begrip, dat 'er een foort van *erythema ventriculi* plaats had, uit een rheumatique oorzaak voortspruitende, en agtervolgens deeze aanwyzing gaf ik involverende middelen en *oleosa* met *opium* verbonden. Ik vond egter, dat ook deeze middelen flegts vóór een korten tyd voldeden. Daar ik te voren in maagkrampen zeer fchone uitwerkingen van het *magisterium Bismuthi* gezien had, befloot ik eindelyk, dit middel hier te beproeven. Ik gaf ten dien einde 4 gr. vier maal daags met een wei-

nig suiker, en ondervond wel dra, dat dit middel in deeze ziekte specifisch werkte; want naauwlyks was het zelve gedurende twee dagen gebruikt of de pijn was geheel bedaard, de lyder braakte niet meer, kreeg natuurlyken stoelgang, en 's nagts een goede uitwaasfeming. Aan allen, welken ik dit middel heb toegediend, gaf het de spoedigste en zekerste verligting, de pijn keerde niet weder en de zieke herstelde volkomen. Ik heb zedert dien tyd zeer dikwyls het *magist. Bismuthi* in krampagtige buikpynen met het heerlykste effect toegediend, dan wanneer hierby een diarhé gepaard was, of de pijn niet fchielyk genoeg bedaarde, voegde ik 'er een kleine hoeveelheid *opium* by, welke de kragt zeer vermeerderde. Zeldzaam deed het eenige zichtbare uitwerking op het lichaam zelf, wanneer ik het langzaam opklimmende, tot 4 grein toediende: eens heb ik het slegts braking zien veroorzaaken.

Deeze maagpyn was egter niet altyd van denzelven krampagtigen aart: by sommige was zy waarlyk ontstekingagtig en met *enteritis* of *gastritis* gepaard, waarby zich een *labes biliosa* voegde. By andere ging een verkoudheid vooraf, waarop een diarhé volgde met koorts een ingetrokkene pols, dorst, zonder walging, maar met zulk een gevoeligheid der maag, dat zy zelf geen drinken verdroegen. Deeze pijn veranderde dikwyls van plaats, zodat zy dan eens het hoofd, dan wederom de maag of ingewanden aandeed, dan wederom een prikkelenden scherpen hoest veroorzaakte; het water was troebel met een wit zetzal. — By anderen was

was van het eerste begin af aan, walging en braking met een pyn, die zich van de maag tot de valsche ribben uitstreckte, en dikwyls van plaats veranderde; de ademhaling was te gelyk moeilyk; 'er voegde zich hierby koorts met een harde en volle pols, die zich 'savonds verhefte; de buik was hardnekkig verstoppt. Aderlatingen deden hier veel nut, maar vooral vond ik hier kleine giften Epsoms-zout van een uitstekende werking.

Veele vrouwen hadden *haemorrhagia uterina*, andere bloedbrakingen. By eene was het uitgebraakte bloed zo zuur, dat het de keel raauw maakte en de tanden verstoppte.

Omtrent den 22, terwyl 'er een koude O. wind waaide, waren de ziekten meer *inflammatoria biliosa*. De *anginae* waren zo hevig ontstekingsagtig, dat ik in 't begin dezelve voor roodvonk aanzag, zy waren gepaard met geweldige braking, een zeer hevige ontstekingskoorts, en een sterke zwellling in de geheele keel, het water was zeer dik en brandig, en het zweet sterk. Deeze zeerekeelen gingen gemeenlyk zeer schielyk tot verettering over, en maakten zeer vuile gryse zweeren, eene aderlating in 't begin, en daarna braak- en purgeermiddelen, waardoor veele galagtige stoffen ontlast wierden, bragten hier de spoedigste hulp aan.

De roodvonk was noch zo dodelyk dat 'er deeze maand 10 aan stierven, waarvan 9 jongens en slegts een vrouw van 22 jaren. Deeze ziekte was ook gal- en ontstekingsagtig, en met een *febris ardens* gepaard, waarop men alleen in de behandeling letten moest, en welke

verwaarloosd zynde, de gevaarlykste toevallen, en den dood zelf te weeg bragt. Een kind, 't welk door een hevige koorts met braking en stoelgangen wierd aangetast, kreeg den volgenden dag de uitflag der roodvonk, welke gepaard ging met een hevige koorts, ylhoofdigheid, en hevige benaauwdheid; op den 4de dag der ziekte, wanneer alle deeze toevallen vermeerderd waren, wierd ik geroepen. Ik vond het kind bleek en betrokken in 't weefsen, het geheele lichaam was bedekt met een geelagtig purperroode kleur, de huid was brandend heet, de keel was geheel verzworen, en met een gryse korst bedekt, uit de neus droop een fcherp stinkend vogt, de oogen fchitterden en waren waterig rood, het kind ylde hevig. Men had niets gedaan dan vlierthee geven. Daar het kind reeds te veel verzwakt was om aderlatingen te doen, of braakmiddelen te geven, liet ik bloedzuigers agter de ooren leggen, een clyster zetten, en ik fchreef een drankje van *Manna*, *nitrum* en *oxymel* voor. Door de ontlasting van bloed bedaarde de yling en kittelende hoest, die ook reeds plaats had, en het kind kreeg verliggende afgang. Den volgenden dag vermeerderde de koorts en alle toevallen, en 't kind was zodanig zwak, dat het ondanks het aanleggen van spaansche vliegen, het gebruik van campher &c. reeds den volgenden dag ftierf. — Het broeyen en de vlierthee waren hier zeer verkeerde middelen geweest, en ongetwyfeld het verzuim van aderlatingen en braakmiddelen de oorfaken des doods.

De

De kinkhoest was nu epidemisch onder een geringere soort van menschen. Die gene, welke ik aan den kinkhoest had, waren erger ziek dan na gewoonte, en de ziekte luisterde niet na de gewoone middelen. Na het toedienen van braak- en purgeermiddelen, heb ik my met veel vrugt bediend van kleine giften saffraan met *castoreum* gemengd. 'Er stierven aan deeze ziekte 5 kinderen, waarvan drie jongens en 2 meisjes.

De pokjes waren nu zodanig verspreid, dat zy in alle de hoeken der stad waren. 'Er stierven 26, waarvan 15 jongens en 11 meisjes.

Jongens.

Meisjes.

Van 4 weken .	1	Van 10 maanden .	1
Van 8 maanden .	1	Van 1 tot 2 jaar .	0
Van 1 tot 2 jaar .	2	Van 2 tot 3 jaar .	4
Van 2 tot 3 jaar .	3	Van 3 tot 4 jaar .	1
Van 3 tot 4 jaar .	1	Van 4 tot 5 jaar .	0
Van 4 tot 5 jaar .	1	Van 5 tot 6 jaar .	2
Van 5 tot 6 jaar .	1	Van 6 tot 7 jaar .	1
Van 7 tot 8 jaar .	1	Van 10 tot 11 jaar .	1
Van 8 tot 9 jaar .	2	Van 13 tot 14 jaar .	1
Van 18 jaar	1		
Van 24 jaar	1		11

15

De pokjes waren meest goedaartig, vooral by jonge kinderen en volwassene menschen. Zeer kleine kinderen hadden weinige en zeer onderscheidene pokjes, welke zonder veel koorts

in weinige dagen hare verschillende tydperken gemaklyk doorliepen. Offchoon de volwassene in 't begin een zwaare uitbottingskoorts hadden, welke gedeeltelyk ontsteking-, gedeeltelyk galagtig was, hadden zy egter onderscheidene pokjes, zy waren groot, duurden lang, en hadden een aanmerklyke *febris secundaria*. De toevallen, welke de eruptie voorgingen, waren by zommige catarrhaal, by andere galagtig. In beide begon de koorts met koude en rilling en daarna warmte. Wanneer 'er galkoorts by was, was de hitte heviger met ylhoofdigheid en zeer zwaare hoofdpyn, by deezen was de mond en neus geel, en de tong galagtig beflagen, de walging was heviger, en 'er wierd groene gal met braaken opgebracht. 'Er was ook zwaarder pyn in den rug en mattigheid; de koorts bleef langer na de uitbotting aanhouden, maar was remitterende, en verhefte des avonds; den geheelen loop der ziekte door hadden zy saffraankleurig dik water. By deezen was het nodig genoegzame ontlastingen te onderhouden en het was 'er zo verre van daan, dat dit de pokjes zoude doen inslaan, dat de zelve daar door veel beter etterden. Die een catarrhale koorts met de pokjes verbonden hadden, niesden, hadden hoest, tranen der oogen, een dunne pis, of een sterk zuur zweet, egter belette dit het uitkomen der pokjes niet, ten zy de zinking zich op eene byzondere plaats vast zettende. In dit geval belette de prikkeling der catarrhale stof, dat de gifting niet behoorlyk geschieden, en de ziektestof zich niet van het bloed konde afscheiden en op de
huid

huid plaatsfen. En dit koomt my waarfchynlyker voor dan de gedagte van VAN SWIETEN en voorheen van SYDENHAM, die meende, dat de pokstof zich eerst op het een of ander deel vastzette en daarna naar de huid gedreven wierd, zo dat zy in verfchillende menfchen eerst de keel, den rug of de longen aandeed, en daar ontftekingagtige toevallen voortbragt, en vervolgens in 't bloed opgenomen zynde, zich naar de huid begaf.

By een kind, 't welk door de pokjes befmet was, zag ik eerst de klieren van de keel opzwellen, daarna kreeg het hevige en ftekkende pynen op de borst, na twee aderlatingen, fpaanfche vliegen, en verdunnende dranken te hebben toegediend, kwamen 'er goede pokjes, welke een zeer geregelden loop hielden, dan wanneer de pokjes afgelopen waren, kreeg het rheumatique pynen, die eerst de beenen, daarna de armen en eindelyk het hoofd aandeden, welke door warme baden en zweetdryvende middelen overwonnen wierden.

Zware en herhaalde ftuipen in 't begin der ziekte, waren voor my altyd een flegt teken, ik zag daar na of *cohærente*, of *confluente* pokjes volgen.

Een geringe graad van koorts, ja een geheele koortfloosheid met goeden eetlust, fonder dorst en een bedaarde pols, beloofden altyd geen goede ziekte. Ik heb in de flegfte *confluente* pokken, welke niet wilden zweeren, en eindelyk dodelyk wierden, na de *eruptie* de koorts zien ophouden, en de kinderen verfcheide dagen agter een, met veel graagte alles zien eten, wat men hun voorzette.]

De

De dagen van het uitkomen der pokjes zyn dikwyls zeer moeilyk te bepaalen, en ik vond het daarom veel geschikter met ZEVIANI, het begin der ziekte van den dag van het uitkomen der pokjes te berekenen. Veele kinderen krygen de pokjes, zonder van eenig belang ziek te zyn. Andere zukkelen reeds verscheidene dagen te voren. Ik heb zeer flegte pokjes tegelyk met de koorts zien uitbotten. Over het algemeen kan men stellen, dat de goede en geregelde pokjes op den 4den dag der eruptiekoorts uitkomen, en dat flegte kwaadaartige pokjes, op den 2den of derden dag zich vertonen: dan de ondervinding zal elk oplettend Geneesheer doen zien, dat dit zeer verschillend kan zyn.

By eenige kinderen zag ik reeds op den eersten dag een enkel pokje op het voorhoofd, den hals, de hand, of ook wel op een of andere plaats van het lyf, welke een byzonderen en van de overige pokjes verschillenden loop hield. Deeze enkele pokjes waren reeds lang vol etter voordat de anderen zich tot zweeren schikten. Ik heb ook niet gemerkt, 't geen MORTON als een doorgaande regel houd, dat *distincte* pokjes genoegzaam op eens, en *confluente* pokken zich langzaam vertoonen, en zich als steelsgewyze verbreiden. Dit heb ik zo wel in *distincte* als *confluente* pokken waargenomen. Altyd heb ik het egter voor een flegt teken gehouden, wanneer de pokjes eerst aan de beenen en zich van onderen na boven uitbreideden; dan wierd meestal langzaam het geheele lichaam en vooral het aangezicht met *confluente* pokjes bedekt; de voornaamste uitbotting zag ik intus-

schen

fchen genoegzaam altyd op den zesden dag der koorts gebeuren. In zeer onderscheidene pokjes was de uitbotting volkomen op den 6 den dag; van den 8 tot den 10 dag duurde de ettering, en van dien tyd af begonnen reeds de pokjes te drogen. Dit had egter meer by kinderen, dan by volwasfenen plaats, by de laatsten begonnen zy eerst omtrent den 12den dag in 't aangezigt te drogen, daarna zwooren de handen 2 dagen, hierop volgde de ettering der beenen, welke gewoonlyk tot den 19 of 20 dag duurde.

In confluerende polsjes begon de zwelling van het aangezigt eerst op den 9den dag, wanneer 'er een etterende korst over het geheele weezen verspreid was, waar tusfchen zich hier en daar bruine vlekken vertoonden, op die plaatfen, daar de pokjes afgerukt waren. — Omtrent den 8ften dag begon de kwyling, maar te gelyk een zekere heeschheid en holle hoest; 'savonds was 'er een aanmerkelyke koortsverheffing, die tegens den morgen een weinig naliel, wanneer de ademhaling ruimer wierd, en de fluimlozing overvloedig was. Zy waren niet te min in het grootfte gevaar, wanneer de zwelling van het aangezigt op het einde van den 11den dag begon te verminderen, en de handen begonnen op te zetten, als dan kwam 'er een zeer hevige koorts met ylhoofdigheid, benaauwdheid op de borst, een heefche ftem en een zeer drooge tong. In deeze gevaarlyke omftandigheid heb ik meer dan eens gezien, dat 'er een fterke kwyling, doorloop en pifvloed kwam, maar dat even daardoor de pokjes flonken, plat en bleek wierden, dat 'er een rotkoorts ontftond, met een ondraag-

draaglyken stank, dat de zieken geheel loodkleurig wierden, en onbeschryfelyk benaauwd op den 15 dag stierven. Zommige egter wierden, niet tegenstaande de *febris secundaria* zeer hevig was, en 'er zeer sterke stuipen waren, nog gered. By deesen egter zag ik, dat 'er zeer dikke etterkorsten kwamen, welke zich verscheiden malen vernieuwden, een ondraaglyken reuk hadden, en het aangezicht zo wel als het geheele lichaam bedekten.

By een scrofuleus kind zag ik een suppurerende *parotis* ontstaan, dan by dit kind hadden de pokjes ook slegts twee dagen geëtted. By zommige zag ik *ophthalmia*, en pokjes op het hoornvlies op den 20 of 21 dag der ziekte komen; *purgantia*, spaansche vliegen agter de ooren, en een oogwater met *vit. alb.* of *fl. zinci* met rosenwater, genasen dezelve alle in weinige dagen.

Ik zag weinig napokken, waarfchynlyk om dat ik by het afnemen der pokken ruim den buik open hield.

Met opzicht tot de voorbehoeding, liet ik in de huizen, daar dit geschieden konde, de gezonden van de zieken zo veel mogelyk afscheiden, ik liet ze alle van wyn en vleesch onthouden, veel verdunnende en zuure dranken drinken, groentens en vrugten eeten, en gedurende al dien tyd, door tamarinde en *manna* ruim open lyf houden.

Myne behandeling was in alle gevallen eenvoudig, en na elk byzonder geval geschikt. By volwassenen, volbloedige kinderen, of by een hevigen aanval van koorts, liet ik een ruime ader-

aderlating doen, en by de meeste was het bloed galagtig en ontstoken. Na de aderlating gaf ik een braakmiddel, wanneer ik kwade stoffen in de maag vermoedde; de braking verminderde gemeenlyk de gedurige walging, en bevorderde een goede uitbotting. Ingeval van stuipen, liet ik aanstonds stovingen van warm water en melk om den buik en beenen leggen, en gaf een half of heel grein *fl. zinci* na mate van omstandigheden. Hierdoor wierden de stuipen dra bedaard. Na de aderlating en het braakmiddel, gaf ik een *laxans*, opdat de pokjes in haren loop, door geene kwade stoffen in de ingewanden zouden gestoord worden. In zeer onderscheidene pokjes gaf ik geheel geene geneesmiddelen, en liet de zieken enkel veel van den een of anderen zuuren drank drinken. Wanneer 'er catarrhale toevallen waren, of een zinking zich op de een of andere plaats neerzette, liet ik spaansche vliegen leggen, en de geheele ziekte door *sulph. aur. antim.* gebruiken. In die *confluenten*, waarin de borst en keel byzonder aangedaan waren, en een kittelende hoest de zieken gedurig plaagde, liet ik van den 6den dag af een *anodynum* gebruiken, en tegelyk *epispastica* om de keel leggen. De vervallene levensgeesten tragtete ik door koortsbast en rynschen wyn te ondersteunen; de keel liet ik met emollierende en afvagende mondspoelingen gorgelen; en om de stof na buiten te bepalen, liet ik de campher met *sulphur aurat.* gebruiken. Warme baden liet ik dikwyls, van het begin der ziekte aan, met een uitnemend goede

de

de uitwerking bezigen. Omtrent den 10den dag, fomtyds reeds op den 8 of 9, liet ik de handen en beenen in haverdegort pappen met zuurdeeg gemengd, leggen, welke fomtyds een oogenschynlyk nut, dan weder by anderen niet de minste vrugt, even min als de spaansche vliegen, aanbragten. Wanneer de borst vol en de ademhaling zeer benauwd was, liet ik een zeer groote spaansche vliegplyster tusschen de schouders leggen, en gaf inwendig een mixtuur van *oxym. scill.* met *sulph. aur.* of *Tart. Emetic.* zodat 'er een ligte braking wierd voortgebragt. Ik heb van dusdanig een behandeling eens het uitstekendste nut gehad by een kind, 't welk op het punt van stikken was, wanneer de borst door een ruime braking geheel verligt en de pokjes met etter gevuld wierden. Zodra het wesen begon te drogen, liet ik op een voorzigtige wyze tusschen beide *laxantia* gebruiken, dewyl door een onvoorzigtige toediening deezer middelen, de handen en voeten ligt dun worden, en de pokstof na binnen gaat, terwyl te gelyk de fluimlofing belet word. Na het drogen der pokjes liet ik myne zieken zeer ruim en langdurig purgeermiddelen gebruiken, om de napokken voor te komen.

December.

De wind was met het begin der maand O. met nevel en regen, op den derden wierd de wind N. en 'er kwam een schoon helder weêr met vorst. Den 4 veranderde het weêr schie-lyk van zeer koud in warm, terwyl de wind
ZW.

ZW. wierd. Den 9 en 10 hadden wy een kouden regen met een NW. of N. wind. Op den dag van het eerste quartier den 11 ging de wind van het ZW. na het Z. en het weêr wierd schoon en warm. Op den dag der volle maan den 17 was de wind N. en koud, maar den volgenden dag was de wind Z. en veranderlyk tot den 22, toen hadden wy tot den 29 een drooge koude met mist, den 30 begon het te vriesen, en op den 31 was de vorst zelf streng.

Het vogtig en slap weêr en W. wind, na de N. koude, die slegts twee dagen duurde, veroorzaakte veele verkouwdheden met koorts en een scherpen hoest, deeze verkouwdheden waren zo algemeen heerschende, dat wy in elk huis daaraan verscheide zieken hadden. Na eene behoorlyke zuivering der eerste wegen, waren hier kleine giften van de *Ipecacoanna* als *antis-pasmodicum* zeer dienstig.

Wanneer de wind den 3den schielyk N. wierd, was de rheumatische hoofdpyn de meest heerschende ziekte. Deeze was somtyds zo hardnekkig, dat zy na geene aderlatingen, spaansche vliegen, opiaten, of ontlastende middelen luissterde. Zy kwam ongeregeld aan, en kwelde vooral de zieken des nagts. Zy was somtyds met een remitterende koorts, duifeligheid, verstopping van afgang, en gebrek aan eetlust verzeld. Na een aderlating, waardoor een zeer dik en taay bloed ontlast wierd, waren zeer lang gebruikte *resolventia* van het meeste nut.

Er waren nu ook veele geelzugtige zieken, welke ziekte haren oorsprong nam uit een ver-

dikte gal en belette uitwaasfeming. In het begin was 'er eenige koorts met walging en een bittere mond, 'er was een zeker gevoel van volheid en benauwdheid op de plaats der lever. Het aangezigt en oogen waren geel, de tong galagtig, en het water dik en groenagtig. De zieken wierden in 't begin verligt door het braken van veel dikke gal, en vervolgens door het ontlasten van slym en kleyagtige stoffen door middel van openende *decocta*, waarna een overvloedig zweet volgde, 't welk de ziekte scheidde. — By anderen was de regter zyde der buik opgezet en by de aanraking pynlyk, offchoon de eetlust goed was, en de overige werkingen van het lichaam geregeld haren gang gingen. Oplossende *extracta*, de *spir. æthereus*, en daarna staalmiddelen, waren deesen dienstig.

De koortsen waren nu zeldzamer, zy bleeven egter noch *inflammatorio-biliofa*. Zy begonnen met een boord waardoor veel ware gal na boven en na beneden werd uitgeworpen, de tong was geel, de mond bitter 'er was een spanning omtrent de *hypochondria*, de ontlastingen waren aanhoudend sterk, de koorts begon des avonds met hitte, en remitteerde des morgens met zweet. By zommige bleef 'er nadat de koorts geweken was langen tyde en pyn op de hoogte der lever.

Nadat de N. wind zich met een Z. wind en warmen regen verwisfeld had, zagen wy wederom veele *dolores ventriculi & intestinorum rheumatici*; zagte *rhabarbarina*, en daarna campher
met

met *sulph. aur. antim.* en het *magist. Bismuthi* hadden hier een zeer goede uitwerking.

Den 22 kreegen wy een scherpere koude met een O. wind, en hierdoor wierden de ziekten meer ontstekingsagtig, offchoon zy nu meer na het zwartgallige reeds overhielden. De *podagra*, *peripneumonia notha* roos &c. en de *febris hyberna* waren het meest heerschende. Het bloed was by allen, die adergelaten wierden dik, taay, stroopagtig met een wankleurige korst bedekt.

Den 30 en 31 begon de N. wind te waaien en bragt een scherpe vorst aan. De *morbidi atrabiliosi* waren nu zwaarder en hardnekkiger, en vorderden een meer vry gebruik van aderlatingen, en emollierende middelen.

De atrabilieuze koorts, die de laatste dagen van dit jaar heefchte hield dit beloop. Gedurende eenige dagen was 'er een gebrek aan eetlust, zwaarte en mattigheid des morgens na een onrustigen slaap, benaauwdheid na den eeten, vervolgens walging, braaking en zwaare hoofdpyn. Op eens wierden de zieken nu van de koorts aangetast, die met zwaare rilling en koude aankwam, met hitte en kloppende hoofdpyn, een geelagtige roodheid van het aangezicht en pyn in den rug en lendenen voortging, en met een zwaare benaauwdheid omtrent den maag, die geen drukking duldde gepaard was. Zommige hadden hevige pyn in de zyde met hoest, andere buikpynen met opzetting en hardheid des onderbuiks; alle waren hardlyvig en hadden een moeilyke waterlofing. Het water was dik als gist van bier, en donker bruin met een onvol-

komen rosagtig bezinkzel. De pols was hard en vol, de hitte en dorst waren onverdraaglyk, de tong droog en geel. Des morgens nam de koorts een weinig af, maar de benauwdheid en hoofdpyn bleeven dezelve. Een ruime aderlating was hier by allen aangewesen, welke de koorts niet alleen matigde, maar ook de aanwendig van andere middelen veiliger maakte. Het bloed was dik en zo zwartgallig, dat het na teer gelek. Na de aderlating werd aanstonds een braakmiddel gegeven, het welk door het ontlasten van veel dikke flymagtige gal aanstonds het hoofd en de maag verlichtte. Vervolgens maakte ik gebruik van resolverende en losmakende dranken, welke een zwarte teeragtige stof in eene zeer groote hoeveelheid ontlasteden. Deeze stof was zodanig teeragtig, dat zy na zwart bloed gelek. Wanneer men gedurende twee of drie dagen met deeze behandeling aanhield, scheen de ziektestof zich door deezen weg volkomen te ontlasten, het water werd natuurlyk, en de koorts week geheel en al. — Het braakmiddel wegens een pyn in de zyde of belette waterlofing niet kunnende worden toegediend, was men verpligt door omwegen, en herhaalde purgeermiddelen langzaam te verrigten, 't geen men anders spoedig en op eens doen konde, de koorts week dan ook meer langzaam door dusdanig een behandeling, — De ziekte in de eerste dagen versuimd of verkeerd behandeld zynde, kwamen 'er spruw en zweeren in de keel. Zuure dranken, ontlasteden dan langzaam de galstoffen, waarna openende en verzagende *decocta* alle de

we-

wegen open zetteden, opdat de natuur zich gemaklyk en op hare eigene wyze zich van dezelve ontdoen zoude.

De mazelen, die ik reeds hier en daar op het laatst der voorgaande maand begon te bespeuren, waren nu reeds vry algemeen, zo dat 'er reeds vier aan stierven, waarvan 2 jongens en 2 meisjes.

By de meesten waren de mazelen zeer goed-aartig, doch by zommige was de ziekte moeiliker. By een kind van drie jaar begon de ziekte met zwaare hoofdpyn, benaauwdheid op de borst, pyn in de keel en hevige koorts; op den derden dag kwam 'er een uitbotting van kleine roode puisten, even als van confluyente pokken. Op den 4den dag geroepen zynde was het aangezicht rood, de keel zat vol met kleine roode puisjes, 'er was een zeer scherpe hoest en benauwde ademhaling, de huid was brandende en het kind was zeer ylhoofdig, de pols was hard en snel. Daar 'er nu catarrhale pokjes regeerden, zag ik dezelve daarvoor aan. Ik liet het kind aderlaten, een clysteer zetten, een pap op de borst leggen, en gaf het een mixtuur van *ipecac.* met *Manna*. Den 5den dag hield de hoest byna op, de puisjes kwamen meer te voorschyn, en waaren verheven en groot op de armen. Op den 6den dag konden eerst duidelyk zien, dat het mazelen waren, en nu vertoonden zich de verhevene puisjes als breede vlakken over het geheele lichaam, zy waren egter nu meer purperagtig, en den 7den dag begonnen zy reeds te verdwynen. — Een verzameling van *saburra* in de eerste we-

ch. O 3 gen,

gen, of een fcherpe stof, welke zich op het een of ander deel heeft vastgezet, verhinderen zomtyds de behoorlyke *assimilatie* en uitbotting der mazelen. Een klein kind, 'welk langen tyd gehoest, en tegelyk darmfcheils-verftoppingen had, kreeg een kleine uitflag van mazelen, die denzelven dag wederom verdween, 'er droop een zeer fcherp vogt uit de neus, welke de neus en mond ontvelde, ik liet aanftonds een clyfteeer zetten, en ik gaf het kind poeiers van *Ipec.* en *fulph. aur. antimon.* Na dat hier door veel flym door braken en purgeren geloofd was, kwamen den volgenden dag de mazelen zeer fterk voor den dag, dan daar het kind niet in het bed gehouden wierd, verdweenen zy reeds des avonds, de oogen wierden nu ontstoken, de hoest wierd wederom fterker, en de tong was zeer rood. Na dat ik het een verzagende borftdrank en veel verdunnende drank had laten gebruiken, brak 'er een fterk zweet uit, de mazelen kwaamen wederom ten voorschyn, en het kind wierd in twee dagen gezond.

De roodvonk bleef steeds kwaadaartig en was nog zo doodelyk, dat 'er in deeze maand nog 9 aan ftierven, waarvan 5 jongens en 4 meisjes

De grafferende koorts was met de roodvonk verbonden, de ziekte begon met pyn door alle leden, voor al in het hoofd en rug, hevige braking, 'savonds kwam de koorts met koude aan, hierop volgde een brandende hitte, 'smorgens begon de koorts na te laten; de koorts wierd aanftonds verzeld van pyn, zwelling en roodheid der keel, by zommige begonnen onmiddelyk, by an-
de

deren in het hevigste der ziekte, een of beide de *parotides* te zwellen, de tong was vuil, de mond bitter, het aangezicht bleek geel, de huid zeer droog de pols hard en zeer snel. De uitflag kwam op den 3den of 4den dag, zonityds zelf later, zy was niet algemeen, maar alleen onvolkomen, en op zommige plaatsen van het lichaam; by deezen was de borst vooral benauwd en het wezen zeer ingetrokken. De koorts was overdag niet aanmerklyk, maar verhefte des avondseerst met koude, en daarna met zeer sterke hitte. Het was een zeer kwaad teeken, wanneer de uitbotting in den verderen voortgang der ziekte ophield en de borst benauwd wierd met hoest en ylhoofdigheid, en de neus een scherp en ontvellend vogt ontlastede. Die deze toevallen hadden, stierven alle. Offchoon de braking in het begin der ziekte verligte, en 'er door den afgang veele galsstoffen ontlast wierden, bleef de koorts even hevig aanhouden. Herhaalde aderlatingen, een sterke vloed der stonden, en neusbloeding verligteden de ziekte zeer. Wanneer de braking in den voortgang der ziekte bleef aanhouden toonde dit, dat de roodvonk zich op de maag plaatste, warme stovingen der buik, en emollierende en pynstillende dranken, bedaarden uitnemend dit toeval. De geheele ziekte door waren de zieken zeer mismoedig.

Het getal der geenen, die aan de kinderpokjes lagen, werd dagelyks grooter, zo dat 'er deeze maand 69 stierven, waarvan 39 jongens en 30 meisjes.

De ouderdom was van de.

Jongens.

en Meisjes.

Van 6 tot 9 maand. 4	Van 9 tot 12 maand. 2
Van 9 tot 12 3	Van 1 tot 2 jaar . . . 3
Van 1 tot 2 jaar . . 3	Van 2 tot 3 jaar . . 4
Van 2 tot 3 jaar . . 8	Van 3 tot 4 jaar . . 5
Van 3 tot 4 jaar . . 3	Van 4 tot 5 jaar . . 7
Van 4 tot 5 jaar . . 6	Van 5 tot 6 jaar . . 1
Van 5 tot 6 jaar . . 2	Van 6 tot 7 jaar . . 3
Van 6 tot 7 jaar . . 2	Van 8 tot 9 jaar . . 4
Van 7 tot 8 jaar . . 2	. . . 46 jaar . . 1
Van 8 tot 9 jaar . . 0	
Van 9 tot 10 jaar . . 1	
. . . . 14 jaar . . 1	
. . . . 17 jaar . . 1	
. . . . 20 jaar . . 1	
. . . . 22 jaar . . 1	
onbek. oud. . . . 1	

30

Offchoon de pokjes niet volstrekt kwaadaartig waren, waren zy minder goedaartig, als in de voorgaande maand. In het begin der maand was 'er een *febris catarrhalis*, of *rheumatico-inflammatoria* en op het einde een *febris inflammatorio-biliofa* mede gepaard.

Het tydperk der uitbotting was nu zwaarder, de koorts, yhoofdigheid, pyn in de keel en lendenen waren heviger, de walging was langduriger en lastiger, de uitbotting zelve was traag, en zelf by *discrete* pokken, was zy niet voor den 5den of 6den dag, en in *confluenten* voor den 7den voleindigt. Een zes jarig

rig

rig kind kreeg met een zwaare eruptie koorts zeer veel *distincte* pokken, na een paar dagen waaren zy alle volmaakt verdwenen op twee na, die haare tydperken zeer geregeld doorliepen. De vergezellende koorts der pokjes was meest catarrhaal, had een zeer ongeregelden loop, en hield niet geheel op na de volkome-
ne uitbotting, de zieken waren bleek, mismoe-
dig en hadden een ingetrokken wesen, de ligt-
ste oorzaak was genoegzaam om de pokjes te
doen inslaan. Van het eeten van rype druiv-
en niet tegenstaande de zieke 'savonds een
anodynum gebruikt had, zag ik by een vol-
wassenen op den 10 dag de pokjes door een
diarhé plat en neergeflagen staan, hy wierd eg-
ter schielyk door wyn en *cardiaca* weder her-
steld. In *confluente* pokken was 'er van het
eerste begin af aan traning der oogen, niezing
en hoest, de pokjes verheften zich naauylks
voor den 7den dag, wanneer het schein als of
de natuur een nieuwe poging deed om zich
te redden; de pokjes begonnen zich dan te
vullen maar met een raauw waterig vogt. Op
den 8sten dag wierden zy wederom plat. Op
den 9den dag vermeerderde de benaudheid en
hoest, en 'er was zelf by kleine kinderen een
aanmerklyke kwyling. By zommige maak-
te de catarrhale koorts, dat zelf de goedaartige-
ste pokjes op eens bleeven staan, en zonder
zweeren, langzaam verdroogden. Andere kree-
gen op den 10den dag een sterk zweest, het
welk zeer verliggend was, en waarna de pok-
jes zich vulden, en geregeld haaren loop af-
liepen. — De kwyling en een dunne over-
vloe-

vloedige waterige pis verligten de ziekte niet altyd, en kunnen de plaats eener geregelde ettering niet vervullen. Een kind, 't welk aan zeer erge zamenlopende pokken lag, had ik een spaansche vlieg tusfchen de fchouders gelegd, deeze ontlastede daaglyks veel etter en het kind fcheen ook beter te worden, intusfchen bleef het koortzig. Op eens kreeg het op den 24 dag zware ftuipen met braking en afgang; op den 30 dag wierden de ftuipen zo hevig, dat zy in een volkomene beroerte en verlamming der regter zyde overgingen, waaraan het op den 32 dag ftierf. In dit geval had de pokstof zich op de borst en de herfenen vastgezet. Dit kind kreeg geheel geen napokken.

By allen, warin deeze koorts de behoorlyke ontwikkeling van het pokgift belet had, ontftonden na de pokjes, diepe en langdurige verzweringen op verfchillende plaatfen des lichaams, terwyl voor het overige de eetlust goed was. Andere kreegen pokjes op het hoornvlies, en 'er vormde zich onder het zelve etter. Een aderlating, maar vooral fterk aangezette en lang opengehoudene spaansche vliegen en herhaalde fcherpe purgeermiddelen genazen dit gebrek.

By volwasfenen matigde de aderlating de uitbottings koorts, en hierna was een braakmiddel voor hun nuttig, om de eruptie te bevorderen. Beide waren by kinderen nadelig, daar zy de uitbotting verminderden en de kragten wegnamen; na de aderlating, hoezeer ook aangewefen, volgde aanftonds bleekheid en gebrek aan kragten, welke verfcheide dagen duurden. Hierom ont-

onthield ik my in het vervolg van deeze middelen, de buikzuiverende middelen deden dezelve uitwerking. Opwekkende middelen, rhynefche wyn; *spir. Minder. sp. CC.* maar vooral de campher met *vinum antimoni* deden het meeste nut. De gantfche ziekte door gebruikte ik emolliërende baden met het beste gevolg: ja zelf zach ik dat by een klein kind, 't welk reeds met den dood worstelde op den 9den dag, na het warme bad de pokjes met etter gevuld wierden, en daardoor de benaauwdheid wierd weggenomen, dit kind ftierf egter naderhand, aan ftuipen, daar het onvoorzigtig aan de koude wierd blootgefteld. — Wanneer ooit de *opium* in de pokken te ftadekwam, was het zeeker in dit foort van *variolae catarrhales*. Volgens het voorfchrift van SYDENHAM gaf ik alle avond een *anodynum*, maar hier wierd een ruime gift vereifcht, wanneer het niet alleen de groote gevoeligheid en koorts, maar zelf de ylhoofdigheid en *febris secundaria* uitnemend matigde.

Op het einde der maand waren de pokjes met een *febris inflammatorio-biliofa* gepaard. Zy begonnen met hevige hoofdpyn en braking het wesen was geel rood, zy waren zeer ylhoofdig, eerst was 'er een beurtlingsche koude en warmte en daarna een hevige hitte, neusbloeding, de uitbotting was langzaam maar volkomen, de pokjes wierden fterk met etter gevuld, en de vaten bleeven haar volle kragt behouden. Na een aderlating waren herhaalde braakmiddelen nuttig, daarna aanhoudende zuure *purgantia* als *tamarinde*, *cremor tar-*

tartari &c. juleppen, met azyn of citroen zuur gemaakt, waren tusfchen beide nuttig Om-trent den 9 of 10 dag gaf ik met nut ook *anodyna*. Deeze hadden geene napokken. In de catarrhale pokken zagen wy gedurende het zweeren der pokjes *parotides symptomaticæ*, welke niet tot verettering overgingen, maar met het droogen der pokken verdweenen.



LYST

L Y S T

D E R

G E S T O R V E N E N

In 's G R A V E N H A G E

I N D E N J A A R E 1793.

<i>January</i>	.	.	.	134
<i>February</i>	.	.	.	94
<i>Maart</i>	.	.	.	122
<i>April</i>	.	.	.	111
<i>Mey</i>	.	.	.	110
<i>Juny</i>	.	.	.	94
<i>July</i>	.	.	.	95
<i>Augustus</i>	.	.	.	89
<i>September</i>	.	.	.	100
<i>October</i>	.	.	.	119
<i>November</i>	.	.	.	169
<i>December</i>	.	.	.	181

Totaal

1418

KORT

KORT BERICHT D E R Z I E K T E N

Welke in de Jaaren 1791 92 en 93.

I N

B R E D A

GEHEERSCHT HEBBEN,

D O O R

D E N H E E R

H. MIRANDOLLE VAN GHERT.

Stads en 's Lands Med. Doct.

In het beloop van de ziekten, welke in de Jaaren, 1791 en 1792. binnen deeze Stad Breda geheerscht hebben, is weinig merkwaardigs voorgevallen. De pokjes, welke nauwlyks opgehouden, zig op nieuw begonnen te vertoonen, zyn in het algemeen vry gunstig geweest, en de talryke inëntigen derzelve met den besten uitslag agtervolgd.

Zinkings koortsen, welke in het voor jaar *sporadice* wierden waargenoomen, waren niet zoo goedaartig: in de maand van Maart heb ik enkele tot eene *febris petechialis* zien overgaan.

De *febris scarlatina* of zoo genaamd roodvonk heeft van de Zomer tot verre in het Najaar vry algemeen gewoedt, en ging, of in het beloop of in het vervolg, kwalyk behandelt of verzuimt zynde, dikwerf met treurige toevallen gepaart.

Kinderpokjes en roodvonk heb ik gelykty-

tydig elkander by dezelve lyders zien verzel-
len, de middenmaat van koelte en warmte in
acht genomen, en de geheele ziekte naar
wensch zien eindigen.

Kink-hoest en zinkingen maaken thans de
meest heerschende ziekten uit.

1793. In de winter was het weêr meest vogtig
en koud. Kinder pokjes, kink-hoest en zin-
kings ziekten heerfchten vry algemeen.

Het voor-jaar was schoon en warm.

Behalven de gemelde ziekten bragten de ge-
moeds aandoeningen en folterende hartstogten,
welke door de treffende rampen van den oor-
log geboren wierden, vooral by gevoelige en
zwakke lichaams gesteltenissen, in het alge-
meen de gezondheid veel nadeel toe.

De zomer heet en droog, zomtyds door slag-
regens en buijen vervangen.

De kinderpokjes wierden in de maand Juny
door roodvonk en mazelen afgewisselt, welke
schoon niet kwaadaartig, in het begin doorgaans
aderlatinge verëischten.

Het najaar wisselvallig en veel koude regen.

De roodeloop begon zich in de maand Au-
gustus, vooral in het oost gedeelte van de
stad te openbaaren, ging spoedig en als met
verdubbelde schreeden voor, verminderde in
de maand November en houdt thans geheel en
al op. Intusschen is dezelve gansch niet kwaad-
artig geweest en zeer gehoorzaam aan de ge-
neezings wyze, welke in myn voorig bericht
van den jaare 1783 aan het genootschap breed-
voeriger heb meede gedeelt.

KORT

KIORT BERICHT

D E R

Z I E K T E N

Welke in het Jaar 1791

I N

M E P P E L

GEHEERSCHT HEBBEN,

D O O R

D E N H E E R

B. W. VAN DE SANDE.

M. D.

Alvorens ik heb de opgave der ziekten een aanvang make, oordeele ik niet ondienstig te zyn, eene kleine beschryving te geven van Meppel, derzelver ligging en voornaamste bezigheden der Ingetenen, voorafgegaan door eene zeer beknopte opgave van de plaatselyke gesteldheid der Landschap Drenthe, aangezien ik my vleye in staat gesteld te zullen worden, om in tyds vervolg de waarneemingen van ziekten,

ten, op andere plaatzen in het Landschap gedaan, aan de Societeit te kunnen mededeelen.

Het Landschap Drenthe, welks omtrek ten naasten by op vyftig uren gaans gerekend word, grenst ten Zuiden merendeels aan de Provincie Overysfel; ten Westen aan Vriesland; ten Noorden voornaamlyk aan de Provincie Stad en Lande, en Westwoldingerland; en ten Oosten aan Munsterland en het Graafschap Bentheim. Het zelve ligt na genoeg op 53 graden Noorder breedte, en 23 graden Wester lengte; en behoort derhalven tot die gewesten, welke onder de getemperde Noordelyke luchtstreek gelegen zyn: deeze gunstige ligging des Landschaps veroorzaakt dus, dat de Ingezetenen 'er even min aan bovenmatige koude, als aan ondragelyke hitte blootgesteld zyn; maar integendeel zulk eene middelmatige luchtgesteldheid oplevert, als immer ten meesten nutte voor de gezondheid van het mensdom gewenscht konde worden.

De gehele oppervlakte van het Landschap Drenthe, over het algemeen hoog en zandig, is vry effen en egaal, eenigzints van eene bolronde gedaante, aan alle zyden langzaam afhellende, bestaande voor het meerdere gedeelte uit zand met steenen gemengd, of uit veengronden, over het geheel genoomen, zynde gronden meest allen met heide bewassen, de boschachtige streken uitgezonderd, gelyk de weide en zaaylanden alle oorspronglyk heidegronden geweest, doch door bearbeiding en bemesting tot vruchtbaar land gemaakt zyn.

De winden, welke doorgaans het meest in het

P

Land-

fchap waaijen, zyn de Ooste-, Noord-Ooste-, Noorde-, Noord-Weste-en Weste winden, welke allen koel, en volgens het getuigenis van Hypocrates de allergezondste zyn; de zelve worden door de hoogte of digtheid der bosschen, welke hier en daar in het Landschap verspreid liggen, geenzints belet de nuttige en voor de gezondheid der Ingezeten en zo voordelige beweging des dampkrings te veroorzaken.

Menigvuldige stroomen en kleine rivieren doorsnyden de oppervlakte van het Landschap, welke allen op of naby de verhevenste plaatsen van het Landschap geboren, in verschillende richtingen aan alle zyden naar buiten uitwateren; zommigen ontlasten zich in de Noordzee, een gedeelte van de Provincie Stad en Lande doorlopen hebbende: terwyl anderen op onderscheidene plaatsen naar de Provincie Overysfel afwateren. Alle deze stroomen hunnen oorsprong hebbende in regen of sneeuw water, het geen van de hoogten afloopt, ginds en elders beneden eenen uittocht zoekt, begunstigen grotelyks de gezondheid der Ingezeten en, terwylze door hunne gedurige afvlietingen aanhoudend versocht worden, de lucht verkoelen en verfrissen, en door gestadige bewegingen buiten berf en stank gehouden worden, en allerlyc vuiligheden met zich naar zee afvoeren. — De meesten dezer rivieren bevatten helder zuiver water, aangezien de oevers en gronden, langs en over welke het zelve loopt, meestal zandig zyn; in eenige slooten en beeken echter is de grond of bodem oerig leem en rosachtig van kleur; het water deeze kleur aannemende, heeft

heeft een yzerachtigen smaak: daar en tegen heeft het water, uit de Veengronden oorspronkelijk, een bruine kleur, en bevat eene aanmerkelyke hoeveelheid ontbrandbare lucht; de meeste Inwoonders van de Veenkoloniën bedienen zich tot dagelyks gebruik van het zelve, en zyn doorgaans gezonde en sterke menschen.

Het getal der Ingezetenen in vergelyking tot de oppervlakte van het gehele Landschap Drenthe is zeer gering; volgens de naauwkeurigste berekening is het zelve door een genomen 16 uren gaans lang en 8 uren breed; en heeft dus 48 uren in den omtrek; wanneer nu de breedte door de lengte wordt vermenigvuldigd, blykt het, dat de gehele oppervlakte van het Landschap honderd acht en twintig vierkante uren beslaat, op welke uitgestrekte plek gronds slegts ongeveer 7800 huisgezinnen geteld worden, welke volgens de meest aangenomene wyze van berekenen ter naauwernood een getal van 36000 Ingezetenen uitleveren.

Wat de levenswyze van het gros der Drenthenaren aangaat, dezelve is zeer eenvoudig, des avonds gaan zy over het algemeen vroeg te bed, en staan 's morgens vroegtydig weder op, den geheelen dag door zyn zy bezig met den Landbouw, veeteelt, en het geen tot het zelve behoort, eenige weinige plaatsen, welke meer tot den handel en scheepvaart gelegen zyn uitgezonderd.

— Hun voedsel bestaat merendeels uit melk en meelspyzen, aardappelen, vleesch en spek, en eigen gebakken roggenbrood; terwyl gekarnde melk en putwater, en tuschen beide de koffy, hun tot dagelykschen drank dienen. Hunne kle-

ding is warm, en bestaat by het gros der Ingezetenen, van wien dit alleen moet gezegd worden, uit dikke grove stoffen, bekend onder den naam van *Pey*, die van de wolte van eigene schaa-pen bereid word.

Gelyk het gehele Landschap in zes onderschei-dene districten of zogenaamde Dingspillen ver-deeld word, zo bevat ieder Dingspil, het een meer-der het ander minder, wederom verscheiden kerkdorpen, met derzelver aanhorige gehug-ten, welke allen te zamen een getal van 40 kerkdorpen uitmaken, de Stad en Heerlykheid Koeverden hier mede onder begreepen: de volk-ryksten van deze plaatzen zyn Koeverden, waar in ongeveer 300 huisgezinnen geteld worden; het Hogeveen en Meppel, welke ie-der afzonderlyk ruim 850 huishoudingen bevat-ten.

Meppel, op den Zuidwestelyken hoek van het Landschap Drenthe gelegen, is alleraangenaamst geplaatst op eenen genoegzaam hogen zandigen grond, rondsom omcingeld met groenlanden, in de gedaante van een stad gebouwd, voor-zien van een menigte ruime straten, welke al-len zindelyk en welgevloerd zyn; in den omtrek ongeveer 600 roeden groot. Door het vlek lopen van het Oosten naar het Westen twee stromende rivieren, welke door den gestadigen toevoer van versch water, en het aanhoudend afvoeren van vuilnis zeer veel voordeel aan de gezondheid der Ingezetenen toebrengen; be-halven deze lopen 'er noch verscheidene tak-ken van kleine riviertjes door en by Meppel henen, welke overal aan de Inwoonderen over-vloed

vloed van versch water opleveren. Langs de zuidzyde van Meppel stroomt de rivier de Rees, welke aldaar de scheiding maakt tusfchen Drenthe en Overysfel, terwyl aan de noordzyde, naby dit volkryk vlek de voor weinige jaren nieuw gegravene vaart henen stroomt, welke te Asfen zyn oorsprong nemende, door de Smilde, langs Dieveren, Havelte, voorby Meppel loopt, en aan de Westzyde beneden Meppel, vereenigd met de rivier de Rees, en de stroomen, welke door Meppel vlieten eene groote rivier uitmaakt, bekend onder de benaming van het Meppeler Diep, het welk zich, de zwarte fluys doorlopende, in het zogenaamde zwarte water ontlast.

In den omtrek van Meppel vind men fchoone groenlanden, waar van zommigen tot hooylanden, de meesten echter tot weide landen gebezigd worden, eenige van deze groenlanden, en wel voornaamlyk die aan de Westelyke zyde van Meppel gelegen zyn, worden des winters met versch water overstroomd, het welk in het vroege voorjaar door de oostlyke winden afgevoerd word en door de zwarte fluys zyn uitwatering heeft, wanneer die zelve landen in alleraangenaamste beemden en weiden veranderen.

Het getal der Ingezetenen van Meppel beloopt ongeveer vier duizend: een aanzienlyk gedeelte derzelven vinden hun bestaan in de weveryen van Canefas, een foort van ligt zeildoek, en Beddebuur; terwyl een menigte anderen hunne nooddrift vinden in de Scheepvaart: behalven deze handteringen vind men in

Meppel een Berlynsblauw fabriek, Zeepziedery, Azynbrouwery, Leerlooijeryen, Lynbanen en onderscheidene Scheepstimmerwerven, en eindelyk verschillende handwerken van allerlye aart meer. — Het getal der wevers is naar evenredigheid van dat der gezamentlyke Ingezetenen vry aanmerklyk; de weefgetouwen alleen, welke gestadig aan den gang zyn, worden op ongeveer 250 geschat; wanneer men hier nog byvoegt de zodanigen, welke bovendien noodwendig tot hulp in de wevers winkels vereischt worden, zullen zy, te zamen genomen, byna een achtste gedeelte van het geheele aantal Inwoonderen uitmaken; daar nu de gestadige verkeering van dit aanzienlyk aantal arbeidslieden in eene meer of minder bedorvene dampkring, en vogtige vertrekken, gepaard met eene bestendig zittende levenswyze zeer veel invloed op hunne gezondheid heeft, oordeelde ik nodig, dit zo naauwkeurig te moeten opgeven: immers ik heb bestendig waargenomen, dat 'er onder een bepaald getal wevers meerderen gevonden worden, welke aan borstziekten sukkelen, dan wel onder een gelyk aantal andere Ingezetenen voorkomen; het welk ik gerustelyk meen te kunnen toeschryven aan de verkering in de vogtige doffe werkplaatsen niet alleen, maar ook aan het gestadig inademen van blaauwzel stof, het welk uit de garens, tot het bereiden van beddebuur gebezigd, in zulk eene aanmerkelyke hoeveelheid wegstuift, dat alles in hunne werkplaatsen aanhoudend met een blaauw stof als overdekt is.

January.

In deze maand waren hier weinige zieken, uitgenomen menigvuldige verkoudheden en rheumatique pynen, hier en daar zag ik *angina inflammatoria*, welke door aderlatingen, dilueerende dranken en zagte laxeermiddelen meest al spoedig herstelden.

In het begin der maand verloor ik een vrouw van ongeveer 36 jaaren aan eene *angina maligna*, zedert eenigen tyd had zy met venerische ziekte gezukkeld, gelyk zy 2 dagen voor haar overlyden aan my beleed. In het begin der ziekte waren 'er gene kwade tekens aanwezig, gedurende de 2 eerste dagen was 'er weinig koorts, zy klaagde alleen over raauwheid en pyn in de keel, welke van binnen geheel rood en ontstoken was; ik liet haar een ader openen, zonder daar door eenige verligting toe te brengen; op den derden dag vertoonden zich over de geheele oppervlakte van het lighaam *petechiæ*, zonder dat zulks eenige verandering in de ziekte veroorzaakte; de slikking wierd van oogenblik tot oogenblik moeilijker, zy klaagde over ondragelyke hitte in de keel, de tong was hoog rood en droog, sterke *epispastica* uit gestoten mostaartzaad, azyn, en geschraapte peperwortel uitwendig om de keel geslagen, gepaard met gepaste *garismata* deden geen dienst. Op den vierden dag der ziekte was de keel van binnen reeds zodanig gezwollen, dat de slikking onmogelyk was, terwyl zich de zichtbaarste tekenen van

eene algemene verrotting vertoonden: als een kleine zwakke pols, blaauwe plekken hier en daar op de huid, gedurig neusbloeden, *menstruum fluxus immoderatus*; tegen den avond was de mond en keel van binnen geheel door koudvuur aangedaan, op den vyfden dag der ziekte overleed zy reeds.

By een vrouw van ongeveer 60 Jaren zag ik in deze maand eene *febris comatosa*, waar van dit het beloop was: in de eerste 5 dagen had zy weinig koorts, na dien tyd wierden dagelijks de aanvallen van koorts heviger, begonnen met koude, waar op eene geweldige hitte, roodheid en opzetting van het aangezicht volgde, zy klaagde over ondragelyke pynen in het hoofd, de tong was vurig rood, de benaauwdheid en pyn op de borst by iederen aanval der koorts vry hevig, de pols was hard en ongestadig, het water rood en helder; ik liet haar eene ruime aderlating doen, welke haar geen verligting toebragt, het bloed was dun en rood, zonder eenige tekens van ontsteking, ik liet haar verdunnende zuure laxeerdranken drinken: op den negenden dag der ziekte werd zy eerst ylhoofdig, daarna ongevoelig en slapig, in welken toestand zy tot den 14 dag der ziekte bleef, het water en de afgang liep gedurende al dien tyd ongevoelig weg, ik liet aanstonds spaansche vliegen aan de beenen leggen, doch zonder vrugt, hoewel dezelve zeer wel trokken; de koortsbast, met campher en moschus, welke ik haar had voorgeschreeven, werd haar in dien toestand zo goed mogelyk toegediend, waar door op den 14 dag der ziek-

te

te de flaperigheid verdween, de tong, welke aldien tyd rood en hard droog geweest was, wierd vogtig, en de pols meer regulier, na dien tyd herstelde zy langzaam door het gebruik der koorstbast en wyn.

In deze maand overleed een jongeling aan de tering.

February.

In deze maand heerschten hier aanhoudend, even als in de vorige, menigvuldige verkoudheden, hier en daar zinkingachtige zeere keelen en rheumatismen. Een man van 60 jaaren, zich ten uitersten driftig gemaakt hebbende, overleed binnen weinige uren aan een beroerte.

Een vrouw van een zeer tedere en aandoenlyke gesteldheid, welke zedert eenige jaaren zonder veel vrugt *antihysterica* gebruikt had tegen zenuw toevallen, aan welken zy meende alleen te zukkelen, genas ik door het toedienen van het bekende middel van Meijss. Nouffer, waar door eene gehele lintworm, ter lengte van ongeveer 4 ellen, uitgedreeven wierd; na dien tyd bleef zy van alle toevallen bevryd.

In een vrouw van middelmatige jaaren, welke zedert lang eene onafgebrokene gezondheid genoten had, nam ik een *Icterus* waar, welke zeer schielyk na eene hevige gemoedsaandoening, door schrik veroorzaakt, ontstaan was, dezelve verdween binnen veertien da-

gen geheel, door het gebruik van *antispasmodica*, gevolgd van zachte laxeermiddelen.

Maart.

Catarrhale ziekten werden nog in deze maand, even als in de vorige, waargenomen, hier en daar reeds met eene galagtige gesteldheid gepaard.

Waare pleurissen vertoonden zich hier en daar ook, welke op de gewoone wyzen door aderlatingen en eene antiphlogistische geneeswyze behandeld, meest al spoedig werden weggenomen.

In het begin van deze maand werd ik geroepen by een vrouw van 48 jaren, welke ik op een allergeweldigste wyze door hysterique toevallen aangetast vond, een verregaande vrees voor den dood was de aanleidende oorzaak van dit alles; gewoone *antihysterica* met byvoeging van ruime giften *opium* deden flegts zo veel nut, dat de toevallen telkens bedaalden, doch dezelve openbaarden zich by herhaaling op elke geringe gemoedsaandoening of schrik telkens weder, door het bestendig gebruik van het *ol. animale dippel.* en de *valeriana* werden eindelyk alle deze toevallen weggenomen.

In deze maand verloor ik een vrouw aan de tering, welke uit eene verwaarloofde verkoudheid ontstaan was, ook stierven er 2 lyders aan slymberoerte.

April.

April.

Catarrhale hoesten en *colica rheumatica* waren in deze maand vry algemeen; meest al eindigden zy, na de behoorlyke ontlastingen, door sterk zweet en troebel water.

By twee lyders, welke zeer gefolterd wierden door *rheumatique* pynen, had ik zeer veel dienst van de *pulv. doveri* en het *elix: guajaci*, met byvoeging van spaansche vliegen, by herhaling aangelegd. Hier en daar nam ik een schurftachtig uitslag waar, het welk door zwavel en kwikmiddelen geneezen wierd.

Bloedvloeden by vrouwen waren in deze maand mede niet ongewoon.

Mey.

Deze maand gaf ons weinige zieken, zinkingachtige hoofdpynen, roos en tandpyn bleven zich nog al nu en dan vertoonen. *Colica catarrhales*, welke zoms voorkwamen, wierden meest al door rhabarber en *opiata* geneezen.

Tusschenpozende koortsen begonnen zich hier en daar te openbaren, welke meest al binnen weinige dagen tot intermissie kwamen, en de gedaante van anderdaagsche koortsen hadden, by zeer weinigen zag ik zichtbare tekenen van een galachtig bederf in de eerste wegen: de koortsbast, zomtyds gepaard met *evacuantia* namen gewoonlyk binnen weinige dagen de koorts weg.

In

In onderscheidene huisgezinnen zag ik een soort van schurftachtig uitslag, het welk met kleine rode puisten opkomende, binnen 24 uren meest al tot blaasjes overging, welke eene scherpe etteragtige stoffe bevatteden, waar van sommigen aanzienlyke zweeren wierden; dit uitslag scheen niet zeer besmettelyk, en wierd zelden anders, dan door het slapen in een bed voortgeplant. Een aanhoudend gebruik van gewoone schurftmiddelen uit zwavel, kwik en diergelyken maakten geen zichtbaare verandering in de ziekte, door buikzuiverende *laxantia* en het bestendig gebruik van het afkookzel der olmbast wierd eindelyk dit lastig ongemak overwonnen.

Onder de kinderen wierden in deze maand veelen door toevallen van het zuur geplaagd.

Juny en July.

Omtrent het midden der maand Juny begonnen zich hier en daar galkoortsen te openbaaren, de koortsen waren in het begin meest al aanhoudende en irregulier, verzeld van zwaare hoofdpyn, benaauwdheden voor het hart, walging en braking, gedurige afwisselingen van koude en hitte, een geel beflagene tong, veeltyds troebel brandig water; ontbindende middelen, waar door de taaje ziektestof beweegbaar gemaakt werd, agtervolgd door een en zomtyds herhaalde braakmiddelen namen alle benaauwdheden weg, terwyl de aanvallen van koorts veel verminderden, welke als dan door

door de koortsbast gepaard met ontbindende middelen spoedig overwonnen wierden.

Galkolyken, welke nu en dan voorkwamen, en door eene ophoping van galstoffen in de eerste wegen veroorzaakt wierden, vereifchten ontlastende middelen, en wierden door de rhabarber en *Ipecac*: best overwonnen. Een vrouw, welke lang aan een *vomica pulm*: gezukkeld had, stierf zeer fchielyk door het doorbreken van dezelve, en daar uit gevolgde ftikking.

Schurftachtig uitflag, vloeden by vrouwen, en buiksverstoppingen waren in deze maanden vry algemeen. Een bejaard man overleed aan een beroerte, twee aan de tering.

Augustus.

De ziekten, welke in deze maand waargenomen wierden, waren meest al van een galachtigen aart. Galkoortsen begonnen met zwaare hoofdpyn, duizeling, benaauwdheid, walging en zomtyds brakingen, afwisselingen van koude en hitte; de finaak was doorgaans bitter met een vuile en geel beslagene tong; wanneer de ziekte nog in de beginselen was, wierden veelen genezen door het gebruik van de *Ipecac*: en Rhabarber, achtervolgd van zuurachtige dranken uit *cassia fistul.*, *tamarinde* en diergelyken; by aldien de ziekte reeds eenige dagen geduurd hadde, bleef na het gebruik van gemelde ontlastende middelen de koorts aanhouden, waar by kwamen verzwakkende *diarrhoea*, ylhoofdigheid, en zomtyds

tyds stuiptrekkingen; in dezen toestand had ik veel dienst van de kina met campher en wyn.

Galcoliquen en boorden wierden mede onder de heerschende ziekten geteld; de eersten wierden algemeen door ontlastende middelen weggenomen; galachtige boorden vereifchten meestal verdunnende dranken, en zagte clysteeren, gevolgd van *mucilaginoso* met weinig *opiata* gemengd, om het lichaam tot rust te brengen. Een enkele maal zag ik een *angina parotidea*, welke door openende en buikzuiverende gencesmiddelen weggenomen wierd.

September.

De galziekten van de vorige maand bleven nog met dezelve toevallen aanhouden, en vorderden ook dezelve behandeling, zomigen echter wierden met meerder hevigheid door dezelve aangevallen: meermalen zag ik na dat de eerste wegen door ontlastende middelen behoorlyk gezuiverd waren, dat de koorts bleef voortduuren, gepaard met yling, groote zwakheid en stuiptrekking; niet tegenstaande het spoedig gebruik van de koortsbast met campher en mineraalzuuren in deze omstandigheden toegediend, verloor ik 2 lyders aan dezelve, by welken alle tekenen van rotkoorts zich openbaarden.

In deze maand stierf een lyder aan de toring.

Hys-

Hyfterique toevallen waren in deze maand menigvuldig.

October.

De galachtige gesteldheid begon in deze maand plaats te maken, voor de catarrhale, by zommigen was de galachtige met het catarrhale vermengd, echter waren de ziekten by de meeste lyders naar het catarrhale overhellende, en moesten als zodanige behandeld worden.

Nu en dan zag ik in deze maand een *pleuritis rheumatica*, waar van dit het beloop was: de zieken klaagden over pyn in de leden, koude, huivering, met plaatslyke pyn in de zyde, vergezeld met benaawdheden omtrent den mond van de maag, pyn door de geheele borst, welke zich tot tusschen de schouderbladen uitstreckte; zomtyds verplaatste zich de pyn, de ademhaling was niet zeer belemmerd, de tong met een wit papachtig beslag bedekt, het water dik en rood, gedurige hoest, met opwerping van dun taay slym. Aderlatingen in het begin der ziekte deden veel dienst, het bloed was meest al met een taaye ontstekingskorts bedekt, spaansche vliegen daar na op de pynlykste plaats aangelegd, namen de pyn dikwils ten eenemaal weg, wanneer vervolgens *antimonialia*, met dilueerende dranken lyders volkomen herstelden.

In een *colica inflammatoria* zag ik na herhaal-

haalde aderlatingen het uitnemenst nut van een vesicatorium op den buik aangelegd.

Hydrops anasarca, uit een verkeerd behandelde najaars koorts ontstaan, genas ik door de koortsbast en *scilla marina*.

Een vrouw van 22 Jaaren, welke lang aan slymgraveel gezukkeld had, ondervond veel nut van het bestendig gebruik van de *folia uvæ ursinæ*.

November.

In deze maand hadden wy zeer weinig zieken, 2 bejaarde lieden wierden door slymbe-roerte aangetast, welke door aderlatingen, ontlastende en slymontbindende middelen, waar door veel slymstoffen ontlast wierden, beiden herstelden. Twee lyders stierven deze maand aan de tering.

December.

De ziekten, welke deze maand waargenomen wierden, waren meest zinkingachtige, veeltyds met ontfteeking vergezeld; pleuris, verkoudheid, *rheumatismi*, oegontfteking en zinkingachtige zeere keel waren de meest heerschende ongesteldheden.

Door toeval wierden de pokjes uit een naburige plaats tot ons overgebracht; dan de zelve namen geen algemeenen doorgang; slegts vyf kinderen na by elkanderen in eene buurt wonende, wierden door dezelve aangetast, by
vier

vier van hun waren zy zeer goedaartig, het vyfde, een kind van vyf jaaren, had kwaadaartige conflueerende pokjes; by het zelve deden *antimonialia* met campher, naar het voorschrift van Dr. VAN DEN BOSCH toegediend, zichtbaar goede uitwerkzelen.

Aan elf kinderen wierden deze maand de pokjes ingeënt, welke allen zeer weinige pokjes kreegen, en gemakkelyk herstelden.



L Y S T

DER

GESTORVENEN

In M E P P E L,

IN DEN JAARE 1791.

<i>January</i>	.	.	.	10
<i>February</i>	.	.	.	9
<i>Maart</i>	.	.	.	7
<i>April</i>	.	.	.	8
<i>Mey</i>	.	.	.	8
<i>Juny</i>	.	.	.	11
<i>July</i>	.	.	.	7
<i>Augustus</i>	.	.	.	6
<i>September</i>	.	.	.	10
<i>October</i>	.	.	.	8
<i>November</i>	.	.	.	4
<i>December</i>	.	.	.	5

Totaal 93

Het getal der geboorene beloopt in den Jaare
1791. 131.

KORT

KORT BERICHT

D E R

Z I E K T E N ,

Welke in het Jaar 1792.

I N

M E P P E L

GEHEERSCHT HEBBEN.

January.

De natuurlyke pokjes, welke in de voorige maand zich hadden beginnen te openbaaren, maakten geen verderen voortgang, hoe zeer door het inënten van verscheidene kinderen, in de jongst verlopende maand in het werk gesteld, de pokjes meer algemeen door de geheele plaats verspreid waren.

Er heerschten in deze maand zeer weinig ziekten; hier en daar werd *pléuris* en *peripneumonie* waargenomen, welke meest al van eene catarrhale aart waren. Eene ruime aderlating, in den beginne der ziekte gedaan, deed telkens veel nut, het bloed was met een ontstekings korst bedekt; wanneer vervolgens aangelegde spaansche vliegen, gepaard met openende uitwaassende middelen, waar door een

ruim zweet veroorzaakt wierdt, de ziekte geheel wegnamen.

Rheumatismi kwamen nu en dan ook voor; vloeden by vrouwen waren mede algemeen.

Een kraamvrouw, welke deze maand zeer voerspoedig bevallen was, werd eenige dagen na de verlossing ongevoelig en zonder eenig aangewend hulpmiddel bevryd van eene allerlastigste jeukte *circa pudendum*, gepaard met eene naauwlyks zichtbaare uitflag in de nabyheid dier deelen; zy had gedurende de vyf laatste maanden van hare zwangerheid bestending met de ondraaglykste jeukte gekweld geweest, zonder de geringste hulp van onderscheidene hulpmiddelen, gedurende al dien tyd by herhaling daar tegen aangewend, bespeurd te hebben.

February.

De catarrhale ongesteldheden begonnen in deze maand meer algemeen te worden, als zinkingachtige zeere keelen, zinkingachtige vloeijing op de oogen, buikpynen, roos en diergelijken: hier en daar zag ik *pleuris* en *peripneumonie*, by welken de verzellende koorts doorgaans catarrhaal was. Door eene aderlating, gevolgd van spaansche vliegen en zagte uitwaasfemende middelen, wierden de lyders meest al spoedig hersteld.

Een kind van 7 jaren, het welk eenigen tyd met wormen geplaagd was, gaf ik de *cortex Geofreea Surinam.*, waar door niet alleen een menigte flym en verscheidene afzonderlyke gewoone wormen ontlast wierden, maar eindelyk ook een ge-

geheele klomp wormen, geheel in het slym bewonden; na dien tyd was het kind volmaakt gezond.

Hier en daar begon zich de roodvonk te openbaren; dezelve was over het algemeen niet kwaad-aartig, en tastte het meest de kinderen aan, de ziekte begon met lomigheid en vermoeidheid, huivering, hoofdpyn, pyn in de keel en moeilykheid in het slikken, de keel was rood en gezwollen, de tonsillæ opgezet, het welk, wanneer de uitbotting volkoomen daar was, doorgaans merkelyk verminderde; by de meesten waren eene matige warmte en uitwaasfemende middelen toereikend tot de herstelling. Byaldien ik in het eerste tydperk der ziekte tekenen van onreinigheid in de maag of ingewanden bespeurde, liet ik een braakmiddel by tusfschenposingen toedienen, het welk doorgaans de uitbotting der ziektestof mede zeer bevorderde; wanneer na de volkomene uitbotting de pyn en zwellling bleef aanhouden en zomtyds toeneemen, zodanig dat by zommigen de doorslikking allermoeijelykst wierd, heb ik altyd uitneemende diensten gehad van groote spaansche-vlieg pleisters om de keel gelegd.

Byaldien de ziektestof zich scheen naar de borst te willen verplaatzen, liet ik aanstonds spaansche vliegen aan de kuiten leggen, en in dringender omstandigheden eene aderlating doen, welke meest al de lyders uit een oogenschynlyk doodsgevaar redden. By zommigen wierd eene schielyke verplaatzing der ziektestof naar de borst of hersenen, uit gebrek van spoedige of nodige hulpe, binnen weinige uren dodelyk.

Veelen van de genen, welke zich na de ge-

nezing te vroegtydig aan de koude lucht blootstelden, wierden aangetast door oedemateuse zwellingen, tegen welke met vrugt de koortsbast, met *scilla*, *sal. Cathart. rob. Juniper.* en diergelyken gebezigd wierden; by anderen openbaarden zich na het aflopen der ziekte gezwollene Parotides, welke meest al door zagte laxeermiddelen en het onthouden uit de koude lugt verdweenen.

Onder de doden telden wy drie aan de roodvonk.

Maart.

Hier en daar bleef de roodvonk nog aanhouden, het getal der zieken was echter minder dan in de vorige maand; op de sterflysten vond ik gene aan deze ziekte overleden.

Nu en dan begonnen zich de voorjaarskoortsen ook te vertoonen, zy hadden meest al den aart van de gewone *febris depuratoria*, en wierden doorgaans door braak- en purgeermiddelen weggenomen.

Waare pleurissen waren in deze maand menigvuldig, en wierden op de gewone wyze door aderlatingen en eene antiphlogistische behandeling tegengegaan en weggenomen. By zommigen nam ik *pleuritis* en *peripneumonia inflammatorio-biliosa* waar, welke door aderlatingen en braakmiddelen genezen wierden.

Rheumatismi, veroorzaakt door belette uitwaasfeming, waren in deze maand vry algemeen, de *Pulv. Dover.* en het *Elix. Guajac.* deden zeer veel dienst.

Moei.

Moeijelyke waterlofing, uit te rug gedrevene uitwaasfeming ontftaan, wierd door het gebruik van uitwaasfemende dranken fpoedig genezen.

Een Lyder ftierf deze maand aan de tering.

April.

In deze maand zag ik nu en dan waare pleuriften, gelyk ook *pleuritides biliofo-inflammatoriae*, in welken de galachtige gefteeldheid de voornaamfte rol fpeelde; na gedane aderlatingen was over het algemeen het aanhoudend gebruik van ontlastende middelen allernoodzaaklykst.

Twee mannen, beiden van een bloedryk temperament, wierden in deze maand door een bloedfpuwing aangetast, vergezeld met *pleuris*. Het bloed wierd eerst met zeer kleine hoeveelheden opgehoest, zomtyds flegts heldere taaije flym, met bloedige ftreepen geverfd, langzamerhand wierd het opwerpen van bloed meerder, tot dat eindelyk al hoestende aanmerkelyke hoeveelheden bloed telkens wierden uitgeworpen; door herhaalde aderlatingen, welke een zeer ontftoken bloed opleverden, en het toedienen van *nitrofa antiphlogistica*, *laxantia emollientia*, wierden beiden fpoedig geneezen.

Kinderen leden deze maand veel aan ftuipen, veroorzaakt door een overvloedig fcherp zuur in de eerfte wegen; *antacida*, met zachte laxermiddelen namen deze toevallen fpoedig weg.

By vele kinderen nam ik een foort van fchurftachtig uitflag waar, het welk niet dan door het beftendig gebruik van gewone zwavel en kwik-

middelen, gepaard met zagte *laxantia*, langzaam werd overwonnen.

In deze maand werd de roodvonk niet meer waargenomen.

Mey.

Wy hadden in deze maand zeer weinig ziek- tens; een enkele maal zag ik een waare *febris biliosa*: na dat de Lyderesse eenige dagen over gebrek aan eetlust geklaagd had, werd zy door zware hoofdpyn, pyn in den rug en de lenden, benaauwdheid voor het hart, walging, afwisselingen van koude en hitte, aangetast, vergezeld met een verregaande trap van moeiheid door alle de leden; een braakmiddel nam alle deze toevallen spoedig weg; het gebruik van zagte buikopenende middelen uit *Tamarinde*, *manna*, *sal. polychr.* &c. herstelden haar vervolgens geheel en al.

Nu en dan werd ook *rheumatismus biliosus* waargenomen.

Een bejaarde vrouw werd deze maand door een slymberoerte aangetast, eene aderlating, en het gebruik van ontlastende middelen en clystee- ren, waar door veel slymachtige stoffen ontlast werden, herstelden haar spoedig.

Aan een vrouw van 62 jaren, welke langen tyd met een lintworm geplaagd was, en tot drie herhaalde reizen op onderscheidene tyden het bekende middel van Mej. NOUFFER vrugteloos gebruikt had, gaf ik het middel van HERREN- SCHWAND, waar door verscheidene stukken van de cauwoerde worm, te zamen ter lengte van ongeveer 19 à 20 ellen, uitgedreeven werden; zy
was

was na dien tyd gezond, en bleef bevryd van hevige pynen in de ingewanden, en epileptische toevallen; waarmede zy voor dien tyd gedurig te worstelen had gehad.

Twee stierven in deze maand aan tering.

Juny.

Galkoorts werd in deze maand waargenomen, zy begon meest al met de gewone toevallen; wanneer in het begin tydig een braakmiddel werd aangewend, en daar na zachte laxeermiddelen werden toegediend, waar door gewoonlyk veel scherpe galsstoffen ontlasteden, werd de ziekte meest al in zynen loop gestuit en voorgekomen; by zommigen had de ziekte reeds te diepe wortelen geschoten en waren de galsstoffen te veel in het bloed gedrongen; er kwam op den 7den dag verheffing van koorts, met verregaande vermoeidheid by, gevolgd van diarrhé, neerslagtigheid, en zomtylhoofdigheid. Indien de ziekte geheel en al de overhand nam, volgde er een kleine ingetrokken pols, opgespannen buik, stuiptrekkingen, opspringen der peesen, zommigen hadden hik en kreegen purpere vlekken, dezen stierven op den 10 of 11 dag der ziekte. In het begin van den meer verergerden toestand der zieke waren zomtyds braakmiddelen van veel nut; dan by aldien er groote matheid en diarrhé aanwezig was, had ik veel dienst van de *Cort. peruv.* met *moschus* en *serpentaria virginiana* hier door werden de levenskrachten merkelyk opgebeurd, en meest al zag ik, dat de diarrhé ophield, en zeer goede afgangen volgden, wanneer de lyders daar na, na

dat de stoffen in de ingewanden beter gemengd waren, door het toedienen van zachte *emeto-cathartica*, van de ziektestof ontlast wierden.

Colica biliosa zag ik in deze maand ook hier en daar, en moesten door ontlastende middelen genezen worden.

Scorbutique zweeren in den mond, welke uit eene galachtige ongesteldheid voortkwamen, vereischten, behalven mondspoelingen, braak- en laxeerende middelen.

In deze maand had ik een aanmerkelyk voorbeeld van buiksverstopping, door menigvuldige visceraal clysteeren en ontbindende middelen genezen.

July.

De galachtige ongesteldheid bleef noch de heerschende ziekte in deze maand. Hier en daar zag ik galachtige coliquen en boorden. De galcoliquen, welke uit eene ophoping van galstoffen in de eerste wegen hunnen oorsprong hadden, wierden door ontlastende middelen als *Ipecac.* en *Rhabarberr* het spoedigst weggenomen. Galachtige boorden waren mede vry algemeen, en wierden door het toedienen van veel doorspoelende dranken en het inbrengen van *enemata narcotica* meest al gemaklyk overwonnen.

By bejaarde lieden zag ik *Apoplexia pituitosa*; *angina parotidea* was by kinderen in deze maand algemeen, en vorderde openende en zagt laxeerende middelen.

Augustus.

In het begin van deze maand hadden wy weinig zieken, zy waren meest allen galachtig; tweemaal zag ik *rheumatismus*, welke door het aanleggen van spaansche vliegen en het gebruik van *Pulv. Doveri* genezen wierden. — Verscheidene kinderen leden deze maand aan wormen, en wierden, na vergeefs onderscheidene gewone wormdrijvende middelen te hebben toegediend, meest al spoedig door het gebruik van de *cortex. Geoffraea surinam.* genezen.

Op het einde der maand hadden wy vele galachtige doorlopen, welke door *Ipecac.* en *rhabarber* spoedig wierden weggenomen.

September.

In de eerste dagen der maand hadden wy noch al *febris biliosa*, in het vervolg begon zich de catarrhale ongesteldheid weder te openbaren; *pleuris* werd in deze maand nu en dan waargenomen, welke, op de gewone wyze behandeld, spoedig werd tegengegaan, by zommige *pleuritici* vermengde zich de galachtige ongesteldheid van de vorige maanden; de zulken moesten na voorafgaande aderlatingen, door het toedienen van braakmiddelen en resolveerende *laxantia* geneezen worden. Anderen en derdendaagsche koortsen wierden, hoewel zeer zelden, waargenomen.

Scrofulachtige kinderen wierden in deze maand

maand door de gewoone toevallen der ziekte meer dan gewoon aangevallen, het *Extr. chelidon. maj.* en de *tartar. Emet.* in zeer geringe giften toegediend, bracht veel verlichting aan.

De roodvonk begon zich op het einde der maand in deze plaats weder hier en daar te vertonen; zy was zeer goedaartig en had niets byzonders in haren loop. Een stierf 'er deze maand aan de tering.

October.

De roodvonk begon in deze maand meer algemeen te worden, zy bleef echter by aanhoudendheid goedaartig, en tastte tot hier byna alleen kinderen aan. Roos, zinkingachtige zeere keelen, opzwellingen der klieren aan den hals en jigtpynen, voornaamlyk het *lumbago*, waren de heerschende ziekten. Hysterique toevallen en vloeden by vrouwen wierden nu en dan ook waargenomen.

In deze maand werd ik geroepen by een vryster, oud 32 jaren, welke zedert eenige jaren eene onafgebrokene gezondheid had genoten; zy wierd zedert 8 dagen elken morgen op het zelfde tydstop alleronverwagtst aangevallen door geweldige pynen in de lenden, vergezeld met gestadige persing en pynlyken aandrang tot wateren, zonder echter eenig water van belang te kunnen ontlasten: alle deze toevallen bleven ongeveer 4 uren aanhouden, waar na dezelve langzaam weder afnamen, en na verloop van ruim 6 uren tyds de lyderesse geheel verlieten; het overige van den dag ge-

voel-

voelde zy zich geheel wel en zonder pyn. Het water, welk geduurende de hevige pyn in geringe hoeveelheid ontlast wierd, was zeer helder, voor het overige volmaakt gezond. Na gedaan naauwkeurig onderzoek bevond ik het alleen eene krampachtige ziekte te zyn, welke periodique aanvallen hield, ik gaf haar te dien einde zachte krampstillende middelen, met *mucilaginosā* gepaard, hier door verminderten wel de aanvallen eenigzints, doch hervatteden zich regulier ieder morgen op het zelfde oogenblik hier op liet ik haar 2 uren voor den aanval 2 greinen *opium* nemen, gepaard met het gebruik van eene groote hoeveelheid warme verdunnende dranken, na zulks 3 achtereenvolgende dagen gebruikt te hebben, bleef het *paroxysmus* geheel weg, en de lyderesse herstelde volkomen.

November.

In deze maand heerschte de roodvonk meer algemeen, en tastte zo wel volwassenen als kinderen aan; zy was op verre na zo goed-aartig niet meer als in de voorgaande maand: 'er stierven 7 aan de ziekte, 4 van het mannelijk en 3 van het vrouwelyk geslacht. — De ziekte begon over het algemeen met misfelykheid, vermoeidheid en loomheid der ledematen, koude en huivering, hierop volgde schielyk hoofdpyn, pynlyk gevoel in de keel, vergezeld met eenige moejelykheid in het doorslikken, de *tonsillæ* en keel wierden rood en ontstookten, de huid was by de meesten heet

heet en droog, de pols by zommigen vol en sterk, by anderen zwak en klein; velen der lyders waren in dit tydvak der ziekte tegens den avond sterk kooitsig, onrustig en zomtyds ylhoofdig, de zwelling en ontsteking der amandelen, het losse gehemelte en de uvula namen van oogenblik tot oogenblik zeer toe; hier en daar in de keel vertoonden zich witte plekken, welke vervolgens tot zweeren overgingen, het slikken wierd zeer pynlyk en altermoejelykst, by zommigen byna ondoenlyk; de adem was zeer stinkende, de tong met een witte papachtige korst bedekt, de mond en keel met taaye slym overal bezet. — De uitbotting, welke gewoonlyk omtrend den derden dag der ziekte zich vertoonde, bracht by zommige lyders verlichting aan; de uitslag openbaarde zich by velen het eerst op het aangezicht, den hals en de borst, en breide zich vervolgens over het gehele lichaam uit, het welk eenigzints gezwollen scheen: by anderen ontdekte ik alleen den uitslag op de armen, dyen en beenen, in welke gevallen de handen en vingers dikwyls door eene zugtige zwelling aangedaan wierden, welke op het aanraken pynlyk waren; veele lyders klaagden over een doofachtig gevoel in de handen en vingers. De afschuifering geschiedde meest al op den vierden of vyfden dag na de uitbotting.

By zommigen was de ziekte meer kwaadaartig en wel voornaamlyk by kinderen, de uitbottings koorts was zeer hevig, vergezeld met ylhoofdigheid, terwyl kort na de uitbotting zich eene

eene fchielyke zwelling van de kaak. en oorklieren openbaarde, het aangezicht en de hals kregen vlakken en eene zugtige zwelling, uit de oogen, neusen mond vloeide een zeer fcherp vogt, welke fcherpe ftof zich zomtyds fchielyk verplaatfte op de luchtpyp en borst, en binnen weinige uren eene dodelyke ftikking veroorzaakte. — By eenige lyders ging de ziekte tot een waare rotkoorts over, welke meestal dodelyk was.

Ten opzichte van de genezing heb ik by myne lyders over het geheel eene matige warme behandeling in acht genomen; velen, welke de ziekte regelmatig hadden, herstelden door het aanhoudend gebruik van zagte uitwaasfemende middelen; terwyl die genen, welke in het eerfte tydperk der ziekte tekenen van onreinheid in de eerfte wegen hadden, veel dienst hadden van zagte braakmiddelen, en clystteren: wanneer de ziektestof zich op de borst of keel dreigde te plaatzen, liet ik aanftonds fpaanfche vliegen leggen tufchen de fchouderbladen en aan de kuiten, en in meer dringende gevallen een aderlating doen. Groote fpaanfche vliegen tydig om de keel gelegd, deden uitneemend veel dienst tegen de zwelling in de keel en de moejelykheid in het doorflikken; tot ontbinding van de taaye flym in den mond en keel brachten infpuitingen in de keel van *aq. plantag.* en *mel. rofar.* zeer veel toe.

In deze maand hadden wy veel roosachtige ontfteking in de keel, zonder verzwearing; terwyl anderen wederom aanmerkelyke

ke verzweeringen der amandelen hadden, zonder eenig scharlaken uitflag; eindelyk hadden zommige den gewoonen scharlaken uitflag met koorts, zonder de minste aandoening in de keel.

Hier en daar hadden wy deze maand catarrhale koortsen, vergezeld met veel slym in de eerste wegen, en plaatselyke rheumatique pynen in de borst, in deze gevallen waren, na het zuiveren der eerste wegen, de spaansche vliegen uitsteekend nuttig.

'Er overleed in deze maand een oud man aan beroerte.

December.

Behalven de roodvonk met zeere keel, welke nog even kwaadaartig bleef voortduurden, en waar aan 6 overleden, hadden wy deze maand weinig ziekten. — Nu en dan zag ik *angina catarrhalis*, gelyk mede *rheumatismus* en een enkele reis *lumbago*.

Een jongeling overleed aan de tering.



L Y S T

D E R

G E S T O R V E N E N

In M E P P E L,

I N D E N J A A R E 1792.

January	.	.	11
February	.	.	10
Maart	.	.	12
April	.	.	5
Mey	.	.	9
Juny	.	.	6
July	.	.	9
Augustus	.	.	8
September	.	.	9
October	.	.	13
November	.	.	21
December	.	.	41
Totaal			<hr/> 127

Het getal der geboorene in Meppel in 1792.
beloopt

119.

R

KORT

KORT BERICHT

DER

ZIEKTE N,

Welke in het Jaar 1793

IN

MEPPPEL

GEHEERSCHT HEBBEN.

January.

Hier en daar wierd in deze maand nog een enkele maal de roodvonk waargenomen, op de sterflysten echter wierden 'er geene gevonden aan de zelve overleden.

Pleuritides inflammatoria en *rheumatica* waren de heerschende ziekten; de eersten wierden spoedig genezen door aderlatingen, en een antiphlogistische behandeling, terwyl de *pleuritides rheumatica* meest al overwonnen wierden door het tydig aanleggen van spaansche vliegen, en het gebruik van veele emollierende en verdunnende dranken: by aldien deze ziekte zeer hevig was, deden ééne of meerdere aderlatingen veel nut, wanneer daar na groote spaansche vliegen op de pynlyke plaats aangelegd, meest al binnen weinige uren de pynen wegnamen; de fluimen, welke
op.

opgehoest wierden, waren in het eerst gewoonlyk weinig, taay, en ongekoekt, de *kermes minerale* vond ik tot ontbinding van dezelve byzonder dienftig.

De kinkhoest begon *sporadice* te grasseeren, allen, welke door dezelve wierden aangetast, wierden, na genoegzaame toegediende braakmiddelen, door het bekende middel van CLOSIUS binnen weinige weeken geneezen.

Asthmatici leden deze maand veel door de koude nevelachtige lucht.

Een kraamvrouw werd door een *delirium lacteum* aangetast, luisterde na geene geneesmiddelen, en werd op den 13 den dag dodelyk.

Kinderen leden deze maand zeer veel aan de toevallen van het zuur.

February.

De roodvonk hield alhier geheel op, doch ontstak in de omliggende dorpen met dezelve kwaadaartigheid, en werd door stofverplaatzing naar de borst voor verscheidene lyders dodelyk.

— Nu en dan hadden wy zinkingachtige zee-re keelen, hoesten, roos en buikpynen. *Pleuritides rheumatico biliosa* wierden deze maand waargenomen; de ziekte begon gemeenlyk met afwisselende koude en hitte, walging en dikwyls pogingen tot braaken, waar by zich eene stekende pyn in de zyde voegde. — Hoe zeer het afgetapte bloed dik en ontstoken was, bracht echter eene aderlating weinig verligting toe; braakmiddelen, waar door eene menigte

dikke, taaye, galachtige stoffen uitgeworpen wierden, deden veel nut, waar na zagte ontbindende laxeermiddelen meest al de ziekte wegnamen.

Scorbutique pynen in den mond, vergezeld met zweeren, en tekenen van algemeene scheurbuik zag ik nu en dan ook; zuiverende mondspoelingen en versterkende *antiscorbutica* waren hier nuttig.

Schurftagtig uitflag, door kwikmiddelen genezen, wierd in deze maand menigvuldig waargenomen.

Een jongetjen, welke *epileptische* toevallen had, genas ik door het toedienen van de *cortex geoffr. surin.*, waar door behalven veel taaye wormslym, ook eene groote menigte lange ronde wormen wierden uitgedreeven.

Maart.

Deze maand gaf ons zeer weinig zieken, nu en dan hadden wy eenige anderendaagsche koortsen, met catarrhale toevallen vergezeld; de meest heerschende ongesteldheden waren zeere keelen, *colica rheumatica* en *rheumatique* pynen. Een enkele maal zag ik *pleuritis inflammatoria*.

Een bejaard man overleed zeer schielyk aan een beroerte.

April.

In deze maand hadden wy, even als in de vorige, weinig zieken, welke echter meest al
van

van een catarrhalen aart waren. *Ischias* en *rheumatismus vagus* heerfchten nu en dan ook. By de tufchenpozende koortfen was zomtyds een plaatslyke catarrhale pyn op de borst gepaard, welke door aderlating of fpaanfche vliegen, en zomtyds door beiden, gepaard met dilueerende en uitwaasfemende middelen moest weggenomen worden, voor en aleer men de koortsbast met vrugt konde geven.

Hæmorrhagiæ uteri, scorbutique zweeren aan de beenen, wierden in deze maand meer dan in de vorigen waargenomen.

In een *colica rheumatica* deed een *vesicatorium* op den buik aangelegd, na dat vooraf verfcheidene middelen vrugteloos waren aangewend, eene voortreffelyke uitwerking.

Mey.

In deze maand hadden wy vele *anginae parotidæ*, welke door openende en zagte buikzuiverende middelen wierden weggenomen; roos, oogontfteekingen, zinkingachtige zeere keelen en hoesten waren mede menigvuldig. Op het einde der maand begon de galachtige gefteeldheid zich meer te openbaaren; de *colicæ biliofæ* en boorden, welke dikwyls gezien wierden, lieten zich best overwinnen door het toedienen van verzagtende clyfteeren en verdunnende middelen; wanneer de ingewanden tot rust gebragt waren, deden gewoonlyk zagte laxermiddelen veel dienst: terwyl integendeel die genen, welke in den aanvang der ziekte purgeermiddelen genomen hadden, meest

al door een verzwakkenden buikloop aangestast wierden, welke niet dan door *opiata*, en het langduurig gebruik van versterkende middelen overwonnen wierd.

Pleuritis inflammatorio biliosa wierd een enkele maal waargenomen. Vloeden by vrouwen waren deze maand menigvuldig.

Juny.

Door het ongestadig nat en koud weer hadden wy deze maand vele *rheumatismi*, hoesten, zeere keelen, welke van een zinkingachtigen aart waren. — *Asthmatici* leden deze maand ook veel; tegen het midden der maand vertoonde zich hier en daar een zomerkoofts, welke van een rotachtigen aart was; de lyders klaagden over een drukkende pyn in de maag, zware hoofdpyn, de tong was vuil, wit of geel beflagen, het water bruin en troebel, een droge brandende huid, zware pyn in de leden, de pols koortfig, in den beginne meest al vol en sterk: in dezen toestand deed een braakmiddel, waar door veel vuile stoffen ontlast wierden, gewoonlyk alles af, en belette den verderen voortgang der koorts, wanneer de lyders gewoonlyk na het toedienen van zuure laxeerdranken, gepaard met het ruim gebruik van zuuren, binnen weinige dagen geheel herstelden. Wanneer het braakmiddel verzuimd wierd, kreeg de ziekte spoedig alle tekenen van rotkoofts, welke spoedig door de koortsbast, *serpentaria*, campher en wyn moest tegengegaan worden.

’Er

Er ftierf deze maand eene vrouw aan de te-
ring.

July.

Van den 1 tot den 6. hadden wy meest W. wind, met warmte en regenachtig weêr; van den 7 tot den 16 was de wind doorgaands O. met bestendig warm weêr, den 16 en 17 W. wind met warmte, den 18 regen met felle don-
der: vanden 19 tot het einde der maand was de wind meest W. en NW. tot aan den 27 met warmte, den 28 donder en ftortregens, den 29 en 30 daar en tegen een koude regen den 31 weder warm weêr, met regen en don-
der.

De remitteerende koortfen, welke rotachtig waren, bleven deze maand aanhouden, dikwils herhaalde braakmiddelen, en daarop gevolgde purgeermiddelen bragten meest al eene fpoedi-
ge geneezing te weeg. — Galachtige roos en boorden waren deeze maand ook menigvuldig. — *Pleuritis inflammatorio-biliosa* wierd nu en dan ook waargenomen.

In verfcheidene huisgezinnen heerschte in deze maand een foort van hardnekkig fchurft-
achtig uitflag, het welk zich eerst openbaarde met kleine roode puisjes, binnen 2 etmaalen in kleine blaasjes of zweertjens overging, wel-
ke geopend zynde, een fcherp, dun, etterachtig vogt uittftortten, en zoms tot kleine zweeren overging; de ledematen wierden wel voornaam-
lyk door het zelve aangedaan; alle gewoone

schurfmiddelen wierden tegen dit lastig ongemak vrugteloos gebezigd, een aanhoudend gebruik van bloedzuiverende laxeermiddelen nam het zelve langzaam weg.

De kinkhoest begon zich hier en daar onder de kinderen te openbaaren.

Aan een vrouw van een sterk en anderzints gezond gestel, welke zedert lang een Lintworm by haar gehad had, gaf ik met zeer goed gevolg het bekende middel van Mejuffr. NOUFFER, waardoor de worm geheel werd afgedreeven.

Zenuw toevallen nam ik in deze maand meer dan in eenige andere waar. Er stierven deze maand twee aan de tering.

Augustus.

De gehele maand door was de wind den meesten tyd West, een enkel dag tusschen beiden Z. en ZZO., het weër was over het algemeen warm, nu en dan met regen.

De galachtige ongesteldheid, welke zich in de beide voorgaande maanden had beginnen te vertoon, openbaarde zich meer en meer. De galkoortsen begonnen gewoonlyk met zware hoofdpyn, duizeling, walging, afwisselende koude en hitte, pyn in de leden; de tong was meest al met een vuil geel beslag bezet, de smaak bitter. Wanneer in het begin der ziekte braakmiddelen en rhabarber wierden toegediend, daarna zuurachtige laxeerdranken, herstelden de meeste lyders spoedig; indien de ziekte verdere voortgangen maakte, bleef de koorts aanhouden, vergezeld van yling, verzwakkende diarthe,

the, stuiptrekkingen en spruw; in deze omstandigheden was het nodig na genoegzame ontlastende middelen, spoedig den koortsbast met wyn en campher te geven, waardoor vele uit een oogenschynlyk gevaar gered wierden.

Verzwakkende buikloop by kinderen was deze maand menigvuldig, en wierd met het beste gevolg tegengegaan door een afkookzel van Lichen Yslandicus.

Het St. Anthomes vuur, een soort van galachtig uitslag, zach ik deze maand herhaalde maalen, allen wierden geneezen door het gebruik van zachte laxeerende middelen.

Galachtige boorden waren 'er menigvuldig, zelden egter zo hevig dat zy opiaten vorderden; zachte clysteeren en veel verdunnende dranken waren meest al genoegzaam om dezelve te doen ophouden, wanneer daarna zachte *anodyna* het lichaam geheel tot bedaaren bragten.

De kinkhoest begon meer algemeen te heerschen, met het beste gevolg wierd, na herhaalde braakmiddelen te hebben toegediend, het bekend geneesmiddel van CLOSSIUS gegeven, waardoor meest allen herstelden.

Ik ondervond deze maand groot nut en voordeel van het *decoct. cort. geoffr. surin.* by een jongeling van 12 jaren, welke langen tyd door ascarides geplaagd was; eene ontelbare menigte wierd hier door uitgedreeven.

Drie lyders overleden deze maand aan de tering.

September.

In het begin dezer maand hadden wy W. en ZW. wind, met veel regen, van den 12 tot den 15 was de wind O. en ZO. met warmte, van den 16 tot den 19 W. wind met alwisselende warme regen en droogte; den 20 21 en 22 was de wind O. NO. met regen en koude, van den 23 tot het einde der maand hadden wy doorgaans droog en warm weêr, met onbestendige Weste O. en ZO. winden.

Het ongestadig en veranderlyk weêr veroorzaakte veel roos, scorbutique tandpyn, rheumatique pynen, heeschheid en verkoudheden welke meest allen met eene galachtige ongesteldheid gepaard gingen, genoegzame ontlastende middelen deden, vooral in den beginne toegediend, veel nut, wanneer daarna door uitwaasfemende middelen de lyders volkomen herstelden.

In het begin der maand hadden wy nu en dan tusfschenpozende herfstkoortsen, welke na tydig toegediende ontlastmiddelen zich gewoonlyk tot anderendaagfche koortsen vormden, en door gepaste resolveerende geneesmiddelen allen wierden weggenomen.

Galkoliquen en boorden wierden ook nog waargenoomen, en genazen spoedig door ontlastende middelen.

De kinkhoest bleef deze maand nog met even veel geweld heerschen, overleed echter deze maand gene aan die ziekte.

Octo-

October.

Byna de gehele maand door hadden wy W. en ZW. wind, met gestadig afwisselend donker mistig en regenachtig weêr; den 23 en 24 hadden wy O ZO. wind met helder weêr en nagtvorst; den 31 was de wind ZW. met helder weêr en vorst.

Het vogtig en koud weêr veroorzaakte in deze maand veel zinkingachtige zeere keelen, verkoudheden, hoesten, buiklopen en jichtpynen; zinkingachtige vloejingen en ontsteking der oogen waren ook menigvuldig. Nu en dan hadden wy catarrhale koortsen, met veel slym in de eerste wegen, en by de meesten met plaatslyke rheumatique pyn in de borst en buik verzeld; na het zuiveren der eerste wegen deden spaansche vliegen byzonder veel dienst.

Een kraamvrouw wierd op den achtsten dag na de verlossing door een *delirium lacteum* aangetast; onderscheidene uitwaasfemende middelen, *vesicatoria* en *epispastica* wierden gedurende eenige dagen vrugteloos aangewend, ruime aderlatingen, met een critischen uitslag over het grootste gedeelte van het gehele lichaam, doch voornaamlyk aande handen en armen deden dezelve langzaam bedaaren; de uitslag had de gedaante van platte pokjes, waar van zomigen in elkander gelopen, en dus tot een aanmerkelyke grootte geworden waren, van een witachtige kleur, met etter gevuld, welke langzaam

zaam opgedroogd zynde, eene gehele affschilfering der huid ten gevolge had.

De kinkhoest bleef deze maand noch al voortduren, zy had echter niets byzonders in haren loop, een kind van een zeer kwaadsappig gestel overleed 'er aan.

Een meisje van 18 jaar overleed aan de tering.

November

Het weêr was deze maand zeer veranderlyk. Den 1 en 2 hadden wy O. wind met helder weêr en vorst. Van den 3 tot den 7 W. en ZW. winden met donker regenachtig weêr. Den 8 was de wind O. met vorst en mistig weêr. Van den 9 tot den 11 ZO. met regen. Van den 12 tot den 15 W. wind mistig. Van den 16 tot den 24 zagt weêr met mist en O. wind. Van den 25 tot 29 NO. en ZO. met koude mist. Den 30 W. wind met zware mist.

De ziekten, welke deze maand heerschten, waren meest zinkingachtig, hier en daar zag ik eene ligte zinkingkoorts, welke door openende en zagte uitwaasfemende middelen gemakkelijk weggenomen wierd. *Angina catarrhalis* was deze maand vry algemeen, die gene, welke in den beginne verzuimd wierden, gingen meest al tot verzwearing over. *Pleuritides rheumatico-inflammatoria* wierden dikwils waargenomen, na behoорlyke aderlatingen vooraf te hebben laten gaan, namen spaansche vliegen

gen en zagte uitwaasfemende middelen de ziekte gemakkelyk weg. *Rheumatismi vagi.*, zinkingachtige hoofd en oorpyn, verkoudheid en hoesten waren menigvuldig.

Asthmatica leden door het vogtig en mistig weêr buitengewoon veel, de kinkhoest was deze maand nog zeer algemeen, drie kinderen overleden 'er aan.

December.

Van het begin der maand tot den 9 hadden wy meest W. winden met mist en regenachtig weêr — Den 10, 11 en 12 was de wind Z. insgelyks met nevelachtig weêr en regen. Van den 13 tot den 19 was de Wind meest W. en ZW. met afwisselende regen en heldere lucht. Van den 20 tot 23 hadden wy ZZO. wind met heldere lucht. Van den 24 tot den 27 was de wind bestendig O. met friske koude. Van den 28 tot het einde der maand hadden wy NO. winden met zagte vorst.

De kinkhoest heerfchte deze maand niet zo algemeen als in de vorige, 'er overleed nog één kind aan de zelve.

In het begin der maand hadden wy *pleuritis biliosa - inflammatorias*, welke meest al met huivering en koude begonnen, waarop hitte, walging en aanhoudende koorts volgden, hier by openbaarde zich eene fteekende pyn in de zyde, zo dat de lyders op de pynlyke zyde niet konden liggen; aderlatingen verlichtten weinig, niet tegenftaande het bloed dik en

en zomtyds vry ontfloken was; braakmiddelen daar en tegen, na gedane aderlatingen toegediend, deden veel dienst, daar door wierd meesten tyd eene dikke, taye, groenachtige stof ontlast; na de braking ondervond ik veel nut van zagte laxeermiddelen. De fluimen welke opgeworpen wierden, waren weinig, zeer taay en groenachtig; na genoegzame toegediende ontbindende laxeermiddelen, deden dilueerende zuurachtige dranken met zagte *expectorantia*, de lyders langzaam herstellen.

Rheumatique pynen, roos, en zinkingachtige zeere keelen waren deze maand zeer algemeen.

By 2 lyders, welke langen tyd aan eene *diarrhœa habitualis* gelaboreerd hadden, zag ik de voortreffelykste diensten van de *R. lign. campechensis*. — Stuipen by jonge kinderen waren deze maand menigvuldig. Drie stierven 'er aan de tering.



L Y S T

D E R

G E S T O R V E N E N

E N G E B O R E N E N

In M E P P E L

I N 1 7 9 3.

Gestorven

Geboren

<i>January</i>	4	11
<i>February</i>	7	12
<i>Maart</i>	6	14
<i>April</i>	7	7
<i>May</i>	8	10
<i>Juni</i>	6	6
<i>Juli</i>	11	12
<i>Augustus</i>	14	9
<i>September</i>	7	7
<i>October</i>	5	7
<i>November</i>	7	14
<i>December</i>	9	8
<i>Totaal.</i>	<u>91</u>	<u>117</u>

BE.

BERICHT

DER

ZIEKTEN

VAN

STEENWYK

En eenige omliggende Plaatzen, in de
vier laatste Maanden

VAN HET JAAR 1793.

DOOR DEN HEERE

J. B. SCHUURMAN,
Med. Doct.

September.

Deeze maand had in het begin gemengd weêr, was matig warm, de wind gedurig Zuidwest en West. Den 12 en 13 was het zeer warm, waarop donder en stortregen volgden, de wind Oost. Van den 14 tot den 17 was de wind West en Zuidwest met gemengd weêr. Den 18 zeer sterke en koude ZO. wind met veel regen.

Van den 19 tot den 23 was de wind Noord en Zuidoost met kouden regen van den 24 tot het einde der maand was de wind meest Oost het weêr was matig warm en droog, des nachts een weinig vorst.

In het begin dezer maand waren hier eenige
gal-

galkoortfen, en meest met hevige drukkende buykpynen verzeld, de mond was bitter, de tong geelachtig, gelyk ook het wit der oogen, geneigdheid tot braaken, de huid was heet, de pols fchielyk en vol, de nagten flape-loos, een *Emeto-catharsis* volgens STOLL gaf eenige verlichting, doch nam de pyn niet geheel weg, welke vervolgens door een drankje met *rob. sambuci, ribisiorum &c.* en daar op volgende laxeermiddelen uit *tamarinde &c.* geheel verdweenen.

By zommige vertoonde zig op den agtsten dag en vervolgens een sterke drukkende, doch meest al stompe pyn in de borst, en de toevallen, als geele tong en oogen waren wederom erger, de pis bruin, en de pols sterk. Ik gaf een oplosfenden drank met een grein *Tart. Emet.* waar door een weinig taaye geelachtige slym werd opgehoest; een aderlating gaf weinig verlichting, het bloed was met een dikke rheumatieque korst bedekt; in deze gevallen deden spaansche vlieg pleisters zeer veel nut; door deze en oplosfende dranken werden myne lyders hersteld.

In het vervolg dezer maand werden sommige door hevige rheumatieque pynen in den rug, tusfchen de fchouderbladen, en in de lendenen aangetast, met weinig koorts, veel stinkend zweet, en *coryza nasium & bronchiae*, de tong en mond natuurlyk, geheel geen stoelgangen, ik diende deezen laxeermiddelen toe, en vervolgens maakten ruime spaansche vlieg pleisters een einde der ziekten.

Zwaare *catarrhi* onder de kinderen waren

zeer algemeen, de benauwdheid op de borst was zeer sterk, de ademhaling fchielyk met een piepend geluid en gedurigen hoest, bykans zonder tusfchenpozing, de pols rad, klein en zagt, de tong witachtig beflagen, de *oxymel scilliticum* was onder anderen zeer dienstig.

De pokjes, welke in de maand Juny door een besmetting van elders hier overgebracht waren, gingen tot dus ver nog langzaam voort, egter stierven byna van de drie een. Dezelve fcheenen met gal vermengd, de tong was geel, de fmaak bitter met braakingen na de uitbotting; de meesten waren zamenvloeiend en by zommige vertoonden zig op den elfden, twaalfden en dertienden dag purpere vlekken, en stierven kort daar na, doch werden meest al, zonder behulp des geneesheers, aan aan de woede der ziekte overgelaten.

October.

Nu hadden wy meer regenachtige dagen dan droogte, met matige koude, de wind was van het begin tot den 10 tamelyk sterk en Zuidwest, doch meest West. Den 10 en 11 natte mist, dezelve wind hield aan van den 12 tot den 18, het weêr was meer droog en matig warm met weinig mist. Van den 18 tot den 23 begon het een weinig kouder te worden met dezelve wind, en meest droog weêr; den 24 en 25 was de wind NO. met fchoon weêr, waarop een ZW. en W. wind volgde met gemengt weêr, doch meest droog, tot het

het einde der maand een weinig mist. In het laatst der vorigen, en voornamelyk in het begin dezer maand werden 'er eenige weinige tusfschenpoozende anderendaagsche koortsen waargenomen, van een belétten uitwaasfeming ontstaan, de tong en mond waren schoon, 'er was een weinig bittere smaak, met geweldige hoofdpyn, en pyn door de leeden, en opgespannenheid der linkerzyde des buiks, de koorts vervroegde een uur, het *stadium frigoris* duurde twee uren en was sterk. Oplossende en zweetdryvende middelen deden weinig nut; door laxeermiddelen met *extr. graminis* verdween de opgespannenheid, maar de koorts werd meest al sterker, het *delirium* was hevig, zoo dat ik, zwaarder toevallen vreezende, genoodzaakt, was sommige de *cortex peruv*: en andere *cort. salicis albae* toetediennen waar, door de koortsen zonder eenige gevolgen ras verdweenen.

Eenige landlieden hun werk buiten verrichtende, gevoelden na de mist van den 10 en 11 een moejelykheid in het ademen, welke den volgenden dag zeer benauwd werd, met pyn in de zyde en sterke koorts, de pols was vol en sterk, veel zweet en groote hitte der huid, de tong was dun geelachtig beslagen, de smaak bedorven en veel dorst, de pis rood, de mond vry vogtig; een ruime aderlating gaf veel verlichting, het bloed was met een dikke witte korst bezet, en weinig *serum*: na de eerste wegen door een braakmiddel gezuiverd te hebben, gaf ik verzachtende en zweetdryvende dranken, welke gelyk ook aan-

S 2

ge-

gelegde spaansche vliegen van veel dienst scheenen te zyn.

By anderen heb ik het zelve beloop dezer catharrale ziekte zonder benauwdheid der borst waargenomen, veeltys met opgespannenheid des buiks, welke door laxermiddelen met *sal glauberi* ras verdween, de koortsen waren *continua remittentes*, welke zig tegen den avond scheenen te verheffen, en 'smorgens weder afnamen.

Verkoudheden en bezettingen op de borst waren algemeen, egter zonder pyn, met een vuile beflagen tong en bedorven eetlust, welke na buikontlastende en vervolgens de opvoesting bevorderende middelen schielyk verdweenen.

Een *febris urticata* werd nu en dan waargenomen, somtyds vertoonde zig een uitslag twee à driemaal daags, gelyk aan dat geene, welke door brandnetels veroorzaakt word, en verdween ook telkens weder met weinig koorts, de pols was klein en meer dan natuurlijk rad, hier by voegde zig somtyds een vaste pyn in de regter zyde des buiks, een weinig onder de maag, door buikopenende middelen en somtyds enkel door een *infusio* van vlierbloezem verdweenen deze toevallen.

De pokjes begonnen zig nu een weinig meer te verspreiden, doch werden meer goed-aartig en volgden meer geregeld hunnen loop.

In deze maand herstelde een landman van byna 60 jaaren oud, welke in de maand April dezes jaars een zwaare verkoudheid op de borst gevat hadde, doch zyne ziekte verwaarlozende, een

een geruimen tyd zyn gewoonen arbeid verrig-
te, tot dat zig eindelyk een verval van krag-
ten, en daarby een geduurige en lastige hoest
openbaarde, welke hem des nagts van zyn
slaap gedeeltelyk beroofde, hy zweette dan
nog overvloedig, het gaan was hem moeie-
lyk, de eetlust bedorven, hy was zeer kort-
ademig, de pols rad, en door gedurig hoesten
gaf hy dagelyks drie vierde pond schuimende
flym op, deze lyder raadpleegde my in de
verlopen maand Augustus, ik konde geen te-
kenen van *vomica pulmonum* bespeuren, maar
zag het eerder aan voor een *phthisis pituito-
sa*, ik schreef hem voor *glecoma hederacea*,
(*herba heder. tenestr.*) zoo veel hem moge-
lyk was als tee getrokken, in melk gekookt,
en als saladen te gebruiken, met deeze ge-
lukkige gevolgen, dat de lyder zeer ras ver-
lichting ontwaar werd, de toevallen afna-
men, het zweet en koortsje bedaarden, de
eetlust weder kwam, en thans een tamelyke
gezondheid als voorheen geniet.

November.

Van het begin tot den 4 gemengd en koud
weêr, de wind Zuidwest; van den 5 tot den
10 tamelyke goed zagt weêr, weinig regen, de
wind Oost. Den 11 en 12 veel kouden regen.
Den 13 storm en koud, van den 14 tot den
19 warmer en droog, de wind Oost en Zuid-
Oost, den 20 mist met Zuiden wind, den 22
tot het einde der maand, de wind meest Zuyd-
Oost en vogtige koude.

Veele ziekten in de maand waren catharrale benauwdheden in de borst, met en zonder pyn; by volbloedige gestellen nam een ruime aderlating de pyn weg, het bloed had een dunne witte korst en veel *serum*, egter geen *Contractie*, door emollierende dranken werden veele fluimen geloosd, de tong was met een witte papachtige stof bezet; by bejaarde lyders en pituiteuse gestellen, zag ik veel goeds van de *lichen Islandicus*.

Een *homopthysis recidiva* heb ik by eenige waargenomen.

Sommige werden door *colica spasmodica* zeer hevig aangetast, welke na clysteeren en ruime giften *laud. liquid. Sydenhami*; ras verdweenen; doch waar gepaste middelen verzuimd werden, stierven zy binnen 4 dagen.

De kinderpokjes begonnen nog eenigzints te vermenigvuldigen, genoegzaam by alle was by de uitbotting een bezetting op de borst, welke door verzachtende drankjes met veel *oxymel* verligt wierd, zonder eenige gevolgen, doch die aan de natuur overgelaten werden, hielden deeze benauwdheid in de ademhaling na het aflopen der ziekte: verders waren de pokjes *discreta*. In het einde dezer maand werden sommige met rheumatieke pynen door alle leeden aangedaan, *rob. sambuci* en *Tinct. Antimonii Huxhami* werden met veel nut gebezigd. Verkoudheeden, hoesten en zinkingpynen der tanden waren algemeen.

Decem-

December.

Den 1 was de wind West met regen en mist, den 2 de wind Oost met vorst en schoon weêr, den 4 en 5 Zuid West, dooi, koud, mist, tot den 19 viel hier veel regen, doorgaans zagt weêr de wind Zuidwest, wy hadden nu enkele schoone dagen, sommige koud en vervolgens matig, doch meest droog, de wind Oost en Noord Oost tot het einde der maand.

De rheumatieke pynen werden by aanhoudenheid waargenomen, eenige gevoelden dezelve zeer hevig in den opperarm, waardoor een sterke zwelling ontstond met weinig koorts, welke pynen door spaanschevlieg pleisters verdweenen.

Sommige gevoelden dezelve pynen in den onderbuik met meerdere koorts, waarop by eenige een pynlyke zwelling van een der beenen volgde, met dikke pynlyke verhardingen aan den binnenkant van het scheenbeen tot aan de knie, waarlangs de *vasa lymphatica* voornamelyk geleegen zyn, deeze verhardingen liet ik met succes wryven met *unguentum nervinum* en eenige druppelen *ol. cajaput.*

Andere gevoelden deeze pynen een geruimen tyd in den onderbuik, zonder eenig middel daar tegen te gebruiken, waarop een sterke diarrhée volgde, een geruimen tyd aanhoudende, welke door eenige dragma rhabarber of

extracta amara tonica weder verdweenen. Deeze buikloop was by kinderen hier zeer algemeen, zo dat by zommige een *oedema crurum* volgde.

Catharrale koortsen werden ook nog hier en elders waargenomen, de pols was zeer schielyk en vol, de huid was heet, de tong geelachtig wit, egter weinig bedorven smaak, veel dorst, pyn der leeden en op den vierden dag op de borst, welke by zommige een aderlating vorderde, en verdween, het bloed was met een witte korst bedekt. Vervolgens was 'er een benauwde spanning des buiks, welke by tyds door laxeermiddelen werd weggenomen; de koorts was remitterende, by zommige kwam 'er op den 5 of 7 dag een overvloedig stinkend zweet, 't welk eenige verligting scheen te geeven, by andere was een gedurig *delirium* en ook omtrent den 14 dag, een à twee dagen sterke buikloop, welke genoegzaam van zelf bedaarde: andere hadden deezen buikloop van het begin der ziekte en sommige stierven met de 14 dagen. Een laxeermiddel uit *tamarinde*, vervolgens *decocta 5 rad. aper.* met veel *rob. sambuci* deden in 't begin veel dienst, waardoor sommige byna alleen herstelden; doch andere vorderden de *cortex peruv.* in 't gevolg der ziekte.

De pokjes waren nog als in de vorige maand meest *discreta* veele hielden geregeld hunnen loop, by zommige waren dezelve in groot aantal en na dertienden en twaalfden dag, wanneer de pokjes doofden, sterke buikloop en

en nog een radde kleine pols met diepen
slaap, en gerommel der borst, ik liet terstond
veel zuurdeeg met mostaart aan de voeten leg-
gen, en vervolgens veel *spirit. vitrioli* met
water neemen, by eenige met gelukkig gevolg,
doch andere stierven.



BERICHT

VAN EEN

*Febris Rheumatica Biliosa vel
Putrida,*

Welke in de zes eerste Maanden, des
Jaars 1791.

Sporadice

TE

HOLWERT

GEHEERSCHT HEEFT,

DOOR DEN HEER

ALSTORPHIUS,

Heel- en Vroedm. aldaar.

Eene galachtige beflagene tong, walging benauwdheid voor 't hart; traage afgang; pynlyke aandoening in onderscheiden deelen des lichaams; (als tusfchen de fchouderblaaden, zydelyke deelen der borst, buik- en leedematē) met een rasfe volle pols; gepaard fomwylen met eene korte en moeiljke adembaling en geringe hoest; (met deeze laatste toevalen verzeld, noemde ik dezelve, een *pleuritis rheumatico biliosa*) waren de voornaamfte *signa Characteristica* deezer ziekte.

De geneeswys in dezelve bestond, na gedaane *venæ sectio*, van 4---8 oncen, in 't toedie-

dienen van een *Emeticum ex tart. Emet.*, waar door de lyders, niet zelden, eene ongewoone meenigte groene stinkende gal van boven en onderen ontlastten. —

Zeer voorzigtig, echter, moest men met de bloed-ontlasting te werk gaan, dewyl de *inflammatoire dispositie* spoedig verdween en de rotting toenam. —

Hierna diende ik den lyder een *decoct. ex tamarind. folior. sennæ, Extr. taraxac. rob. samb. fol. polychr. en spir. Nit. dulcis*, toe continuëerde hier mede tot dat de tong schooner wierdt. — Op het laatst *unc. B. cort. peruv.* tot ondersteuning der kragten, als worms- wyze beweging van 't darmcanaal eenigzints opwekkende, ter bevordering der ontlasting van de nog plaats hebbende *foeces*, 'er byvoegende. —

In hooggaande zwakheid nogthans, waar de eerste wegen nog vuil zyn, paarde ik de *Cortex peruvian.* met *rhabarber*, wyn en andere *analeptica*; en dit kooft ook te pas by bejaarden, die een sterke ontlasting zoo wel niet verdragen. —

De *primæ viæ* gezuiverd zynde, waarna zich meestal een *criticq* zweet opdeedt, nemende die nog plaats hebbende *rheumatique* pynen weg. Dit niet gebeurende, appliceerde ik een *Vesicatorium*, waar door dezelve verdweenen. —

De *cort-peruvian* gepaard met een weinig *rheum.* of *sal. polychr.* en het gebruik (indien verkrygbaar) van eenigen rinschen wyn, verdreef spoedig de nog overblyvende koorts en zwakheid,

heid, waar door de lyders spoedig' herstelden. —

De *Pleuritis rheumatico biliosa* vertoonde zich voornamelyk in 't laast van Mey en 't midden van Juny, wanneer eenige koude regenachtige dagen plaats hadden. —

Voor min Ervarene *Practici* was het in 't begin moeilyk te onderscheiden, of de ziekte enkel *inflammatoir* of wel met 't galachtige vermengd was: als men nogthans ondervond, dat de pols minder hard, de hoest gering, en de zieken ondervraagd zynde, over eenen kwaaden smaak in den mond en walging klaagden, bleef 'er omtrent dit laatste geen twyffel meer over. —

De aderlating moeste toen tot 2 of 3 reizen herhaald worden. Een *mixtuur ex resolutibus subadicis*, met *oxym. simpl. squilliticum* *Extr. taraxac*, en *Nitrum & Aq. Costæ* bereidt, was van groten dienst. —

Waarna een *Emeticum*, uit de *Tart. Emet.* in eens of in verdeelde giften, (naar maate de inflammatie van de longen groot was) wierdt toegediend. — Een aftrekzel van verzagende Borstkruiden nam de nog overblyvende hoest weg. —

Enkele reizen heb ik gr. III *Tart. Emet.* onder boveng. *Mixtuur* doen mengen, met een gewenscht gevolg. —

Harde buiken naa langduurige koortsen (by kinderen) ontstaan met een *glutinosum spontaneum*, verzeld van een *acidum*: eerst in *primis viis* en vervolgens door 't geheele lichaam. —

De

De geneezing, als de kwaal geneeslyk is, wierdt volbragt door *salia alcalina*, *Herb. & rad amarae*, *gum. ferulacea*, &c. — Als de afgang traag is, word die bevordert door 't *Elix. proprietatis*, *Mass. pil. ruffi* of diergelyke; 't lichaam moet veel bewoogen en de buik daaglyks gewreeven worden, alzoo dezelve in een zwakheid en verstopping der buiks - ingewanden bestaat. —

In *Obstru&ione viscerum*, heeft my niets beter voldaan, dan een Mixtuur uit de *Extr. taraxac. fumariae* vel *dulcamarae*, *terra foliata tartari* met 3 of 4 greinen *Tart. Emet. Oxym. Simpl. & aq. co&ct.*, met byvoeging van de *spir. Nitri dulcis*, om de spasmotique beweeging van 't darmcanaal voor te komen. —

Zomwylen deeden pillen uit de *gum. ferulac.* met *sapon. venet. Camph.* en een weinig *Aloes*, (vooral by hysterieke gestellen) beter uitwerking. —



BERICHT DER ZIEKTE EN DIE TE ROTTERDAM

GEHEERSCHT HEBBEN,

In de zes laatste Maanden van het Jaar 1793.

*Door een Gezelschap Geneesheeren; by
een verzameld door den Heere*

E I C K M A,
Med. Doct.

July.

De ziekten in deze maand alhier waargenomen waren.

1. *Boorten* en goedaartige *buiklopen*, waar van de oorzaak zig vry gemakkelyk liet vinden in eene bedorven spysverteering, uit een onmatig gebruik van verdunnende dranken, en het afwisselend blootstellen aan verhitte en verkoeling, geboren, zy genazen ook meest al zeer gemakkelyk als men door een braakmiddel de kwalyk verteerde voedzels liet uitwerpen, en voorders door een *anima rhei* en maagsterkende middelen de geregelde uitwaasfeming en ontlasting herstelde.

2. *Keelontsteekingen* zomtyds met, zomtyds zonder *uitslag*; het was niet zeer duidelyk of deze ziekte wezenlyk roodvonk was of niet:
de

de hoedanigheid der keelontsteking schein al-
lezints van denzelfden aart, als die, welke ge-
meenlyk in het roodvonk zig voordoet, maar
de tong, schoon meer dan natuurlyk rood,
was niet zoo peukelig even als met opkomen-
de sprouw bezet; de uitslag zelve was meer
puistgewyze en niet zoo gevlekt, ook nam
men by het eindigen der ziekte die vervel-
ling niet waar, die gemeenlyk by het rood-
vonk plaats heeft. Ook vertoonden zig nu en
dan hier by andere verschynzels, die aanlei-
ding gaven om deze ziekte eerder voor zin-
kingaartig te houden, zoo als slyfheid van den
hals, pyn door de leden, hoest en dergelyke,
waartoe wy dan ook te meer overhellen, de-
wyl wy hier en daar deze ziekte aantrouwen by
lyders, welke verzekerden het roodvonk te
hebben gehad, en het bekend is, hoeveel in-
vloed algemeen heerschende uitslag ziekten op
de zinkingaartige ongesteldheden hebben, om
dezelve meer of min in haar eigenschappen te
doen deelen; waarom het dan ook niet onna-
tuurlyk was, dat dezelve *keelontsteeking* dik-
wyls zonder uitbotting zig vertoonde. De ge-
neeswyze was verschillende van die der ge-
woone keelontsteekingen; met ontlastmiddelen
moet men spaarzaam te werkgaan, zelfs brag-
ten dezelve, hoe zagt ook, dikwyls nadeel aan;
zagte verdunnende uitwaasfeming bevorderende
middelen, waar onder voornamelyk het afkook-
fel van den graswortel met honig azyn of
vliersyrop, heeft den meesten dienst gedaan;
zuure zamentrekkende gorgelmiddelen waren
nadeelig; een aftreksel van vlierbloemen met
vloo-

vioolen fyroop en borax waren het meest verzagtende.

3. Het *roodvonk* zelfe was geduurende deeze maand niet zeer geregeld, de kinders hadden dikwyls den uitflag reeds eer zy eenige andere onpasselykheid bespeurden en werden dan eerst en zomtyds ernstig ziek, wanneer dan de lyders niet tot uitwaasfeming te brengen waren, ontstond er meestal een scherpe pyn in de keel, die zig in allen opzigte gedroeg als de reeds gemelde keelontsteeking, doende ook dezelfde middelen hier den meesten dienst; voorts waren 'er in deeze maand ons geene voorbeelden van kwaadaartig roodvonk voorgekomen.

4. De *Pokjes*, die zedert vier jaaren deze stad niet verlaaten hadden, regeerden ook nog in zomnige buurten vry algemeen, doch waren meestal goedaartig en liepen doorgaands af zonder etterkoorts, hoe zeer de uitbotting zomts aanmerkelijk was.

5. De *Koortsen*, die ons deze maand zyn voorgekomen, waren (1) *anderendaagsche*, die zeer goedaartig waren en veelal na de behoorlyke zuivering, door eenvoudige bittere maagmiddelen gemakkelyk genezen wierden, zonder dat men eens den toevlugt tot de kina behoefde te nemen, (2) enkele *gal* of *rotkoortsen*, waaronder 'er waren, by welke zig in den beginne met veel benaauwdheid en zeer moeijelyk door braaking een deel groene ontaarte galstoffen ontlaste, terwijl de tong schoon was en zelfs meer dan natuurlyk rood: — braakmiddelen deden hier meer kwaad dan goed, want zy scheenen een krampachtige sluiting van den *pylorus*, een uit-

zet-

zetting der maag en daar door belette ontlasting der stoffe te veroorzaken, waardoor de benaauwdheid grootelyks vermeerderd werd, en waarop dan een afmatting en uitputting der krachten volgde, die ras den dood na zig sleepte. Integendeel bewerkte de eenvoudige rhabarber met zuurbreekende middelen, inzonderheid kreeftsoogen, gemengd, vry spoedig gewenschte ontlastingen van gebonden stoffen, met verligting; waarop eenvoudige maagmiddelen, en boven al het niet genoeg te roemen afkookzel van alantswortel met oranje schillen, spoedig de gheele geneezing volbragten.

Ik kan niet nalaaten, hier in het voorbygaan aante-merken, dat het my is voorgekomen, dat men in de zoogenaamde galkoortsen dikwerf voor de oorzaak der ziekte neemt het gene niet zelden enkel een gevolg is van de werking der natuur, om zich meester te maaken en te ontlasten van eene zondigende stoffe, welke onzer aandagt ontsnapt of ons niet zelden geheel onbekend is, wanneer in den nazoomer de meeste menschen een ruim en zomts overboudig gebruik maaken van zuure vruchten en dranken, is het niet te verwonderen, dat hier door de spysverteering bedorven word en een verzuuring der voedfels in de maag plaats grypt, de gal nu schynt van de natuur ten minsten voor een gedeelte verordend te zyn om het overtollig zuur in de eerste wegen opteslorpen en te omwikkelen, en deze gal, dus met zuur gemengd, verkrygt een groene en gruizige gedaante, gelyk ons zoo wel de scheikundige proeven als de dagelyksche ondervinding voornaamlyk by de kinderen leeren; zoo

T

lang

lang nu eene genoegzaame hoeveelheid gal word afgescheiden om het genomene en voortgebragte-zuur noch ten onder te brengen, blyft de gezondheid min of meer volkomen voortduuren, doch begint deze te ontbreken, zoo word de spysverteering geheel bedorven, waar van een van de eerste gevolgen is een gebrek-kige uitwaasseming en de daar uit ontstaande koorts; deze verwekt in den beginne altoos min of meer eene ontsteekingaartige gesteldheid in het lichaam, welke dan ook in de maag een groote gevoeligheid en geschiktheid tot kramp verwekt, waartoe natuurlyk de raauwheid, door het zuur veroorzaakt, dezelve geschikt gemaakt heeft; deze is dan ook de reden, dat de stoffen zich niet gereedelyk door braaking kunnen ontlasten, schoon 'er door de prikkeling der aanwezende ziektestoffen der gal met deze ziektestoffe gemengd, geduurige neigingen toe zyn. Men ziet dus klaar, hoe weinig in dezen staat van zaken braakmiddelen kunnen helpen tot wegneeming der zondigende stoffe, daar zy door haare prikkeling de kramp vermeerderen, en dus de ontlasting nog onmooglyker maken, terwyl zy aan den anderen kant de krachten uitputten en hier door de natuur buiten staat stellen haare poogingen tot het ten onder brengen der ziektestoffe aantewenden. Integendeel ziet men, hoe zeer hier de zuurbreekende geneesmiddelen te pas koomen, daar zy de natuur helpen in het ten onderbrengen der zondigende stoffen, die men dan gemakkelyk genoeg door een zacht en der uitwaasseming niet nadeelig ontlastmiddel, gelyk de rhabarber, ge-

gereedelyk en zonder opschudding kan naar buiten voeren.

6. De *kinkhoest*, die reeds een tyd lang van meer dan een jaar vry algemeen geheerscht had, heeft zich ook nog blyven vertoonen. Schoon zy meestal niet zeer geweldig was, gedroeg zy zich niet temin vry hardnekkig tegen de meeste aangeprezene middelen; niet zelden heeft men dezelve geëindigd gezien door een zwelling van eene der kwylklieren, voornaamlyk der *parotides* of *submaxillares*. — Wanneer deze zwelling onvoorzigtig met verdryvende middelen behandeld werd, kwam de kinkhoest dadelyk weder, zachte omwikkende zweetdryvende middelen zyn gewoonlyk nog van de beste uitwerking geweest, ook deed hier en daar de *sulphur auratum*, zoo het scheen, eenigen dienst. De *Ipecacuanha* heeft geene spreekende bewyfen van deszelfs nuttigheid hier gegeven.

Augustus.

In deze maand bleven de bovengemelde ziekten meest al op denzelfden voet voortgaan.

De *koortsen* hadden meer van het zinkingaartige, de lyders klaagden of over ondraaglyke hoofdpyn of over pyn en mattigheid door alle de ledenmaten, de tong was droog en licht geel beslagen: zy waren geneigd om tot rotziekten overtegaan; inzonderheid, wanneer men in den beginne geene uitwaasseming konde verwekken, het welk echter met kleine gif-

ten van den braakwortel of braakwynsteen nog al gelukte, by gebreeke hier van moest men de toevlugt tot versterkende en rottingweerende middelen neemen en de *Cortex peruv.* met den vitriool - Elixir van Mynsicht deed hier goeden dienst; wanneer dan hier door de krachten genoeg waren opgewekt, ontheftte meest al een zachte ontlasting, door rhabarber met wynsteen - bewerkt, den lyder van de koorts.

September.

1. Ook in deze maand bleeven zig nog *boor-*
ten en *buikloopen* vertoonen, die niets byzon-

2. De *keelpynen* bleeven ook nog vry algemeen, doch scheenen minder ontsteekingaartig; zy vervoegden zig by de meesten ziekten, die uit eene belette uitwaasfeming ontstonden; ook waren zy nog hier en daar met uitslag, dat geen overeenkomst had met roodvonk, gepaard.

3. Het *roodvonk* zelve, schoon men het algemeen vry goedaartig noemen moest, ver-
toonde zig echter hier en daar kwaadaartig; zomtyds ontstond 'er reeds onder of kort na de uitbotting een spoedige verplaatsing of op de hersenen, die een langzaam doodelyke slaap-
ziekte, of op longen, welke een longontsteeking, die spoedig een eind van 't leven maakte, ten gevolge had; dikwyls werd de stof op de klieren der keel of de kwyklieren gevoerd, deze verplaatsingen luisterden naar ge-
ne

ne afleidende middelen van wat aart ook: de verplaatzing op de keelklieren verwekte zwelling met afscheiding van veele taaye slym, en raauwheid der deelen; alleen de verzagtende middelen deden eenigen dienst. — Dikwyls zag men ook de uitbotting vervangen door een zwelling door het gansche lighaam; als dan was de blootstelling aan de koude zeer gevaarlijk, in een geval van dien aart werd de zwelling daar door eensklaps verminderd en gevolgd van eene binnen zes uren doodelyke *peripneumonia*. — By zommigen had in den beginne een blaarwyze uitslag op de armen plaats en deze scheenen steeds het gevaarlykst te worden.

De ontlastmiddelen zoo aderlatingen als braaken afgang verwekkende middelen waren allerna-deeligst, en daar in den beginne der ziekte de keelpyn veele tot het aanwenden dezer middelen deed overgaan, werden 'er ook hier door veele om hals gebragt. — Uitwaasfening bevorderende middelen, waar onder vooral de *spiritus mindereri* met verzagtende afkookzels waren doorgaands de eenigen, die nut deden.

4 De *pokjes* scheenen algemeener te worden en schoon zy doorgaande goedaartig bleeven, zag men 'er echter hier en daar enkele die, zeer kwaadaartig waren, ja zelfs zulke, in welke zig het aangezigt en de handen als eene blaas opzetterden, zonder afzonderlyke puisten te vertoonen, die dan ook met alle teekenen van bederf reeds den tweeden dag doodelyk waren.

5. Hier en daar begonnen zig mazelen voor te doen, zy waren zeer goedaartig.

6. De *koortsen* waren zeldzaam 'er vertoonden zig echter nog *anderendaagsche afgaande najaarskoortsen*, die nu en dan in *tusschenpoozende* veranderden; door in den beginne met *rhabarber* en *wynsteenroom*, nu en dan met een enkele grein *braakwynsteen* gemengd, zagtes de ontlasting en uitwaasfeming te bevorderen, deed men zeer veel voordeel en de ziekte werd dikwyls met weinige *cardiaca* verder geheel genezen.

De *zinkingkoortsen* van Augustus bleeven zig ook nog voordoen, doch weinige en zy werden, gelyk gezegd is, gemakkelyk genezen.

De *kinkhoest* bleef nog algemeen.

October.

De bovengenoemde ziekten bleeven al meest op den zelfden voet voortgaan.

Men heeft in deze maand verscheidene voorvallen van *beroerten* by bedaagde lieden waargenomen.

November.

Ook deze maand bleeven de zelfde ziekten voortduuren.

De *mazelen* en *zinking* ziekten van verschillenden aart werden algemeener, doch niet gevaarlyker.

Decem-

December.

Terwyl de *keelontsteeking*en, schoon minder pynlyk en ontsteekingaartig, als mede het *roodvonk*, de *pokjes* en *mazelen* al op denzelfden voet als in de voorige maanden bleeven voortgaan, werden de *zinking* - *ziekten* meer en meer algemeen, waar toe het veranderlyke mistige weder niet weinig scheen toe te brengen; de uitwaasfeming te bevorderen was hier, zoo als gezegd is, de hoofd - zaak. — In een geval van *zinking* - *koorts* hadden wy een spreekend voorbeeld van het gevaar, waaraan de lyders zig blootstellen, wanneer zy, na dat pas de uitwaasfeming weder hersteld is, zig weder bloot geeven. — Een branders knecht, die door een *zinking* - *koorts* over vallen was, werd op de opgegeevene wyze behandeld en binnen 2 à 3 dagen bevond hy zig beter, zoo dat hy, door zyn Meester gedrongen, het waagde zyn werk weder op te vatten, dan de uitwaasfeming hier door weder belemmerd zynde, verviel hy in een *diarrhoea putrida*, waar door wel haast zyne krachten zoodanig afnamen, dat alle hulpmiddelen te kort schooten.

Waarneemingen wegens het Weder, 1793.

De maand *September* leverde ons veele regendagen op. — De heerschende wind was in 't begin der maand meest Westelyk, waar na de-

zelve Ooftelyk wierd, doch in het laafte der maand vry hard met regen uit den Westen waaide.

De grootfte warmte was den 14ⁿ 69° F. de grootfte koude 44° en het gemiddelde van 's morg. 's midd. en 's avonds 56°.

De hoogfte ftand des Barometers was 30, 3 Eng. dⁿ. de laagfte 29, 4 dⁿ.

De vogtmeter van den Heer de Luc toonde den grootften graad van droogte by het begin van der Oofte wind t. w. 49° de grootfte vogtigheid der lucht by den ZW. wind was 71°.

Wy merken hier aan, dat geduurende den harden ftorm-wind en regen in het laafte der maand de vogtmeeter nog altyd 58° of 60° teekende; en dat uit veele waarneemingen bleek, dat de lucht voor zonnen opgang zeer vogtig was, doch dat, nadat de zon opgegaan was, het zy het helder was of niet, de vogtmeter naar droogte liep en hier in bleef voortgaan tot drie uren nadenmiddag, op welken tyd de grootfte droogte plaats had, loopende dezelve naderhand weder na vogt, zoodat dezelve na zonnen ondergang nog meer vogt aanduidde, dan 's morgens daar aan.

De gevallen regen was te Alkmaar 64 en het uitgewaasfemd water 26 lynen.

In *October* waren weder veele betrokken en regendagen, de heerschende wind was uit het Westen tot den 22ften, als wanneer de wind tot het eind der maand uit het Noorden en Noordoosten begon te waaijen en ons eenige heldere dagen opleverde.

De hoogfte graad van den thermometer was 65°

65° de laagste 39° het gemiddelde der waarnemingen gaf 55½.

De hoogste stand des barometers was den 15ⁿ 30, 21 dⁿ, de laagste den 30ⁿ 29, 12 dⁿ.

De vogtmeter toonde in 't gemeen een vogtige lucht, als in de vorige maand, de grootste vogt was 84°. en de grootste droogte 58°.

Gevallen water was 22 en uitgewaasfemd 19 lynen.

In *November* bleef de luchtsgesteldheid vry vogtig en wy hadden weder weinige geheel heldere dagen, de wind was in 't begin der maand zeer veranderlyk, dan West, dan ZO. dan O., NO., NW. enz. in het midden der maand meest Oostelyk, en in de laatste dagen NW., 'er waren veele storm en regenvlagen.

De hoogste stand van den Therm. was 55°. en de laagste 35°. en het midden 44°.

De hoogste stand des Barometers was 30, 36 dⁿ. de laagste 29, 2.

De vogtmeter toonde, dat de vogtigheid der lugt in deze maand die van de voorige nog overtrof, de grootste vogt was 88½°, doch de grootste droogte maar 65°.

Ook was de uitwaasfeming in deze maand maar van 11 lynen en de gevallen regen 23 lynen.

December leverde ons den 2ⁿ. een NO. wind met eene aanmerkelyke koude, die echter maar eenen dag duurde, wordende vervangen door Westelyke en Zuidelyke winden, vergezeld met regen en wind tot op den 21ⁿ., wanneer de wind door het Zuiden naar het Oosten liep, en tot het einde der maand O., N. en ZO. bleef waaijen,

meest met betrokken lugt, en 's morgens meestal nevelagtig.


De Therm. stond den 13ⁿ op 60°, zynde een aanmerkelyke hooge opklimming voor het jaarfaai-foen, zyn laagste stand was den 2ⁿ. op 24°. — Voor 't overige was de lugt geduurende de geheele maand zeer gemaatigd, en het midden uit de Waarneemingen gaf een warmte van 44°.

De hoogste Barometer was 30, 31 dⁿ. de laagste 29, 13.

De vogtigheid der lugt nam in deze maand steeds toe, voornaamlyk by het regenagtig wêer, het gene met veel mist gepaard ging, in welk geval de vogtmeter dikwyls 93° teekende; de grootste droogte was van 58°.

De gevallen regen was 26 en het uitgewaasfemd water niet meer dan 7 lynen.

E I N D E







VERHANDELINGEN

Omtrend de WEERSGESTELD-
HEID en ZIEKTEN der
VEREENIGDE NEDERLANDEN
UITGEGEEVEN
DOOR DE
NATUUR.

EN

GENEESKUNDIGE
CORRESPONDENTIE-
SOCIETEIT,
IN 's H A G E.

*Ventos, & Varium Caeli prædiscere morem
Cura sit, ac Patrios cultusque habitusque locorum.*

VIRGILIUS

II. DEEL.



MUTUA PRESTANT OFFICIA. *V. Meern Str.*

IN 's GRAVENHAGE;
BY A. VAN HOOGSTRATEN;
M D C C X C V.

Nil foret in arte medica utilius, quam succedentes sibi ad invicem constitutiones conferre, ut recta medendi methodus institui posset, quoties eadem tempora ac iidem morbi recurrerent. —

R A M A Z Z I N I.

VOORBERICHT

A A N D E N

GEËERDEN LEZER!

Om aan onze beloften voor het
laast uitgegeeven Deel dezer ver-
handelingen geplaatst te voldoen,
bieden wy Uw lieden hieraan die
berichten, welken ons aangaande
de ziekten in den Jaare 1794 ge-
heerscht hebbende, toegezonden
zyn; hun getal is gering, behel-
zende duiten die van s'Gravenhaa-
ge slegts de Weêr en Ziektenkun-
dige waarneemingen van Rotter-
dam, Holwert en Meppel, bene-
vens eene Beschryving van eene
Zinkingaartige zenuw-koorts by
het Regiment Hollandsche Gar-
des te voet, geduurende hun
Campement by Breda waargenoo-
men, welke wy niet ongeschikt

II V O O R B E R I C H T.

oordeelden hier eene plaats in te ruimen — Met leedweezen beken-
nen wy, dat onze voorraad gering
is, en hadden gaarne gewenscht
door onze geëerde Corresponden-
ten in staat gesteld te zyn geweest
uw lieden hedenmeerdere waarnée-
mingen aan te bieden, dan na her-
haald verzoek geene verder ont-
fangen hebbende, beslooten wy
eindelyk, om niet in gebreeken
te blyven, deeze weinige uittegee-
ven. Zeeker is het, dat, indien
wy het voornaame oogmerk dezer
heilzaame inrigting naagaan, het
kleine getal ingekomen stukken
daar aan niet voldoende is, om
eene aaneengeschakeldes chets der
Ziekten van ons Vaderland te gee-
ven; en heeft de voornaame Op-
richter deezer Societeit, wylen
Dr. van den Bosch reeds moeten
ondervinden, dat zyne vrees voor
de ondergang derzelve niet geheel
on

ongegrond was, daar het getal der correspondeerende leeden reeds ten zynen tyde door verschillende oorzaaken merkelyk verminderd was, zo hebben wy in vervolg van tyd door eene geheele werkeloosheid dier Leeden, dezelve als hetwaare, geduurende eenige Jaaren der vergeetelheid geheel en al overgegeeven gezien; tot dat eindelyk Directeuren het weezentlyk nut deezer inrigting inziende, de weinige voorhanden zynde stukken uitgaaven, met het heilzaam oogmerk, om door het aanwinnen van nieuwe Correspondeerende Leeden, op eene minder kostbaare, en gemakkelyker wyze hunnen arbeid voort te zetten, en tot een algemeener nut te doen strekken, gelyk zy daar van in het Programma voor het laatst uitgegeeven Deel geplaatst, melding gemaakt, en hun plan op-

gegeeven hebben : moeten niet te min Directeuren zig beklagen over het gering getal der ingezonden berichten , willen zy zulks liever toefchryven aan die algemeen genoeg bekende oorzaaken , welke dit jaar de werkzaamheeden van meer andere Societeiten insgelyks gestremd hebben , dan aan de verflauwdens yver der geëerde Correspondenten , welke in voorige tyden deze inrigting zo bereidwillig en lofflyk hebben bygestaan ; billyk durven wy ons dan met die verwagting vleijen in het vervolg door hunnen arbeid ons in staat gesteld te zien , om deeze nuttige , en het heil en de welvaart onzer meede burgeren zo zeer bevorderende inrigting , als het waare , wederom te doen herleeven ; des te meerder grond hebben wy nog voor deeze onze verwagting , daar behalven de toezegging onzer
thans

thans fungeerende Correspondenten om berigten in te zenden de Hoogleeraar *Thuesink* zich alle moeite geeft, om ten opzichten der Provintie Groningen, ons dezelven insgelyks te doen toekoomen, en het waare te wenschen dat dit voorbeeld des werkzaamen Hoogleeraars, in de andere Provintien insgelyks nagevolgd wierd; hierdoor zouden men eigentlyk in staat gesteld worden, eene volledige Ziektenbeschryving van ons Vaderland te bekoomen, met de oorzaaken der Ziekten, derzelver onderling verband, complicatien en toevallen, na maaten de verschillende Luchtgesteldheid, ligging, grond, aard en beezigheid der Inwoonderen in ieder Provintie na te gaan, en daarna de voorzegging en geneeswyze te bestieren; en hoe nuttig zodanig een onderzoek zy, zoude men dan eerst

bespeuren, als 'er zich **Epidemi**sche ziekten openbaaren; derzelver spoedige voortgang, dikwyls moeyelyk na te speuren oorzaaken, en daaruit voortvloeiende verschillende en onzekere **Geneeswyze** brengen niet zelden zoo wel den **Geneesheer** in verlegenheid, als den **Lyder** in gevaar; niets zoude zulks beeter en gemakkelyker kunnen voorkomen dan eene juiste vergelyking der **Epidemien** op verschillende plaatsen met elkan-der, om uit derzelver meerdere of mindere overeenkomst, een algemeen en zekerder geneeswyze optemaken.

Verder moeten **Directeuren** met smert kennis geeven van het overlyden van *Mr. J. P. van der Haar* Secretaris van 's Hage, eerste **Dirigeerend Lid** dezer **Societeit**, wiens yver en zorg voor den bloei en het welzyn derzelve reeds van
de

de eerste oprichting af genoegzaam bekend, met dankbaarheid herdagt moet worden; dit verlies gevoegd by dat van onzen Mede Directeur Dr. *D. Huybers*, Anat. en Chirurg. Profesfor alhier, en verscheide Contribueerende Leeden, heeft niet alleen de Societeit merkelyk verzwakt, maar deszelfs inkomsten ook zeer benaadeeld; niet te min durven Directeuren zig vleijen (indien lust om de Maatschappy van dienst te zyn de Correspondenten aanspoort hunne berichten tydig in te zenden) met de contributie penningen der thans in weezen zynde Leeden, (in hoope dat derzelve getal mooge toeneemen) hunne werkzaamheden te zullen kunnen voortzetten, terwyl in het gebruik der penningen de meestmoogelyke spaarzaamheid betracht word gelyk zy zich vleijen uit de tegens

genswoordige staat der finantie dezer Societeit, welke zy niet schroomen hier open te leggen, ten vollen te kunnen blyken; Zedert dat Directeuren in den Jaare 1793 het Werk weederom hebben voortgezet, bleef met primo Jan. 1794 'er in Cassa overig $f346:8:4$; hier bykomende de ontfangen contributien over 1794, was ultimo Decemb. 1794 de Ontfangst $f680:8:4$ en de Uytgaaff $476:0:0$ dus zuyver over in Cassa $f2048:4$. Met dit overschot en de nog te ontfangen Contributien voor 't Jaar 1795 begreepen Directeuren genoegzaam in staat te zyn om met het drukken der Berichten voort te gaan, al waare het dat zy 'er meerder ontfangen hadden, en dus dit stuk grooter uitgebreidheid gehad had; dan teffens resolveerden Directeuren om alle nodelooze uitgaven afte schaffen, en gene andere te doen, als die

tot

tot het drukken, en verzenden der Berichten, en de Correspondentie volftrekt noodig waaren: In onzen Ontfangft over 1795 zullen wy zekerlyk wederom verliezen, nadien eenige Leden verlooren hebbende derzelver plaats maar door eenige weinie nieuwe contribueerende Leeden, zynde eenige Studenten van de Groninger Univerfiteit, voor zo ver ons tot heden toe bekend is, vervuld is geworden: Hoewel nu deeze ftaat der Societeit met die van vroegere Jaaren vergeleeken zynde zich op verre na zoo voordeelig niet vertoond; zo is nogthans ons vafte voorneemen, hoe laftig en moejelyk het ook voor ons zy, om op ons begonnen voetfpoor voorttegaan; wy hoopen en vertrouwen, dat, al vermeerderde de Jaarlykfche inkomsten niet (mits wy die behouden welken wy tot nog toe hebben) in ftaat ge-

I V O O R B E R I C H T

gesteld te zullen zyn de ingekommene Berichten in het licht te geven, en aan alle de Correspondeerende en contribuëerende Leden een Exemplaar toe te zenden, houdende ons verder aan den inhoud van het Programma voor het laatst uitgegeven Deel geplaatst.

Vermits Directeuren door verschillende omstandigheeden buiten staat gesteld zyn voor te tegenwoordig eene volledige Lyst zoo der Leden, als Leden Correspondenten op te geven, moeten zy zich vergenoegen alleenlyk te melden; dat de tegenwoordige Directie deezer Societeit bestaat uit den

Præsident

Mr. J. Meerman, Vryheer van Dalem &c.

Vice Præsident

Mr. P. J. D. Patyn.

Di-

VOORBERICHT. xi

Directeuren,

Dr. T. Tamé.

Dr. J. D'Estandau.

Dr. A. van de Laar.

Dr. J. Covyn Ter Bruggen.

Dr. A. Laurillard dit Fallot.

Thesaurier

Dr. A. van de Laar.

Secretaris

Dr. A. Laurillard dit Fallot.

1800-1801

1802-1803

1804-1805

1806-1807

1808-1809

1810-1811

1812-1813

1814-1815

1816-1817

1818-1819

1820-1821

1822-1823

1824-1825

1826-1827

1828-1829

1830-1831

1832-1833

1834-1835

1836-1837

1838-1839

1840-1841

1842-1843

1844-1845

WAARNEEMINGEN

OMTRENT DE

LUGTGESTELDHEID


E N

Z I E K T E N

V A N

'S GRAVENHAGE

VOOR DEN JAARE 1794.



Daar in het algemeen het nut, dat men uit naauwkeurige ziektenbeschryvingen trekken kan, niets meerder bevordert, dan de ziekten zelve behoorlyk te rangschikken, ten einde derzelver aart, toevallen, voorzegging en geneezing wel gekend, en van anderen onderscheiden worden, durven wy egter niet ontkennen, dat zommigen door éene alé groote naauwkeurigheid het getal der ziekten, als het ware, vermeerderd, en hier door niet zelden tot veel verwarring aanleiding gegeven hebben, daar ziekten van dezelve aart, by verschillende Schryvers dikwerf in naam merkelyk verschillen: Zonder egter het nut, dat uit

A

een

2 Waarneemingen omtrent de Lugtgesteldheid

een behoorlyk onderzoek, en vergelyking derzelver voortvloeit, te ontkennen, begrypen wy nogtans aan het oogmerk dezer Societeit het meeste te zullen beantwoorden, indien wy, om zo veel mogelyk gelykheid te houden, die order, welke by het *Programma* van deze Societeit bepaald en opgegeven, en voor het 1ste deel 1ste stuk van deszelfs verhandelingen te vinden is, en wy voorneemens zyn te volgen in het opgeeven der ziekten van deze plaats, alvorens mededeelen.

Vier Classen van ziekten zullen wy dus bepaalen, waar van de Eerste bevatten zal de *Morbi stationarii* anders genoemd *Morbi Tempestatum, annui*, ziekten der jaargetyden, als zyn Winter, Lente, Zomer en Herfstziekten, deze vertoonen zig immers 'sjaarlyks, altoos minder of meerder, ja zyn zomtyds zomernigvuldig, dat men ze *Morbi Epidemici* noemt, hoewel ons voorkomt dezelve ordenshalven te moeten onderschyden.

De Tweede Classe zal behelzen de eigentlyke *Morbi Epidemici*, algemeen heerschende en aansteekende Ziekten, welke maar heerschen enkel voor een zekere tyd, op eene plaats, dikwyls in enkele dorpen, of steeden, en zelden in geheele landen, ook komen zy in verscheide Jaaren zomtyds niet weder te voorschyn, blykens de kinderpokjes die dikwerf 4 en meerder jaaren agterb'yven, en somtydstwee jaar en langer blyven heerschen, en andere diergelyke aanstekende ziekten.

Tot de Derde Classe brengen wy de *Morbi Endemii*, de Landziekten, die altoos aanwezig zyn,

zyn, en veele inwoonders aanhoudend min of meer aandoen, gelyk zyn de scorbutike Ziekten, insgelyks mag men onder deze ook nog wel tellen de *morbi rheumatici, arthritici chronici*, die hier te lande zo aanhoudend plaats hebben, dat men door alle jaargetyden heen min of meerder klagten hoort, die men daar aan mag toefchryven; de zinkingaartige ziekten in onze Provintie zo menigvuldig zynde doen ons genoegzaam befluiten dezelve onder deze clasfe te rangfchikken.

De vierde Clasfe eindelyk behelst de *morbi sporadici* of *intercurrentes*, tusfenkoomende Ziekten, welke meestal deelen in den aard der ziekten der jaargetyden, der heerschende Epidemie, of wel der landziekten, doende alleenlyk enkele perfoonen of huysgezinnen aan, en dikwyls van byzondere oorzaaken afhangende, die alleen betrekking tot die perfoonen hebben, als woonplaats, beroep, of byzondere misflagen in de levenswyze begaan.

In de geneeswyze der Ziekten hebben wy zoveel moogelyk in het oog gehouden nategaan, wat de Natuur zelve tot herftelling der Lyderen vermogt, terwyl wy den leefreegel, en geneesmiddelen daarna hebben ingerigt, welke wy met derzelver clasficale naamen hier maar alleenlyk zullen aanroeren, ten waaren 'er eenige byzondere by uytftek algemeen voldaan hebbende; nadere opmerking vereifchten.

Verder komt het ons ook nog voor, om in het opgeeven der ziekten en derzelver naamen zo veel gelykheid als mooglyk is te houden, die ziekten vooral, waaromtrent dikwyls

4 *Waarneemingen omtrent de Lugtgesteldheid*

de grootste verwarring plaats heeft, gelyk de koortfen, de eenvoudigste weg, die ons de beste en gemakkelykste toefchynd, in te moeten slaan; dezelve noemende na derzelver duurzaamheid of tyd, zullende die verdeelen in *ephemeræ*, *febres continuæ*, *remittentes*, *intermittentes*, daarby voegende derzelver complication.

Nog zullen wy op het einde van het Jaar eenige *corollaria* uit het aangeteekende tragten optemaaken, het zy tot bevestiging van het geen voornaame Mannen in de kunst gezegt hebben, of waarin eenig nut omtrend de nadere kennis en geneezing der ziekten van ons Vaderland te vinden is.

Eindelyk zullen wy, volgens gewoonte voor yder Maand de Meteorologifche Waarneeminge voegen, terwyl wy insgelyks het getal der dooden zullen aantekenen.

Zeer gaarne hadden wy gewenscht zodanige weerkundige aantekeningen medetedeelen, als alhier in 's-Gravenhaage genoomen waaren; dog daar 'er tot nog toe niemand was, die deeze moeite opzig nam, hebben wy ons voor dit Jaar bediend van die aantekeningen, die te Haarlem gehouden, en in de algemeene Kunst- en Letterbode worden medegedeeld, terwyl wy in het vervolg de waarneemingen alhier gedaan, en waarmede met het begin van dit lopende Jaar een aanvang is gemaakt, melden zullen.

January.

De hoogste Thermometer den 31. 46½ gr.

De laagste ——— den 6 en 7 'smorgens, en den 9 'smorgens en s'avonds 23 gr.

De gemiddelde hoogte, ogtend, middag, en avond 33½ gr.

De hoogste Barometer den 21. 'savonds 30 d. 6 l.

De laagste ——— den 25. s'avonds ten 6 uren 28 d. 4½ l.

Het gevallen water 24 lyn. het uitgewaasfemde 8 lynen.

De heerschende winden waaren van den 1 tot den 11 O. NO. en ZO. Van den 12 tot den 31 W. ZW. en NW.

Maar twee geheel heldere daagen leeverde deze Maand, den 1ste namentlyk en den 6., meestal was het weder dampig en vogtig.

Het getal der dooden was 252, waarvan 128 van het mannelyke en 124 van het vrouwelyke geslacht; de Jaaren der Overleedenen zyn:

Beneden een Jaar	42	van 50 tot 55 Jaar	6
van 1 tot 5 Jaar	86	— 55 — 60 —	5
— 5 — 10 —	33	— 60 — 65 —	8
— 10 — 15 —	10	— 65 — 70 —	9
— 15 — 20 —	0	— 70 — 75 —	10
— 20 — 25 —	3	— 75 — 80 —	9
— 25 — 30 —	1	— 80 — 85 —	8
— 30 — 35 —	3	— 85 — 90 —	6
— 35 — 40 —	4	— 90 — 95 —	1
— 40 — 45 —	5	—————	
— 45 — 50 —	3		

252

A 3

I.

I. *Ziekten der Jaargetyden.*

Schoon January een voornaame Wintermaand, is, was zy egter vry zagt, en van de 12^{de} tot het einde toe over het algemeen vogtig door de aanhoudende W. ZW. en NW. winden, en dus meer overeenkomstig met het begin der lente, waardoor de koortsen, die nogtans niet menigvuldig waaren; nog dodelyk (blykende uyt de steifylsten, dat 'er maar 11 menschen onder een getal van 252 aan koortsen gestorven zyn) meestal bestonden in zuyvere *tertianæ*, die na weinige aanvallen wegbleeven; men ontmoete ook eenige *tertianæ duplices*, die of zodanige van den beginnen waaren of daar in overgingen, als de *tertianæ* na vier of vyf aanvallen niet verminderden of agterbleeven: Verscheiden Lyders herstelden van deze koortsen door sterk zweeten, zonder eenige geneesmiddelen te gebruyken, alleenlyk door veel te drinken en zig warm te houden; By zommigen, vooral jonge sterke menschen had men wel eens noodig een aderlaating in het werk te stellen, wordende het bloed altoos wat ontflooken bevonden; de geneesmiddelen, die voldoende waaren, bestonden in *diluentia*, *diaphoretica antiphlogistica*; zomtyds met zachte *laxantia* vereenigd, als de tong zeer beflagten was, en 'er geen daagelyksche ontlastingen kwaamen: by zwakke of bejaarde lyders, als na zeven of agt aanvallen de koorts niet veel verminderd was, moest men den koorsbast toedienen, die dan ook zeer goede uitwerking had.

II. Algemeen heerschende Ziekten.

In dezen maand heerschte de Kinderziekte nog veel heeviger dan in de voorgaande maand; zynde het getal der daaraan gestorvene volgens de sterflysten 119 perfoonen; dan dit groot getal is ons voorgekomen niet zo zeer veroorzaakt te zyn door de buitengewoone kwaadaartigheid der ziekte, als wel door het groot getal, dat door dezelve te gelyk wierd aangetast; want onder onze behandeling reekenen wy van de 10 Lyders één te zyn gestorven; en zo dit in het algemeen heeft plaats gehad, het geen waarschynlyk is, dan zoude in deze Maand 1190 perfoonen door deze ziekte zyn aangetast, en indien men nu verder het getal der inwoonderen van dezen Plaats steld te zyn 36000 Menschen, dan kan men reekenen dat $\frac{1}{30}$ gedeelte der ingezetenen in deeze Maand de kinderziekte gehad heeft: byna algemeen waaren de *variola* verzelt van zinkingaartige toevallen, als *tusses* *ophthalmiae*, en *anginae catharrales*, *dolores vagi*, en diergelyke meer; weinige lyders bleeven ook bevryd van pokjes in de keel of mond, het geen verscheide jonge en zuigende kinderen het leeven koste; die geenen, welken men de ziekte door inenting had toegebracht, kreegen ook meest pokjes in de keel, en waaren over het algemeen volder met uitslag als gewoonlyk by de Ingeënten plaats heeft.

In de geneeswyze der pokjes, zo in de za-

8. Waarneemingen omtrent de Lugtgesteldheid

menvloeiende als anderen, was vooral nodig het oog te houden op derzelver complicatie met de zinkingaartige gesteldheid zo in den te houden leefregel, als in het toedienen van geneesmiddelen; zynde vooral min of meer na de onderscheiden temperamenten der lyderen een *curatio antiphlogistica* het meeste dienstig; hoewel weinige eene aderlating nodig hadden, in het algemeen waaren de *diaphoretica refrigerantia*, *clysmata* en *vesicatoria* of *epispastica* de meest vereischt wordende hulpmiddelen.

De *febris secundaria* was zelfs by de goedaartigste pokjes zeer gemeen, en eindigde in eene overvloedige en heilzame uitwaaseming; het geen ons voorkomt meer een scheiding der zinkingaartige ziekte stoffe te zyn geweest, als wel der pokjes zelve; De meeste, by welken op het einde der ziekte, als de pokjes in het aangezicht byna opgedroogt waaren, zodanig eene meerdere uitwaaseming niet volgde, wierden naderhand gemeenlyk door langdurige naapokken aangetast, vermits op de handen en voeten veel niet volkoomen de ettermaking volbrachten, maar meestal plat wierden, en schielyk droogden en afvielen. Onder zo een sterke epidemie was het niet te verwonderen, dat men *variola maligna*, *anomala* waarnam; deeze waren, zeer kwaadaartig en de meeste lyderen wierden 'er het slagoffer van, de hevigste toevallen verzelden de uitbotting, op den tweeden dag derzelver hebben wy in eenige reeds *gangreneuse* vlekken aan den hals, en voornamentlyk in de keel gewaar geworden, naar de beroemste en bes-

beste geneesmiddelen, als *vinum rhenanum*, *cortex peruv.* *antimonialia*, *camphora* en het *acidum vitriolicum* in ruyme mate, vroegtydig en op verschillende wyze in het werk gesteld, niet luisterende, en op den 7 of 8 dag de smerte der lyderen door een zachte dood doende eindigen. By die geenen welke jong waaren, en sterke kragten hadden, wierden door de zoo bovengenoemde middelen ook zomwylen zichtbaare goede uitwerksfels voortgebracht, schoon zy egter meestal huune volkoomen herstelling niet bekwaamen, zonder door menigvuldige napokken lang en pynlyk gekweld te worden.

In deze Maand wierden 'er ook Maafelen, en Roodvonk gevonden, die egter vry regelmatig aflieden; uit de Sterflyften blykt het, dat 'er vyf aan de Maafelen gestorven zyn, en vier aan het Roodvonk; hoewel de opgaave dezer ziekten zo naauwkeurig niet is, als in de Pokjes, om dat deze byde dikwyls verward worden.

Verder moeten wy nog aanmerken, dat van wegen de zinkingaartige gesteldheid, die deze maand over het algemeen plaats had, de Lyderen vry warm moesten gehouden worden, en niet eerder toegestaan, zig buiten 's huis te begeeven. voor dat de opperhuid volkomen was afgeschilfert, en de uitwaasfening geheel hersteld was; anderzints was het zeer alg meen, dat 'er een geheele opzwellling of *anasarca* volgde. met eene opzetting en verstopping der *glandulae parotides*. en halsklieren, even als in de *schrophuleuse* ongemakken; eenige Lyderen zyn daaraan gestorven, dog de meeste hersteld.

den nog al vry ſpoedig onder het gebruik van zagt ontlaſtende en piſdryvende middelen; veel dienst heeft hier gedaan het *oxymell squilliticum* en de *ſpiritus Mindereri*.

III. *Landziekten.*

De Lyders zynde meestal ſcorbutique en Jigtagtige menſchen, klaagden gemeenlyk ſterk over hevige pynen; de *podagrici* en *arthritici* kreegen ook eenige aanvallen, dog vooral waaren dezelve vereenigt met plaatselyke zinkinaartige pynen, als *angina*, en *odontalgia catharrales*, die vry algemeen, vooral de kwaadſappigen aandeeden, de blaartrekkende middelen kwaamen dan vooral te ſtade, en bragten menigmaal een ſpoedige verligting aan.

Insgelyks voldeeden alle geneesmiddelen en ſpyzen, wier aart en werking verdunnende en verkoelende was; en in het algemeen waaren deze ziekten niet gevaarlyk, hoewel langduurig.

IV. *Tuſſchenkomende Ziekten.*

In deze Maand kan men onder dezelve aanmerken, dat eenige vooral bejaarde menſchen klaagden over een blaasagtigen uitſlag beſtaande uit kleine puistjens met eene hevige jeukte verzeld,

zeld, zonder eenige andere daarby komende ongesteldheid, even als de *scabies*, dog zonder eenige besmetting, deszelfs oorsprong scheen voornamentlyk te ontstaan uyt den gewoone leefregel in dit jaargetyde, vermits door daagelyks gebruik van zagte *purgantia* of *emetica per epicrasin* deze ziekte spoedig en gemakke-lyk geneesen wierd.



February.

Hoogste Thermometer den 23ste s'mor. 53 gr.
 Laagste ————— den 6^e s'avonds 28½ gr.
 De gemiddelde hoogte oggend, middag, avond
 42½ gr.

Hoogste Baromeeter den 29ste s'av. 30 d. 3½ l.
 Laagste ————— 15^e s'middags 29 d. 4½ l.
 Het gevallen water 30 lyn. uitgewaasemd 10 l.
 De heerschende winden waaren.

Van den 1sten tot den 6den ZO.

Van den 7den tot den 17den W. ZW. NW.

Den 18de N. NO. en den 19 tot den 22sten
 O. ZO.

Van den 23sten tot den 28sten WZW. NW.

Van den 1sten tot den 4den helder.

Den 5den mist.

— 6den helder.

— 7 tot den 11de betrokken.

Den 12de tot den 28ste betrokken, wind en
 regen, enkele avonden stil.

Het getal der dooden was 221 waarvan 113
 van het mannelyken en 108 van het vrouwe-
 lyke geslacht; de jaaren der overleedenen zyn.

Beneden een Jaar 32									
van	I	tot	5	Jaar 93	van	50	tot	55	Jaar 2
—	5	—	10	— 22	—	55	—	60	— 1
—	10	—	15	— 5	—	60	—	65	— 4
—	15	—	20	— 5	—	65	—	70	— 10
—	20	—	25	— 4	—	70	—	75	— 7
—	25	—	30	— 4	—	75	—	80	— 11
—	30	—	35	— 3	—	80	—	85	— 3
—	35	—	40	— 3	—	85	—	90	— 2
—	40	—	45	— 5	—	90	—	95	— 1
—	45	—	50	— 1					

221
 1.

I. Ziekten der Jaargetyden.

De anderendaagsche Koortfen (*febres tertianæ vernaes*) waaren meerder in getal als in de vorige Maand, hoewel men egter niet zeggen kan, dat ze algemeen heerfchten of kwaadaartig waaren; zynde 'er onder het getal van 221 gestorvene maar 7 aan Koortfen overleeden: fterk waaren zy wederom verbonden met zinkingagtige toevallen, vooral plaatselyke pynen, verfcheide Lyders kreegen eene *febris remittens* of ook een *febris tertiana duplicata*, met een fterke verheffing tegen den avond, en met hevige pynen door armen en voeten, een harde gespannen pols, een brandige *urin* zonder afzetzel, en een hevige dorst gingen hier meede verzel, waarna een fterk zweeten volgde, die hoe fterker, hoe beeter was; uit deeze teekenen bleek dus duidelyk, dat deeze koortfen fterker met het inflammatoire gecompliceert waaren, als in de vorige Maand, waardoor ook by jonge fterke menfchen een aderlating nodig was, zynde hnn bloed zeer ontftooken.

De algemeene geneeswyze dezer ziekten was *antiphlogiftiefch*, zagte *laxantia* deden daarby nut, terwyl fterker *purgantia*, of *emetico-cathartica* meefstal nadeelig waaren, maakende deze koortfen langduuriger, en de lyders verzwakkende, waardoor men dan op het laast zyn toevlugt tot den koortfbast ter herftelling neemen moest.

II. *Algemeen Heerschende Ziekten.*

De *Variolæ* waaren veel slegter van aard als in de vorige maand, en over het geheel genoomen, na het getal der Lyderen meer *malignæ*, en *anomalaë*; zo dat daaraan 117 overleeden zyn: Integendeel waaren de Maaselen goedaartig, schoon het getal der Lyders vermeerderd was, zynde 'er maar 4 aan gestorven, insgelyks zag men nog hier en daar Roodvonk, waaraan egter volgens de sterfelyst geen overleeden zyn. In zommige hebben wy tegelyk de Kinderziekte en Mazelen zien plaats hebben: Een kind wierd van de Mazelen vry sterk aangetast, die zeer gereegeld hun loop hielden, uitgezonderd dat de koorts bestendig by bleef, op den vierden dag na de uitboting der Maazelen, kwaamen 'er op en tuschen de vlekjes *variolæ discretaë*; de koorts verminderde, en bleef eindelyk geheel afwezig; van beide de ziekten herstelde het kind voorspoedig. — Het was nog zeer gemeen dat 'er zwelling der klieren ontstond by die geenen, welke zig te vroeg aan de buitenlucht blootstelden. Insgelyks vermengden zig verscheiden zinkingaartige toevallen vooral hoesten, *anginaë*, *dolores vagi* by deze epidemische ziekten, gelyk by alle anderen.

De voornaame indicatien, waarop in deze ziekten moest gelet worden, indien dezelve regelmatig voortgingen; waaren.

1^o. Zo in de levensregel als geneesmiddelen,
die

die men verkoelende noemt, en die de *transpiratione* bevorderden, om daardoor het inflammatoire, dat met het zinkingagtige gecompliceerd was, tegen te gaan, en de Natuur te helpen om het *miasma* na buiten te brengen, en de uitwaasfeming te herstellen.

2°. De *Actiones naturales* door *Eccoprotica* of *clysmata*, indien 'er geen dagelyksche ontlasting was, te bevorderen.

3°. De *Vires naturæ* spoedig te ondersteunen, vooral in het laatste tydperk, als de *febris secundaria* in de kinderziekte sterk was.

En zo nodig als het is, zo in de kinderziekten, als Maselen, en Roodvonk, de lyders van alle broeying en benauwdheid door warmte der vertrekken, en slaapplaatsen te bewaaren, te meer daar het seizoen zeer zagt was; was het egter in deze maand ook nodig wegens de vogtigheid der lugt; om dezelve zeer te bewaaren tegen het vroeg uytgaan, om de gevolgen voor te koomen hier booven aangeteekend.

III. Landziekten.

Scorbutici, arthritici, podagrici, en die aan *rheumatismi chronici* onderhevig waren, klaagden allen over pynen in de gewrigten zo van armen, als beenen, en veele hadden zwaarder aanvallen van pynen, dan gewoonlyk; het geen wy als een zeer natuurlyk gevolg van de algemeen heerschende zinkingaartige gesteldheid, die toen plaats had, houden, en waarin wy door het gebruik van dezelfde genceswyze bevestigd wierden.

IV. *Tussenkomende Ziekten.*

Onder dezen kan men stellen dat in deze maand enkele lieden klaagden over *vertigines* veroorzaakt door de uitzetting der vogten uyt hoofden van het wakke weder, *hemorrhagie narium*, *fluxus hæmorrhoidalis* verscheide miskraamen zag men uit dezelfde oorzaak geboren worden, en waarom een aderlaating by jonge en volbloedige menschen volstrekt nodig was zoo tot de herstelling als tot voorkooming van die toevallen, die door *congestiones sanguinis* veroorzaakt wierden.



Maart.

Hoogste Thermometer den 29 's morgens $63\frac{1}{2}$ gr.
 Laagste ————— den 21 's avonds $38\frac{1}{2}$ gr.
 Gemiddelde hoogte, oggend, middag, avond $47\frac{2}{3}$ gr.
 Hoogste Barometer den 21 's middags en 's avonds
 30 d. 5 l.

Laagste ————— den 11 's middags 29 d. $6\frac{1}{2}$ l.
 De heerschende winden waaren van den 1 tot 7 ZO. ZW.
 Van den 8 tot den 19 O. NO., ZO., ZW.
 Van den 20 tot 28 NW. NO. en O.
 Van den 29 tot 31 ZO. ZW. en W.
 Van den 1 tot den 8 bewolkt, betrokken en ree-

gen.
 Den 9 en 10 helder, s' avonds bewolkt.
 Van den 11 tot den 17 reegen en wind.
 Den 17 helder.
 Den 18 betrokken.
 Van den 19 tot 28 meest helder.
 Van den 29 tot 31 bewolkt en reegen.
 Het gevallen water was 27 lynen, uitgewaassend
 17 lynen.

Het getal der Dooden in dezen Maand was 157,
 waarvan 66 van het Mannelyke en 91 van het Vrou-
 welyke geslacht; de Jaaren der Overleedenen waaren

Beneden een Jaar	31	Van 45 Jaar tot 50 Jaar	1
Van 1 tot 5	59	50	55 — 3
— 5 — 10	14	55	60 — 5
— 10 — 15	2	60	65 — 4
— 15 — 20	1	65	70 — 5
— 20 — 25	2	70	75 — 3
— 25 — 30	1	75	80 — 9
— 30 — 35	2	80	85 — 3
— 35 — 40	6	85	90 — 3
— 40 — 45	2	90	95 — 1

I. Ziekten der Jaargetyden.

De Koortfen, die in deeze Maand meest voorkwaamen, waaren anderendaagsche Lentekoortfen *febres tertianæ vernaes* of *remit-tentes* min of meer met het *inflammatoire* verbonden, en waaren egter niet moeiljelyk te geneezen; en over het algemeen kan men zeggen, schoon deeze Maand meest winderige en guure daagen had, dat 'er weinig Zieken waaren; de winden waaren ook na het Jaargetyde niet zeer ongeftaadig, en de heerschende winden oostelyk, schoon 'er de geheele Maand geen vorst geweest is.

De sterflysten melden ook maar alleen van twee dooden aan Koortfen gestorven onder het getal van 157 Overleedenen, dat waarlyk zeer gering is; De geneeswyze bepaalde zig voornaamentlyk tot verkoelende en verdunnende middelen; aderlaatingen waaren nodig vooral by jonge menschen; sterke *purgantia* of *Emetico-cathartica* werden meestal nadeelig bevonden, en men kan zeggen, dat het meest *febres depuratoria* waaren, die de Natuur veroorzaakte tot herftelling vooral der *transpiratie*.

I. Algemeen Heerschende Ziekten.

Aan de Kinderziekte waaren veel minder Zieken, nogtans by de meeste Lyders veel
sleg-

slegter van aart, dan in de voorgaande Maand, zo dat 'er nog 63 Overleeden zyn, en wel na het getal onzer Zieken een van de zes gestorven is; byna de helft waaren *variola confluentes*, waaronder verscheiden *anomala* verzelt met *gangreneuse* blynen of blaazen, *variola siliquosa*, *vesiculosa* genaamt, waaraan de meesten voor den elfden dag der ziekte stierven. Onder alle bekende hulpmiddelen, die dikwils te vergeefs aangewend wierden, scheen het ons nu toe de tyd gebooren te zyn, om het bekende, wel eer zo veel gerugt gemaakt hebbende geneesmiddel van wylen den Med. Doct. J. J. VAN DEN BOSCH volgens de door zyn Ed. voorgeschreeven wyze te beproeven; en om alle naauwkeurigheid, en gelijkheid in het zamenstelzel dier middelen in agt te neemen, hadden de Heeren Stads Doctoren alle vyf de nommers der Poeders, zo als die in het uitgekoomen werkje beschreeven zyn onder hun opzigt in de Stads Apotheek in gereedheid doen brengen; ten einde alle de overige Doctoren de gelegenheid te verschaffen in voorkoomende gevallen daar van gebruyk te kunnen maaken.

Eenige Doctoren hebben ook met alle onpartydigheid, en getrouwheid zo alleen, als zomtyds met onderlinge adfistentie hunner Collegaas in verscheiden gevallen van den beginnen der ziekte in *confluente* pokjes de voorzeide poeders gebruykt, als ook by zuygende kinderen door de Moeders laten gebruyken volgens het voorschrift van den Heere VAN DEN BOSCH; dan volgens inge-

koomen berigten, en onze eigen ondervinding, vinden wy ons verplicht openhartig te moeten bekennen, niet te hebben kunnen gewaar worden, dat derzelver *specificq* en zo hoog verheeven vermoogen in het beteugelen der kwaadaartigheid der pokjes, aan die verwagting, welke men daarvan had opgevat, voldeed, en door den Heer VAN DEN BOSCH met zo menigvuldige gelukkige geneezingen scheen bevestigd te zyn; wel is waar, dat onder derzelver gebruyk Lyders hersteld zyn, dog de meesten zyn gestorven; ook schynd het vermoogen dat zy bezitten, voornaamentlyk te bestaan in het opwekken, en versterken der *vires vitales*; het geen uit de kragten der geneesmiddelen, waaruit die Poeders zamengesteld zyn, een ieder kennelyk is, als zodanig vermoogen te hebben, en daarvoor ten allen tyden bekend zyn geweest; waarom zy in gevallen, waar zulks vereischt word, ook kunnen gebruykt worden, ja reeds lange gebruykt zyn; hoewel wy zeekerder, en door de ondervinding meerder bevestigde proeven hebben, dat de *Cortex Peruvianus*, het *acidum vitrioli*, *vinum rhenanum* &c. verre te verkiezen zyn, daar de *indicatie* zodanige middelen vereischt; en vermits ons oogmerk by deze proefneemingen vooral geweest is te onderzoeken, of deze Poeders zodanig vermoogen hadden, als volgens de opgaaf daar aan is toegeschreeven; wenschen wy voorals nog hetzelfde eenmaal mooge ontdekt worden.

Roodvonk en Maaselen bleeven ook nog in
decze

deze Maand aanhouden, evenwel niet zeer menigvuldig, schoon 'er nog vyf aan deze byde Ziekten gestorven zyn; het gevaarlykste was de *angina*, die 'er zig byvoegde, anderfints liep de *eruptie* zeer regelmatig af.

In deze zowel als in de voorige Maand hebben wy waargenoomen, dat pokjes en maafelen in zommigen Lyders te gelyk plaats hadden, zomtyds verscheenen de maafelen voor de pokjes, zomtyds na de uitbotting derzelven met alle die zinkingaartige toevallen, die de maafelen eygen zyn, zelden heeft dit verschynfel het gevaar vermeerderd; ook merken wy nog op, dat de uitbotting der Maafelen meer verheevene puystjens, dan gewoonlyk, vertoonende den Geneesheer dikwils in den waan bragt, *variola confluentes* te zullen worden, dan den tweeden dag wierd hy van het tegendeel overtuigd, nogtans deed hem dit voorzigtig zyn in de voorspelling en uitspraak.

III. Landziekten.

Onder de weinige hier toe behoorende waaren 'er ligte *catarrhale* ziekten, en pynen, de meeste klagten hoorden men van zwakke, jigtige, en scorbutique Lyderen, evenwel betterden zy onder het gebruyk van behoorlyke middelen binnen weinige daagen, onder de *morbi chronici* wierden vooral die geenen, die aan Borstkwaalen zukkelden, zeer aangedaan, ook zyn 'er daar aan 16 gestorven.

IV. Tusschenkomende Ziekten.

Onder deezzen kan men aanmerken, dat 'er verscheiden klaagden over *ophthalmiæ inflammatorie*, *angina*, *hemorrhoides*, zwaarte in de ademhaaling, die allen spoedig herstelden door eene aderlaating, en zommigen door een *Purgans*.



April.

Hoogſte Thermomeeter den 23, 's midd. $74\frac{1}{2}$ gr.

Laagſte ————— den 1, 's avonds 36 gr.

De Gemiddelde hoogte, ogtend, middag, avond de
geheele Maand $54\frac{5}{8}$ gr.

Hoogſte Barometer den 25, 's middags 30 d. 5 lin.

Laagſte ————— den 4, 's morgens 29 d. $2\frac{3}{4}$ lin.

De heerſchende Winden waaren,

Van den 1 tot den 9 W. ZW. Z. ZO. O.

———— 10 ——— 13 NW. N. NO.

———— 14 ——— 16 W. ZW.

———— 17 ——— 19 NO. O. ZO.

———— 20 ——— 23 ZW. W. ZO. NO.

———— 24 ——— 30 ZW. ZO. W.

Van den 1 tot den 17 buyjig, reegen, wind, enkele
reizen haagel, eens donder, van den 18 tot den 28

meest helder, den 28 en 29 harde wind, betrokken.

Gevallen waater 30 Lynen, uytgewaaſemd 34 Lynen.

Het getal der dooden in deezen Maand was 117,

waarvan 51 van het Mannelyke, en 66 van het Vrou-

welyke geſlagt; de Jaaren der Overleedenen zyn

Beneden een Jaar 25 van 50 tot 55 Jaar 2

van 1 tot 5 Jaar 35 — 55 — 60 — 5

— 5 — 10 — 7 — 60 — 65 — 5

— 10 — 15 — 2 — 65 — 70 — 1

— 15 — 20 — 2 — 70 — 75 — 8

— 20 — 25 — 3 — 75 — 80 — 4

— 25 — 30 — 2 — 80 — 85 — 4

— 30 — 35 — 2 — 85 — 90 — 1

— 35 — 40 — 3 — 90 — 95 — 1

— 40 — 45 — 3 — —————

— 45 — 50 — 2

117.

I. Ziekten der Jaargetyden.

De buytengewoone, zachte, warme, en meest vogtige wêers gesteldheid in deeze Maand veroorzaakte eene sterke uitzetting der vogten, en de daar uit voortkoomende klagten, die meest afhingen van een *plethora ad vires*; de meeste koortsen waaren *intermittentes vernaes*, ook eenige *remittentes* en allen gecompliceerd met het *inflammatoire* by jonge menschen; ook wel by zeer slappe, en *phlegmatique* lyders met eene taaye slymige stoffe in de eerste weegen. Enkelde *febres continuæ inflammatoriae* wierden gezien by jonge sterke menschen, en hebben ook eenigen het leeven gekost. Onder 117 gestorvenen zyn 'er 8 aan onderscheiden koortsen overleeden. By den aanvang der ziekte wierden zommigen aangetast door neusbloeding, bloedende aambyjen, en verscheidene vrouwen door buitengewoone sterke stonden. De geneeswyze, die algemeen te staade kwam, moest *antiphlogistiesch* zyn, met die bepaaling egter, als nodig is na den onderscheiden ouderdom, gesteldheid, en kragten; aderlaatingen waaren over het algemeen nodig, gepaard met *diluentia resolventia* en *eccoprotica*. By *phlegmatique* lyders, die eene zeer slappe, schoon volle pols hadden, waaren de *salia neutra*, het *oxymel squilliticum* met *purgantia*, vooral de rhobarber, en senebladeren zeer dienstig: de braakwortel in kleine hoeveelheid by tusschenpoosen ingegeven, en dus meer als een *alterans*, dan *evacuans* dienende

nende voldeed, vooral by kinderen zeer wel. Op het einde der ziekte, als de koortsen op-
hielden, en de spysverteering zwak was, ver-
kreeg men better, en voorspoediger eene vol-
koomene herstelling door het *lignum quassia*,
de *radix helenii* op verschillende wyze voorge-
schreeven, als door den koortsbast, of andere
maagmiddelen.

II. Algemeen Heerschende Ziekten.

De kinderziekte bleef nog vry sterk aan-
houden, 37 lyders zyn daar aan overleeden,
schoon verre de meeste *variola discreta re-*
gulares waaren, na het getal onzer zieken is
er één van de tien gestorven.

De complicatie deezer ziekte met het zin-
kingaartige, was veel minder, als in de voori-
ge Maanden, dog des te meer was zy met het
inflammatoire vermengd, zo dat de geneeswy-
ze sterker verkoelende middelen vereischte,
en 'er ook wel eene aderlating nodig was,
vooral by de *febris secundaria*. De naapok-
ken waaren ook minder, de meesten, die ge-
storven zyn hadden zaamenvloeyende pokjes ge-
paard met eene hevige *febris inflammatoria*
continua, die op het laatst *gangrenosa* werd, en
voor den elfden dag gemeenlyk de lyders deed
sterven; het vitriool zuur na genoegzaame ader-
laatingen in eene zeer groote hoeveelheid zoo
voor gewoone drank met gersten waater ge-
dronken, als voor geneesmiddel gegeven, heeft
er nog enkelden behouden.

Weinig maafelen en roodvonk wierden 'er gezien, drie zyn 'er ook maar aan gestorven, want die 'er nog waaren, liepen goed en regelmaatig ten einde.

III. *Landziekten.*

Onder deeze classe telden wy eenige zinkingaartige koortsen onder jigtagtige gestellen; de teeringagtige, *asthmatici* en *hydropici* wierden meest zeer ziek aan *febres rheumatica*, zynde 'er wederom in deeze Maand 13 aan borstziekten overleeden.

IV. *Tusfenkomende Ziekten.*

Hier onder tellen wy eenige *morbi inflammatorii topici*, als *angina*, *vertigines*, *pleuroperipneumonia*, koortsagtige uitflag in het aangezicht, die allen het veiligste geneezen wierden door eene *antiphlogistique* geneeswyze.

Mey

Hoogſte Thermomeeter den 1 's middags 66 $\frac{1}{2}$ gr.
 Laagſte ————— den 2 's avonds 43 $\frac{1}{2}$ gr.
 De geheele maand, ogtend, middag en avond de
 gemiddelde hoogte 54 $\frac{11}{16}$ gr.

Hoogſte Barromeeter den 16 's avonds 30 d. 7 l.
 Laagſte ————— den 8 's avonds 29 d. 5 l.

De heerſchende winden waren den 1 Z. ZO.

Van den 2 tot den 9 NO. NW. N. W. ZW.

———— 10 ——— 23 Z. ZO. ZW. NW. W.

———— 24 ——— 31 N. NW. NO.

Van den 1 tot den 2 bewolkt, reegen, van den 3
 tot den 7 helder, winderig, van den 8 tot den 31
 wind, bewolkt, buyig, zomtyds omtrent helder.

Gevallen water 36 lynen, uytgewaaſemd 32 lynen,

Het getal der dooden in deeze Maand wes 120,
 waarvan 54 van het Mannelyke en 66 van het Vrou-
 welyke geſlagt, de Jaaren der Overleedenen waaren.

Beneden een jaar	27	Van 50 Jaar tot 55	Jaar 2
Van 1 tot 5	31	55	60 — 8
5 — 10	2	60	65 — 3
10 — 15	1	65	70 — 4
15 — 20	3	70	75 — 5
20 — 25	3	75	80 — 4
25 — 30	3	80	85 — 4
30 — 35	4	85	90 — 2
35 — 40	5	90	95 — 2
40 — 45	4	95	100 — 2
45 — 50	1		

120

1. Ziek:

I. *Ziekten der Jaargetyden.*

De koortfen in deezen Maand waaren meest anderendaagfche voorjaars koortfen, evenwel zo meenigvuldig niet, als in de voorige Maand en ook minder gecompliceerd met het *inflammatoire*, dog meerder met het *pituiteufe*: enkele lyders werden door eene *febris remittens* aangetast, verzeld met walging, en by zommigen met eene *diarrhaea*, die voordeelig was, en de koorts veel deed verminderen, of wel geheel ophouden. In het algemeen waaren de koortfen niet langduurig of gevaarlyk, onder de 120 overleedenen tellen wy ook maar twee aan koortfen gestorven. De geneeswyze, die het fchielykste, en beste voldeed, was in den beginnen een braakmiddel uit de *ipeacacoanha* toe te dienen, of wel een *purgans*, vervolgens *resolventia eccoprotica*, indien de stoelgang traag was, op deeze wyze herstelden veelen na drie of vier aanvallen der koorts; veel minder waaren de aderlaatingen noodig, als in de voorige Maand, en hadden alleen plaats by jonge, volbloedigen en sterke menschen.

II. *Algemeen Heerschende Ziekten.*

De pokjes waaren nog meenigvuldig, en veele zaamenvloeyende, die niet goedaartig waaren, gelyk uit de sterflyften blykt, dat
daar

daar aan nog 33. lyders gestorven zyn, en schoon de eerste tydperken regelmatig afliepen, wierd niet te min meenigmaal de *febris secundaria*, als de pokjes in het aangezigt begonnen op te droogen, zeer hevig, waardoor de kragten bezweeken, en de dood schielyk volgde, niet tegenstaande de sterkste *cardiaca* en *antiseptica* toegediend wierden. De Maa-zelen, en het Roodvonk waaren ook nog zeer algemeen, en veele volwassnen wierden door dezelve aangetast, schoon in het algemeen met eene gelukkige uitkomst, ook zyn aan dezelve maar twee lyders gestorven. De geneeswyze verschilde niet van de gewoone; alleenlyk was 'er dikwyls eene hoest by, die naa het eindigen der *eruptie* bleef aanhouden, en eene spoedige aderlaating nodig had; het *sulphur auratum antimonii* deed hier ook uitstekend veel dienst, om de *expectoratie* te bevorderen. Insgelyks was het ook wederom zeer algemeen by die geenen, welken te vroeg in de lucht kwaamen, eene geheele zwelling of *anasarca* te zien volgen, die egter door het gebruik van pisdryvende en ontlaitende middelen hersteld wierd.

III. Landziekten.

Onder de *morbi chronici* waaren de Borst-kwaalen het gevaarlykste, en veelen daar aan kwynende zieken stierven, vindende wy op de

sterf-

Sterflyste 17 overleedenen aangeteekend; oude lieden klaagden byna allen over verkoudheid, en hoesten zeer.

IV *Tussenkomende Ziekten.*

Onder deezen wierden zeer zinkingdaartige hoesten, ook *brónchi* vooral onder de kinderen gevonden en by zwakke vrouwen, de hoest vermeerderde altoos tegen den nagt, en beleete gemeenlyk den nagtrust, by veelen was zy zoo hardnekkig, dat men reeden had te vreezen, dat 'er eene *phthisis rheumatica* uit zoude voortkoomen; by de geneezing was in den beginnen wel dienstig *Expectorantia*, *resolventia* met *laxantia* toe te dienen, vooral de *sulphur auratum antimonii* en de *ipécatouanha* in kleine giften; dog als de hoest, niet tegenstaande derzelver gebruyk aanhield, of vermeerderde, werd dikwils met veel vrugt de gytenmelk gebruykt, en 'savonds een *anodynum* toegediend. Onder de zinkingaartige ongesteldheeden, ontmoete men by veelen eene *angina catarrhalis*, en *pleuritides spuriae*, spaanschevlieg-pleisters, zweetdryvende, en verdunnende middelen waaren de geschikste om deeze zieken te herstellen.

Juny.

Hoogſte Thermomeeter den 30 'savonds 79 $\frac{1}{2}$ gr.

Laagſte ————— den 9 'savonds 46 gr.

De geheele Maand. ogtend, middag, avond, de gemiddelde hoogte 61 $\frac{3}{8}$ gr.

Hoogſte Barromeeter den 28 'savonds 30 d. 4 $\frac{1}{2}$ l.

Laagſte ————— den 7 'smorgens 29 d. 0 $\frac{1}{2}$ l.

De heerſchende winden waaren van den 1 tot den 5 N. NW. NO. den 6 en 7 W. NW. ZW. den 8 en 9 W. NW. den 10 11 en 12 Z. ZW. W. den 13 NO. O. den 14 en 15 O. ZO. N. NW. van den 16 tot den 20 W. ZW. den 21 tot den 24 NW. NO. van den 25 tot den 29 W. NW. NO. den 30 O. ZO.

Van den 1 tot den 4 bewolkt betrokken, den 5 regenagtig, den 6 en 7 betrokken regenagtig, van den 8 tot den 12 helder, bewolkt betrokken, den 13 dampig, den 14 weerligt donder, den 16 en 17 betrokken dampig, den 18 en 19 betrokken, den 20 reegen, van den 21 tot den 23 bewolkt, betrokken, den 24 donder, reegenagtig, betrokken, den 25 en 26 bewolkt betrokken, van den 27 tot den 29 helder, den 30 weerligt bewolkt.

Her gevallen waater 16 lynen, uytgewaafemd 44 ln.

Het getal der dooden in deeze Maand was 96, waar van 43 van het mannelyke en 53 van het vrouwelyke geſlagt, de jaaren der Overleedenen waaren

Beneden een Jaar	22	Van 45	—	50	—	4
Van 1 tot 5	17.	—	50	—	55	3
— 5 — 10	6	—	55	—	60	3
— 10 — 15	1	—	60	—	65	1
— 15 — 20	1	—	65	—	70	6
— 20 — 25	5	—	70	—	75	7
— 25 — 30	2	—	75	—	80	5
— 30 — 35	1	—	80	—	85	5
— 35 — 40	1	—	85	—	90	0
— 40 — 45	4	—	90	—	95	2

96

[Ziek.]

I. *Ziekten der Jaargetyden.*

De ziekten in deeze Maand waren over het algemeen gecompliceert met het zinkingaartige, maar voornaamelyk, schoon deeze de eerste zomermaand is, reeds met het galagtige.

De Koortsen waaren *remittentes*, ook enkele *tertiana*, alle met hevige pynen zo in het hoofd, als in de Ledemaaten verbonden, ook by veelen met *colicq* pynen, vooral by de verheffing der koortsen; by veelen ging hier meede verzeld eene ligte Geelzugt, die by het verminderen der koorts ook wederom afnam, de *urin* was by het eindigen of verminderen der koorts ook zeer dik, en bezet met een galachtig en slymig bezinkzel, men kan egter niet zeggen, dat de ziekten in dezen maand veel, of kwaadaartig waaren, daar 'er volgens de Sterflysten maar 96 Lyders gestorven zyn, en daar onder vinden wy elf aan verschillende koortsen overleden aangetekend. Veele menschen die begonnen ziek te worden, kreegen een *cholera* of *diarrhaea*, in den beginnen wel met sterke buikpynen verzeld, dog eenmaal de ontlasting beginnende, het zy van zelfs, of door een ingenomen *purgans* hielden die op, en de Natuur ontlastede zig dus; deze kreegen geene koortsen, en herstelden spoedig zonder eenig kwaad gevolg; De geneeswyze, die het spoedigste verligting aanbragt, was in den beginnen by sterke lighaamen een aderlaating en daarna één, zomtyds twee, ja dikwerf dieemaal een braakmiddel uit de *Ipecacoanha*, ver-

vol-

volgens ontlastende middelen, vooral rhabarber, senebblaaderen, en manna, na genoegzaame zuivering der eerste weegen *resolventia*, en *diluentia*, om de uitwaaseming en waaterloozing te bevorderen, op het laatste vereenigd met eenige bittere maagmiddelen. Tot voedsel verkozen de lyders meestal zelfs groentens en vrugten, die doorgaans met smaak en verkwikking gebruykt werden.

II. Algemeen Heerschende Ziekten.

De kinderziekte bleef nog heerschen, dog verminderde zeer veel, 14 zyn 'er deeze Maand maar aan gestorven; over het algemeen waaren zy veel minder heevig en regelmaatiger, en hadden niets byzonders in de geneeswyze, als dat men de Lyders niet te schielijk in de lugt moest laten koomen, vermits anderzints de meesten in zinkingaartige ziekten vervielen.

Men vond ook nog Maazelen, en roodvonk, aan beide deeze ziekten zyn nog drie gestorven; insgelyks vertoonden zig ook bastaarpokjes, die alle regelmatig afliepen, en volgens de gewoone geneeswyze behandeld wierden.

III. Landziekten.

By de zinkingaartige ongemakken, waarover weder veele menschen klaagden, had byzonder plaats (gelyk ook nooit mist) dat *scorbutic*

arthritis, en *podagrica* heeviger pynen gevoelden en klaagden vooral over pynen in de gewrigten, zy moesten zig warm houden, en gebruikten met verligting middelen, die niet alleen de uitwaasfening bevorderden, maar ook zagte laxeermiddelen, om ruimer stoelgangen te verkrijgen. Veelen aan *Morbi chronici* onderhevig vooral *asthmatici*, *phthisici* klaagden sterk, en kreegen heevige koortsen, voor hun niet zelden doodelyk, zynde 'er ook 21 aan verschillende borstziekten gestorven.

IV *Tussienkomende Ziekten.*

Onder deezen waaren het meest voorkomende roosagtige uitslag, netelzugt, coliecq en maagpynen, en vooral hoofdpynen, en men konde na de temperamenten der Lyderen duidelyk zien, dat zommigen meerder met het galagtige, andere met het zinkingaartige verbonden waaren, maar meest min of meer met byde; spaansche vliegpleisters waaren in plaatselyke pynen volstrekt noodig, maar inwendig braak- en purgeermiddelen op verschillende wyze voorgeschreeven, voldeeden algemeen zeer wel, en verhinderden den verdere voortgang der ziekten vry schielyk.

July.

Hoogſte Thermomeeter den 13, 'smidd. 84 gr.
 Laagſte ————— den 25, 'savonds 58 gr.
 De geheele Maand ogtend, middag, avond, de Ge-
 middelde hoogte, $69\frac{13}{12}$ gr.

Hoogſte Baromeeter den 10, 30 d. 4 lin.

Laagſte ————— den 24, 29 d. $5\frac{1}{2}$ lin.

Hoogſte Hygromeeter 31 'smorgens 94.

Laagſte ————— 13 'smiddags 35.

Gemiddelde hoogte $6c\frac{44}{85}$ (*)

De heerſchende Winden waaren,

Van den 1 tot den 3 W. ZW.

———— 4 ——— 7 NO.

———— 8 ——— 13 W. NW. NO.

———— 14 ——— 31 W. ZW. ZO. O. NW.

Van den 1 tot den 18 helder, zomtyds wat bewolkt

Van den 19 tot den 22 wat regen, meeft bewolkt en winderig

Van den 23 tot 31 regen met zwaare wind, of bewolkt.

Het gevallen waater 11 Lynen, het uytgewaaſemd 49
 Lynen.

Het getal der dooden geduurende dezen Maand was 91
 waarvan 53 van het Mannelyke, en 38 van het Vrou-
 welyke geſlagt; de Jaaren der Overleedenen zyn

Beneden een Jaar 24 van 45 tot 50 Jaar 8

van 1 tot 5 Jaar 9 — 50 — 55 — 4

— 5 — 10 — 0 — 55 — 60 — 2

— 10 — 15 — 1 — 60 — 65 — 4

— 15 — 20 — 1 — 65 — 70 — 5

— 20 — 25 — 0 — 70 — 75 — 6

— 25 — 30 — 2 — 75 — 80 — 6

— 30 — 35 — 4 — 80 — 85 — 4

— 35 — 40 — 4 — 85 — 90 — 2

— 40 — 45 — 4 — 90 — 95 — 1

91

(*) Daar wy dit Jaar van de weerkundige aanteeke-
 ningen uit de algemeene Konſt en Letterbode gebruik heb-
 ben gemaakt, om reeden hier boven reeds opgegeeven,
 hebben wy gemeend hier inſgelyks te moeten invoegen de
 ſtand der droogte of vogtigheid des dampkrings, waar-
 mede in deeze Maand in de Letterbode eerſt eene aan-
 vang is gemaakt.

I. Ziekten der Jaargetyden.

Alle de koortfen, die in deeze maand voorkwaamen, waaren veel meerder gecompliceerd met het galagtige, als in de voorige maand, men vond anderendaagfche, dubbelde anderendaagfche, en afgaande koortfen. Het getal der zieken was wel niet mee igvuldig, maar nogtans wierden veelen zwaar ziek, vooral by wien in den beginnen verzuimd was de eerfte weegente ontlaften; na het getal der overleedenen zynde 91, zyn volgens de fterflyst 13 Lyders aan onderscheide koortfen geflorven. Hoe duyde-lyk het ook bleek, dat de geneefwyze hoe eerder hoe beeter vorderde braakmiddelen te geeven, en daarna purgeermiddelen met ontbindende vereenigt, zo voldeeden nogtans het befte *Emetico-cathartica* en wel by voorkeur de *rhabarber* met *ipecacanha* vermengt en by tuffchenpoozen ingegeeven, tot dat de ontlaftingen eenen zichtbaare vermindering en verzagting in de koortfen-gemaakt hadden; maar bezweeken in teegendeel de kragten, begon de bnyk te zwellen, openbaarde zig de fprouw, of ver- toonden zig ftuypaetige beweegingen, dan moest men fchielyk veranderen, en *cardiaca antifeptica* toedienen zo wel met *nutrientia* als den *cortex peruvianus*, rhynefche wyn en diergelyken vereenigd. Het te laat in het werk ftellen deezer middelen, of ook dikwyls het onvermoo- gen der lyders om het noodige te bekoomen, heeft veelen derzelven het leeven gekoft, want de befte geneefmiddelen, indien zy niet met eene overeenkomftige leefensreegel, oppaffing, ry-
ni-

niging, en verfrissing der vertrekken kan gepaard gaan, zyn op zig zelve vrugteloos, het geen de Geneesheeren by den gemeenen man, en Stads armen tot hun leetweezen maar te veel onder vinden.

II. Algemeen heerschende Ziekten.

De pokjes verminderden sterk in getal, waarschijnlijk om dat de voorwerpen, die voor de besmetting vatbaar waaren, veel minder wierden, zy egter die de ziekten kreegen, hadden dezelve vry zwaar, en kreegen meest famenvloeyende, agt lyders zyn daar aan gestorven, en de meesten hebben sterke, en langduurige napokken gehad. Het was noodzaakelyk in den geheelen loop der pokjes, maar vooral in het laatste tydperk de complicatie van het heerschende gaagtige wel in het oog te houden, de *rhabarber* met *ippecacoanha* vermengt in kleine giften na de jaaren geëevenreedigd ingenoomen, was zeer voldoende, als ook het *vinum emeticum Huxhami* by droppels om de twee uur gebruykt tot dat het zyn werking na booven of onderen deed, voldeed zeer wel, en gaf eene goede verligting. In de loop der ziekte voor het overige had niets byzonders plaats; na de omstandigheid moest gehandeld worden; indien het soort slegt was, werd een *curatio antiseptica* vereischt, moettende zy eeven als rotkoortsen behandeld worden. Maaselen en roodvonk wierden weinig meer gezien, een is daar aan volgens de sterflyst overleeden,

III. *Landziekten.*

Hier omtrend hebben wy niet anders aanteteekenen, als dat zwakke *scorbutique* en *hypochondrique* menschen zeer klaagden over slapheid en buitengewoon lusteloos en slaapagtig waaren; enkele zinkingaartige toevallen wierden ook hier en daar gezien.

IV. *Tusfenkomende Ziekten.*

Onder deezen stellen wy, dat verscheyden goedaartige galagtige buykloopen, bloedstuwingen, slegte spysverteering, misfelykheid, stuipen onder de kinderen, maagpynen, boorten, drooge oogontsteekingen, en duyzeling by veelen gevonden wierden: bloedryke gestellen hadden eene aderlating nodig, en zagte ontlastmiddelen, andere lyders van een gal of slymagtig gestel wierden door braak of sterker purgeermiddelen binnen weinige dagen hersteld, ten zy 'er koortsen zig byvoegden; die dan verder moesten behandeld worden, en gelyk waaren aan die ziekten, welke in de eerste afdeeling beschreeven zyn.

Augustus.

Hoogste Thermomeeter den 17 'smiddags 74 $\frac{1}{2}$ gr.
 Laagste ————— den 13 'savonds 52 gr.
 Gemiddelde hoogte, ogtend, middag en avond de
 63 $\frac{23}{32}$ gr.

Hoogste Baromeeter den 16 'savonds 30 d. 2 $\frac{3}{4}$ l.

Laagste ————— den 4 'smorgens 29 d. 5 $\frac{3}{4}$ l.

Hoogste Hygromeeter den 1 'smorgens 94

Laagste ————— den 16 'smiddags 42 $\frac{1}{2}$

De geheele maand ogtend, middag, avond gemiddelde
 hoogte 67 $\frac{22}{32}$

De heerschende winden waren

Van den 1 tot den 13 Z. ZW. W. NW.

Van den 14 tot den 17 NO. O. ZO.

Den 18 Z. ZW.

Van den 19 tot den 22 N. NO. NW.

———— 23 ——— 31 ZW. ZO. W. Z.

Van den 1 tot den 15 zwaare reegen, buijig, harde
 wind. Van den 16 tot den 18 helder. Van den 29
 tot den 31 betrokken, reegen en bewolkt.

Gevallen water 48 lynen, uytgewaasfemd 34 lynen.

Het getal der dooden in deeze Maand wes 98
 waarvan 52 van het Mannelyke en 46 van het Vrou-
 welyke geslagt, de Jaaren der Overleedenen waaren.

Beneden een jaar	23	Van 45 Jaar tot 50 Jaar	1
Van 1 tot 5	14	50	55
5 — 10	5	55	60
10 — 15	0	60	65
15 — 20	4	65	70
20 — 25	3	70	75
25 — 30	3	75	80
30 — 35	5	80	85
35 — 40	2	85	90
40 — 45	4	90	95

I. Ziekten der Jaargetyden.

De koortsen, zo anderendaagsche, als remitteerende waaren meerder in getal, als in de vorige Maand, en allen hadden reeds het sterkste bewys der Najaarsziekten, als zynde gecompliceerd met een *saburra biliosa* zo in de maag als darmen; weinige nogtans liepen tot die hoogte, dat men ze kwaadaartige of rotkoortsen zouden kunnen noemen, schoon veele geneesheeren al vry spoedig hun daar meede bestempelen, en zeeker by die geenen, die daar aan sterven, op het einde zodanig worden, als een algemeen verderfder vogten daar meede gepaard gaat, dan zo lange de kwaade stoffe zig in de eerste weegen bepaald, gelyk meestal in deeze Maand het geval was, kan men ze geen rotkoortsen noemen, maar zyn volstrekt Najaarskoortsen, uit eene ophooping van verdorven stoffe in de eerste weegen voortkoomende, die door spoedige ontlastingen zoo na booven als beneden in den beginnen meenigmaal op eens gestuid worden; het getal der dooden in deeze maand was ook niet buitengewoon, ook zyn 'er maar 9 aan onderscheiden koortsen gestorven. Het was vry algemeen in deeze remitteerende koortsen, dat zy van den beginnen af verzeld gingen met een *dysenteria* met sterke *tenesmi* en ook wel slymige met bloedvermengde afgangen en weinige drekstoffen, vooral had dit plaats by zwakke

ke menschen, ook by bejaarde, en kleine kinderen.

In de geneeswyze is ons voorgekoomen, dat purgeermiddelen uit rabarber met *magnesia*, of geringe giften van eenige greinen braakwortel by tusschenpoelen gegeven, het beste voldeeden, heeter als sterke *Emetico-cathartica*, en zwakke of gevoelige gestellen ondervonden 'er een groot nadeel door, zelfs veelen, hoe zeer de ontlastingen noodig scheenen te zyn om de eerste weegen te zuiveren, konden ze in het geheel niet verdraagen, met goed gevolg hebben deeze gebruikt om de *tenesmi* en *dysenteria* te herstellen, de *gummi arabicum* in ruyme maate in *mixtuur* toegediend en met de *syrupus papaveris albi* vereenigd, aderlatingen waaren hier zeer nadeelig.

II. Algemeen Heerschende Ziekten.

De pokjes verminderen zeer sterk, en die wy gezien hebben, waaren *discretæ benignæ*, volgens de sterflyst zyn 'er nog drie aan deeze ziekte gestorven; de maaselen vertoonden zig wat meerder als in de vorige maand, op de sterflyst vinden wy nog twee daaraan overleeden aangeteekend, wy hebben niets byzonders in den loop deezer ziekten opgemerkt; de weinige, die onder onze behandeling geweest zyn, liepen regelmatig af, waaren goedaartig en de lyders niet vol.

III. *Landziekten.*

Menschen die aan sleepende ziekten sukkelde, vooral jigtige, aamborstige, teeringagtige en waterzuchtige, klaagden zeer over zinkingpynen door alle de leeden: *scorbutici* kreegen veele roode en blaauwe vlekken op armen en beenen, volgens gewoonte klaagden zy eerst sterk over heevige pynen, voor het overige vond men weinige, en dan nog ligte zinkingaartige toevallen, volgens de sterfelyst zyn 'er aan onderscheiden borstziekten 13 lyders gestoryen.

IV. *Tusfenkomende Ziekten.*

Onder deeze kan men stellen, dat 'er veele *diarrhææ benignæ*, *dolores colici*, *stranguriæ*, *vertigines*, *Lumbagines*, en *cholera* gezien wierden; een jong sterk manspersoon op het oogenblik dat hy vry wel zynde meende uittegaan, werd onvoorziens door een *cholera* overvallen, wiens ontlastingen zo booven als onder zo heevig waaren, dat hy flauw werd, en na verloop van een uur zodaanig verzwakte, dat hy staan nog gaan konde, het aangezigt was geheel ingevallen met een koud zweet over het geheele lichaam, zoodaanig dat hy scheen te zullen bezwyken; door het gebruyk van eenige wyn wat bygekoomen zyn.

zynde, wierd hy verder geheel hersteld, door een *mixtuur* met de *gummi arabicum*, *saleb* en *Laudanum*; binnen 2 à 3 daagen begon hy weederom als vooren zyn werk te verrigten. Het was verder vry gemeen onder veele menschen van allerlei jaaren en geslagt klagten te hooren over eene jeukte, en prikkeling, en by zommigen ook, over eene puistagtige uytslag en roosagtige vlakken, voor het overige waaren zy zeer gezond, veelen kreegen een *diarhæa* en herstelden, andere die geen vrywillige ontlastingen kreegen wierden door herhaalde ontlastmiddelen ook spoedig beeter: maar oude bejaarde menschen klaagden lang, en raakten van de jeuking niet gemakkelyk vry; zommige vonden veel verligting door een aanhoudend gebruyk van de *magnesia*. Onder eenige Lyders, die door *vertigines* aangedaan wierden, waaren 'er zommigen zeer heevig, zo dat zy nedervielen, en voor een ogenblik als van een beroerte overvallen scheenen, nogtans niet geheel buyten kennis geraakten, en schielyk weederom byk waamen, hadden lang werk, eer zy daar geheel van bevryd bleeven, de oorzaak scheen meest in een *saburra* in de maag te ontstaan, waaraan braak en purgeermiddelen ook verligting gaaven; hoewel nogtans ook wel eene aderlaating noodig was, het bloed was een weinig geïnflammeert en de wey zeer galagtig. Enige lyders hebben op het laast een tyd lang met nut in den nek een dragt van de bast van *Garou* gedraagen, en zyn langzaamerhand hersteld onder het gebruyk van middelen die daaglyks een of tweemaal eenen stoelgang verwekten.

44 Waarneemingen omtrent de Lugtgesteldheid

September.

Hoogste Thermomeeter den 18 's middags $73\frac{1}{2}$ gr.

Laagste ————— den 6 's avonds 47 gr.

De geheele Maand. ogtend, middag, avond, de gemiddelde hoogte $59\frac{1}{2}$ gr.

Hoogste Baromeeter den 30, 30 d. $3\frac{1}{2}$ l.

Laagste ————— den 24 29 d. 4 l.

Hoogste Hygromeeter den 9 's morgens 91.

Laagste ————— den 16 's middags $59\frac{1}{2}$

De geheele Maand ogtend, middag, avond gemiddelde hoogte $70\frac{5}{8}$.

De heerschende winden waaren van den 1 tot den 2 N. NW. W. ZW. Den 3 en 4 N. NW. Den 5 tot den 10 O. ZO. NO. Den 11 tot den 14 NW. N. NO. Den 15 O. NO. Den 16 tot den 22 Z. ZW. Z. Den 23 en 24 Z. ZO. Den 25 tot den 30 W. NW. N. NO.

Van den 1 tot den 18 bewolkt, reegen, buyjig, betrokken. Van den 19 reegen, storm. Den 23 tot den 25 reegen, met weerligt en donder. Den 26 hagel en verder tot 30 betrokken en buyjig.

Hier gevallen waater 28 lynen, uytgewaasemd 19 ln.

Het getal der dooden in deeze Maand was 34, waar van 41 van het mannelyke en 43 van het vrouwelyke geslagt, de jaaren der Overleedenen waaren

Beneden een Jaar	21	Van	45	—	50	—	3
Van 1 tot 5	7	—	50	—	55	—	3
— 5 — 10	1	—	55	—	60	—	4
— 10 — 15	0	—	60	—	65	—	6
— 15 — 20	3	—	65	—	70	—	5
— 20 — 25	5	—	70	—	75	—	7
— 25 — 30	1	—	75	—	80	—	3
— 30 — 35	1	—	80	—	85	—	3
— 35 — 40	1	—	85	—	90	—	0
— 40 — 45	5	—	90	—	95	—	1

I. Ziekten der Jaargetyden.

De ziekten in deeze Maand behielden volkomen de kenmerken der Herfstziekten, en waaren verzeld met die *symptomata*, die men gelyk in de voorige Maand *gastrica* en *biliosa* noemt, over het geheel waaren 'er niet zeer veele zieken, de meesten *febres remittentes* meestal met eene roosagtige uitslag en zwelling van het aangezicht verzeld, of met een *diarrhœa*, zomniige met zwaare pynen, *tenesmi* en eenig bloed vermengd, en die men even als in de voorige maand zoude kunnen noemen een *dysenteria benigna*: Insgelyks waaren 'er ook *cholera* en *diarrhœa* zonder koortsen, en die spoedig herstelden. Men zag ook anderen-daagsche koortsen, die in het begin verzeld waaren met walgingen, en braakingen; de *symptomata gastrica* als beslaagen tong, benaauwdheeden en opzettingen in den onderbuik, geelzugige oogen, een hooggekleurde *urin* met een geelagtig bezinkzel, waaren vry algemeene verschynzels by allen die de koorts hadden; op de sterflysten vinden wy 8 aan koortsen overleeden aangeteekend, waarfschynlyk kunnen die tot de Najaarsziekten gebragt worden: de natuur wees hier zeer duidelyk den weg ter geneezing, want die een *cholera* of *diarrhœa* kreegen, waaren zonder eenige gevolgen spoedig hersteld, dikwyls zonder eenige geneesmiddelen, of door een ontlastmiddel uit de rhabarber, of een braakmiddel uit de *Ipecacoanha*. Het was derhalven natuurlyk

lyk, en het voldeed ook aan alle de indicatien met onderscheid na jaaren, temperamenten, en kragten om de geneeswyze te beginnen met *purgantia* of *Emetica per epicrasin*, en daar mede aantehouden, tot dat de afgangeneenen natuurlyken consistentie kreegen en de koortsen verminderden; geviel het, dat de kragten gevaar liepen van te bezwyken als de koortsen te sterk aanhielden, al was het dat 'er nog *symptomata saburrae* aanwezig waaren, dan was de kina met sterke *nutrientia acida* het middel, daar het beste staat op kon gemaakt worden, en zelden miste, als het in genoegzaame hoeveelheid gegeven wierd; de beste wyze, als 'er schielyke werking vereischt word, om haar toe te dienen komt ons voor te zyn, dezelve in substantie te geeven, ook gelooven wy de roode Kina boven de gewoone te verkiezen is.

II. *Algemeen heerschende Ziekten*

Pokjes hebben wy deezen Maand niet ontmoed, maar nog eenig roodvonk, en mazzelen, waaraan volgens de sterflysten geenen gestorven zyn, en dus zeer goedaartig, schoon die lyders, welken wy behandeld hebben, zeer vol waaren, en zwaare koortsen hadden, voor de *eruptie*, verzeld met verscheide *symptomata saburralia* als *diarrhœa*, braaken, vuile tong en smaak, waar uit ten duydelykste bleek dat deeze ziekten met die der jaargetyden gecompliceerd waaren, en de lyders ook door pur-

purgeer en braakmiddelen moesten gezuiverd worden, waar door de herstelling nog al spoedig volgde, eenige hebben op het laast de kina noodig gehad tot wegneeming der koorts en vermeerdering der kragten; deeze koortsen begonnen het heevigste te worden den agtsten dag na de *eruptie* als de opperhuid reeds vry wel afschilferde.

III. Landziekten.

Onder deezen zyn ons voorgekoomen eenige kinderen, die vuile scorbutique zweeren in den mond kreegen; welke men wel eens waaterkanker noemd, allen wierden met de *mel rosarum* en *spiritus salis marini* geneezen; by een kind was reeds de geheele onderlip, uytgezonderd de twee hoekeinden in den tyd van 14 daagen geheel weggevreeten, nadien de ouders zig al dien tyd met huysmiddelen, en raadgeevingen van minkundige ophoudende, niet eerder hulp ter redding kwaamen vraagen, en schoon dezweer door het voorzeide middel wel tot staan was gebragd, zig niet meer verspreide en zuyver wierd, is egter het kind door eene geheele *cachymia scorbutica* aangetast zynde aan daarby koomende koortsen gestorven.

IV. Tusfenkomende Ziekten.

De ziekten die men hiertoe brengen kan,
waaren

waaren van dien aard, dat ze meest het gevolg waaren van het nog aanhoudend draagen van dunne zoomerkleederen, want verscheiden daagen was het weer zeer veranderlyk en zommige zeer guur en nat; en schoon men het zinkingaartige ongemakken kan noemen, waaren zy egter niet menigvuldig, verscheiden kreegen hier door plaatselyke pynen, zommigen een *pleuritis*, *peripneumonia notha*, *bronchus* en *dolores colici*.

Door het gebruyk van zweetdryvende middelen gepaart met vermeidig der buyten lugt en het verdikken der kleederen, vooral by die geenen, welke zulken gewoon waaren, herstelden deze Lyders vry spoedig; en het is algemeen zeker dat in plaatselyke zinkingpynen de spaansche vliegpleisters het beste en spoedigste geneesmiddel zyn, en om deze eenige dagen, ja weken open te houden en sterk te doen loopen, hebben wy altoos zeer voldoende bevonden om daagelyks een stukje van de bast van *Garou* op de plaats te leggen, daar de spaansche vliegpleister is weggenoomen.

October.

Hoogste Thermomeeter den 11, 's midd. 66 gr.
 Laagste ————— den 25, 'smorgens 38 gr.
 De geheele Maand ogtend, middag, avond de Ge-
 middelde hoogte, 51 $\frac{1}{2}$ gr.
 Hoogste Baromeeter den 21 's middags 30 d. 3 $\frac{1}{2}$ lin.
 Laagste ————— den 8, 'smorgens 28 d. 9 $\frac{1}{2}$ lin.
 Hoogste Hygromeeter den 25 'smorgens 100 $\frac{1}{2}$.
 Laagste ————— den 2 's middags 56.
 De geheele Maand ogtend, middag, avond, gemiddel-
 de hoogte 79 $\frac{1}{2}$.

De heerschende Winden waaren,

Den 1 en 2 Z. ZO.
 — 3 NO. O.
 — 4 tot den 9 W. NW. ZW.
 — 10 tot den 20 O. Z. ZW. W.
 — 21 NO.
 — 22 tot den 26 O. ZO. Z. NO.
 — 27 tot den 31 ZW. W. NW.

Den 1 betrokken. Den 2 helder. Den 3 dampig. Den 4 tot den
 19 regen, wind, buijig, betrokken. Den 20 helder. Den 21
 weder betrokken en tot den 31 dampig, regen en wind.
 Gevallen waater 63 Lynen, uitgewaasemd 15 llynen.

Het getal der dooden geduurende dezen Maand was 73
 waarvan 47 van het Mannelyke, en 26 van het Vrou-
 welyke geslagt; de Jaaren der Overleedenen waaren

Beneden een Jaar 18 van 45 tot 50 Jaar 2

van 1 tot 5 Jaar 6 — 50 — 55 — 2

— 5 — 10 — 5 — 55 — 60 — 4

— 10 — 15 — 0 — 60 — 65 — 5

— 15 — 20 — 2 — 65 — 70 — 0

— 20 — 25 — 4 — 70 — 75 — 2

— 25 — 30 — 1 — 75 — 80 — 2

— 30 — 35 — 4 — 80 — 85 — 5

— 35 — 40 — 3 — 85 — 90 — 1

— 40 — 45 — 6 — 90 — 95 — 1

I. *Ziekten der Jaargetyden.*

De koortsen in deeze maand waaren meest remitteerende en veelvuldiger als in de voorige; allen hadden zy min of meer duidelyke teekenen van een *saburra biliosa* in de eerste weegen, maar byzonder in de maag, met een bittere smaak, walging, en somtyds braakingen verzeld; insgelyks waaren ook veelen gecompliceerd met het zinkingaartige, nogtans waaren de voornaamste teekenen der ziekten oorspronkelyk van eene slappe spysverteering en daar meede vereenigd een *saburra biliosa* en *pituitosa* in de eerste weegen. Men kan niet zeggen, dat zy zeer kwaadaartig waaren, blykende dat 'er 11 onder een getal van 73 aan koortsen gestorven zyn, enkele gingen over in een anderendaagfche of derdendaagfche koorts, die vry wat aanhield, en waarin egter de Kina niet spoedig kon gebruykt worden, ten zy de zwakheid zulks noodzakelyk maakte, en dan moest daarin aangehouden worden, ten minsten tot dat de kragten volkoomen hersteld waaren, andersins kwam de koorts spoedig weeder. De geneeswyze vorderde volstrekt in den beginnen braak of purgeermiddelen en hoe spoediger die gegeven wierden hoe eerder doorgaans de koorts eindigde, en de lyder herstelde. Veelen verkiezen tegenwoordig de *emetica* met de *cathartica* te vereenigen, en ontlasten onder en booven de eerste weegen van alle kwaade stoffen, en gebruyken by voorkeur onder de braakmiddelen, de *tartarus emeticus*

ricus: men kan zeggen dat deeze geneeswyze by jonge sterke menschen voldoed, en de zieken zeer wel herstellen, maar als men hier meede eenige daagen zomtyds aanhoud, dan worden de Lyders zeer ziek, afgemat en kragteloos, zodanig op het einde, dat men meer tyd nodig heeft om de kragten te herstellen, en alle de *actiones naturales* en *vitales* weederom tot eene bedaarde werking te brengen, als om de koorts te geneezen, zo dat deeze geneeswyze niet onverschillig is, en vooral als men volgens de les van HIPPOCRATES *cito* en *jucunde* wil herstellen; om deeze reeden verkiezen hedendaags nog zommigen, die de voetstappen van SYDENHAM, BOERHAVE, en VAN SWIETEN volgen, en de Lyders niet minder spoedig herstellen, om in het begin deezer koortsen eene behoorlyke gifte, het zy van den braakwortel alleen, of met den *tartarus emeticus* vermengd na de onderscheide temperamenten der Lyders op eens in te geeven, het welk na een of twee uren zyne uytwerking gedaan hebbende dikwils in deeze ziekte eenige afgangen geeft, deze gift word somtyds den volgende dag, zelden voor de derde maal herhaald, gemeenlyk kan men na een braakmiddel volstaan met zachte *purgantia* of tusfen beide met *resolventia*, en nadat de eerste weegen gezuyverd zyn, en de koorts afgeloopen is, dan volgt ook verder vry spoedig de herstelling van den Lyder door eene voedzame levens reegel. Deeze aanmerking, dien wy hier maaken, is voornaamentlyk, omdat wy beide geneeswyzen in deeze Maand gebruykt

hebben met een even gelukkig gevolg in de herstelling, en hierom denken wy, dat ieder Geneesheer vryheid heeft den eene boven den anderen te verkiezen, en het beste is van beiden na de onderscheiden perfoonen gebruyk te maaken: het algemeene dat dikwerf hier in plaats heeft, is nadeelig.

De *febres remittentes biliosæ* kan men in het algemeen zeggen, dat door *evacuantia* der eerste weegen spoedig hersteld wierden, en de Natuur zelve door een *cholera* of *diarrhaea* in den beginnen de geneezing zeer spoedig volbragt, en de indicatie aanwysde, dien men te volgen had; het komt 'er maar voornamentlyk op aan niet langer of korter te evacueeren als noodig is, dat is zo lang de koortsen niet sterk verminderd zyn, uytgezonderd als het schielyk verlies van kragten verhinderd voort te gaan, en 'er zig dus een dringend toeval opdoed, dat geen uytstel toelaat.

II. *Algemeen heerschende Ziekten.*

Onder deezen bleeven nog aanhouden de maazelen en het roodvonk evenwel niet sterk, zynde 'er maar twee overleed n, pokjes waaren byna geheel opgehouden, zynde daaraan een gestorven. De Maazelen en het roodvonk waaren gecompliceerd met den aard der ziekten der jaargetyden, de lyders hadden een bittere smaak, walging, geneigdheid tot braa-

braaken, en benaauwdheeden omtrend de harte kolk: In de geneezing moest men meerder zorgen voor de complicatie, als voor de *morbus epidemicus* zelve, welks tydperken zeer wel afliepen, schoon de koortsen by bleeven, braak en purgeermiddelen waaren in den beginnen nodig, en fomtyds ook wegens het schielyk toeneemend verlies van kragten en tot voorkooming eener rotkoorts, de kina, camfer en vitrioolzuur in ruyme giften, anderzints volgde meest de dood.

III. Landziekten.

In deeze Maand hebben wy hier omtrend niets byzonders aanteteekenen.

IV. Tusfenkomende Ziekten.

Onder deezen kan men tellen een zinkingaartige maaghoest vooral by kinderen, insgelyks *angina*, *dolor rheumatici*, *diarrhaea benigna*, welke allen van dien aart waaren, dat zy behoorden tot de zinkingagtrige ziekten, en insgelyks ook allen meer of min gecompliceerd waaren met toevallen uit een kwaade spysverteering ontstaande. De geneeswyze vorderde algemeen *purgantia* *eccoprotica*, met *resolventia* en *diaphoretica* vereenigd,

64 *Waarneemingen omtrent de Lugtgesteldheid*

by kinderen zag men een zeer goed gevolg van het *vinum emeticum Huxhami* om het uur of om de twee uren van 10 tot 20 drop-
pels ingegeven, of tot dat het eenige wal-
gingen maakte, en dan volgde na weinige
daagen fomtyds maar eene enkele braaking,
maar vooral slymige afgangen, die de zieken
herstelden.



November.

Hoogste Thermomeeter den 6 'smiddags 64 gr.
 Laagste ————— den 19 'savonds 28½ gr.
 De geheele Maand de Gemiddelde hoogte, oggend,
 middag en avond 45½ gr.
 Hoogste Baromeeter den 10 'smorgens 30 d. 2 l.
 Laagste ————— den 3 'smiddags 29 d. 1½ l.
 Hoogste Hygromeeter den 23 'smorgens en 'smid-
 dags 101.

Laagste ————— den 12 'savonds 57½.

Gemiddelde hoogte oggend, middag, avond 81½.

Gevallen waater 40 lynen uitgewaasemd 13 lynen.

De heerschende winden waaren

Van den 1 tot den 11 W. ZW. Z ZO.

———— 12 ——— 14 NW. den 15 ZW.

———— 16 ——— 24 N. NO. O. ZO.

———— 25 ——— 30 ZW. W. en Z.

Van den 1 tot den 7 buijig, en winderig, dikwyls
 veel reegen en wind. Den 8 en 9 helder. Den 10
 mistig en bewolkt. Van den 11 tot 21 regen, buijig
 en winderig, enkele dagen eenige uren helder. Van
 den 22 tot den 30 mistig, reegen en wind.

Het getal der dooden in deeze Maand was 115,
 waarvan 54 van het Mannelyke en 61 van het Vrou-
 welyke geslagt, de Jaaren der Overleedenen waaren.
 Beneden een jaar 27 Van 45 tot 50 Jaar 5

Van	1 tot 5	—	9	—	50	—	55	—	6
—	5 — 10	—	3	—	55	—	60	—	9
—	10 — 15	—	1	—	60	—	65	—	8
—	15 — 20	—	6	—	65	—	70	—	11
—	20 — 25	—	2	—	70	—	75	—	8
—	25 — 30	—	2	—	75	—	80	—	3
—	30 — 35	—	4	—	80	—	85	—	3
—	35 — 40	—	5	—	85	—	90	—	0
—	40 — 45	—	2	—	90	—	95	—	1

I. Ziekten der Jaargetyden.

De koortfen in deeze Maand waaren *remitteerende* Naajaarskoortfen, dikwyls zeer moeyelyk om van de *febres continue simplices* te onderscheiden, want behalven de *febres inflammatoriae* die dikwyls aanhoudende zonder *remissie* voortgaan, tot dat 'er eene *crisis* in de ziekte komt, zoo kan men vry algemeen zeggen, dat alle anderen koortfen by daaglyksche verheffingen, het zy des 'avonds, of op eene andere tyd des daags voortgaan, of geheel *intermitteerende* worden, om die reeden behooren hier te lande de meeste koortfen tot de *remitteerende*, en zyn door verschillende complicatien alleen onderscheiden. In deeze Maand waaren die met eene taaye slym in de eerste weegen verbonden, en met veele zinkingaartige toevallen, als sterke vliegende hoofdpyn, hoesten en schorrigheid in de keel vereenigd, de tong was wit en slymig, zomtyds zeer zuiver, de pols altoos koortfig, en de *urin* hoog gecouleurd, en met een slymig, zomtyds galagtig sediment bezet. Veelen konden nogal zonder afkeer spyzen gebruiken en klaagden geensints over eene vuyle of onaangename smaak. Over het algemeen liepen de koortfen onder een goede behandeling binnen veertien daagen ten einde, en op het laatste meestal met eene sterke uitwaaseming of zeer veel ontlasting van troebele *urin*, en slymige afgang. Zommige lyders

wier

wierden door een *dysenteria* die zeer hardnekkig was, en met sterke *tenesini* verzeld aangedaan, meestal ontlastende weinig slymige stoffe te gelyk. Eenige lyders kreegen ook *aphthæ symptomaticæ*, die door den *borax* met de *syrupus althææ* vermengd, verdreeven wierden, by zommigen nam men van den beginnen af, eene volkoomene *aphonia* waar, die zelfs na de herstelling bybleev. Het blykt duydelyk, dat alle deeze ziekten in den aard der Naajaarsziekten deelden, en omtrend de geneeswyze is aantemerken, dat zelden aderlaatingen nodig waaren, maar in den beginnen bragt een *emeticum* uyt de *ipécacoanha* zeer veel verligting by, en vervolgens purgeermiddelen uit de rhabarber, seneblaadere en manna of *per epicrasin*, of op eens gebruikt, als meede ook clysteeren. Na genoegzaame ontlastingen, het welk bleek, als de stoffen dikker en drekagtiger wierden, herstelden de lyders vry spoedig door eene versterkende levenswyze, terwyl bittere maagmiddelen teffens gebruikt wierden; by die zeer zwak waaren, het zy door hun gestel, of door de heevigheid der ziekten, gebruikte men met goed gevolg den koortsbast.

II. Algemeen Heerschende Ziekten.

Kinderpokjes hebben wy deezen Maand niet gezien, enkele kreegen mazelen en roodvonk, als ook eenige het springvuur, alle gecompliceerd met het zinkingaartige.

Wat over het geheel deeze ziekten aangaat, hebben wy byna niets aanteteekenen, die wy gezien hebben, waaren goedaartig, en zyn spoedig hersteld geweest, zonder byna andere geneesmiddelen te gebruiken, als op het einde eenige zachte purgeermiddelen om de maag te ontlasten, en de eetlust weeder te herstellen.

III. *Landziekten.*

Onder deezen kunnen wy niets byzonders aanteteekenen, als dat het algemeen zeker is, dat men de meeste klagten hoort, als 'er veele zinkingaartige ziekten regeeren, gelyk in deezen Maand het geval was.

IV. *Tusfenkomende Ziekten.*

Hier onder kan men brengen, dat veele kinderen een maaghoest kreegen, van welken veelen eene taye slym overgaaven, die den hoest verligte, anderen kreegen na eenige daagen een *Cholera* of goedaartige buikloop, die den hoest insgelyks deed verminderen, anderen daarenteegen hoesten zeer sterk, en ontlasten niets, deeze kreegen koorts en benaauwdheid in de ademhaaling, waaraan eene aderlaating veel verligting toebragt, daarna hadden deezen, gelyk ook alle de anderen purgeermiddelen noodig, als ook de *sulph. aurat. antimon.* of de braakwortel in
klei-

kleine giften by tusfen poozen. Veele bejaarden menschen kreegen ook eene sterke slymige zinkingaartige hoest, deeze kreegen veel verligting door spaansche vliegplysters. Voorts klaagden veele menschen over *rheumatique* pynen, als tand-buik-maag-en vliegende jigtpynen, bastaard pleurissen en scheele hoofdpyn: veele verdunnende, en zweetdryvende middelen, spaansche vliegplysters, en door zig warm te houden, en te zorgen, dat 'er dagelyks het zy door laxeermiddelen of clysteeren ontlasting kwam, herstelden de meesten lyders schielyk, ten zy 'er koortsen by kwaamen, en dan behoorden zy onder de ziekten der jaargetyden. Verscheiden hardnekkige oog ontsteekingen hebben wy ontmoed, die aderlaatingen, purgeermiddelen, en spaansche vliegpleisters vorderden, by eenige hebben wy na genoegzaame en voorafgegaane ontlastingen met een goed en spoedig gevolg gebruikt een mercuriaal zalfje uit 4 grein bv. *mercur. præcip rubr.* met twee dragmen *unguent. rosacei* vermengd, en drie a vier maal daags een weinigje in den binnensten ooghoek gestreken.

December.

Hoogste Thermomeeter den 29 's middags 4 gr.

Laagste ————— den 24 's avonds 10 gr. s' nagts

12 uur 8½.

Gemiddelde hoogte, oggend, middag, avond 32½ gr.

Hoogste Baromeeter den 16 's avonds 30 d. 4½ l.

Laagste ————— den 3 s' avonds 29 d. 6½ l.

Hoogste Hygromeeter den 27 's avonds 97 gr.

Laagste ————— den 24 s' avonds 73½ gr.

Gemiddelde hoogte, oggend, middag, avond 86½ gr.

Gevallen waater Lynen; uytgewaasemd Lynen.

De heerſchende winden waaren van den 1 tot 4 Z. ZW.

Van den 5 tot den 23 ZO. en O.

Van den 23 tot den 27 O. NO. O. de 27 en 28
Z. O. NO.

Van den 29 tot 31 W. NW.

Van den 1 tot den 13 reegen en windrig.

———— 4 tot den 9 helder, enkele uren wat
wolkig, en windrig.

———— 10 tot den 18 mistig, buijig, betrokken en ſtil.

———— 29 helder, noorderligt s' avonds, verder
tot den 23 helder en windrig.Van den 23 tot den 25 helder windrig bewolkt
den 25 ſneeuw. Van den 25 tot den 29 betrokken
bewolkt, reegenagtig, den 30 en 31 bewolkt, ſneeuw,
hazel, reegenagtig.Het getal der Dooden gedurende dezen Maand
was 138, waarvan 66 van het Mannelyke en 72 van
het Vrouwelyke geſlagt; de Jaaren der Overleedenen
waaren

Beneden een Jaar	23	Van 45 tot	50	Jaar 5
Van 1 tot 5	15	50	55	6
— 5 — 10	3	55	60	7
— 10 — 15	3	60	65	5
— 15 — 20	6	65	70	8
— 20 — 25	3	70	75	10
— 25 — 30	7	75	80	7
— 30 — 35	5	80	85	7
— 35 — 40	5	85	90	4
— 40 — 45	3	90	95	1

I. Ziekten der Jaargetyden.

De koortfen in deezen Maand waaren zeer overeenkomstig met die der voorige, als zynde *remitteerende* koortfen gecompliceerd met eene taaye slymige stoffe in de eerste weegen, meestal met krimpelingen in den buyk, en persingen tot afgang, de tong met een witte slymagtige korst bezet, insgelyks de *urin* met een diergelyk bezinkzel. By den aanvang der koorts bespeurden men duydelyk, dat zy eene zinkingaartige oorzaak had, vooral klaagden de Lyders over verkoudheid, hoofdpynen, loomigheid der leeden, inwendige koude in den buyk met opspanning van winden: tegen den avond verhefte zig de koorts met weinig uytwaazeming des nagts vooral in de eerste drie à vier daagen, dan na dien tyd vermeerderde de koorts, wierd heviger en langduuriger en eindigde in een sterk zweeten, dat veel verligting aanbragt, de *urin* wierd dik en troebel, en gemeenlyk kwaamen 'er vooral na den zeevenden en agtsten dag veele slymagtige afgangen met kolykpynen vergezeld, die by veelen tot na den veertiende dag bleeven aanhouden, en men egter niet als *critiesch* kon aanmerken, nadien de koortfen na al die ontlastingen niet verminderden: dog het zweeten dat na dezelve ontfond, en een overvloedige dikke *urin* bragt eerst de regte beterschap aan; de koortfen verminderden, de afgangen wierden natuurlyk en gebonden, de tong zuiver, en de Lyders herstelden zeer voorspoedig.

De

De geneeswyze vorderde vooral in den beginnen de eerste weegen te zuiveren, en door purgeermiddelen de ontlastingen gaande te houden, tot dat de drekstoffen meerder consistentie verkreegen; in geval de zwakheid der Lyders geen verhindering gaf, dan konde men volstaan met verder de waterlooizing, en uitwaasfeming door behoorlyke middelen te bevorderen. In het laatste deezer Maand vereenigden zich met deeze koortsen veel meer *rheumatique* pynen, als wel in het begin plaats hadden, die echter door plaatselyke middelen, vooral spaansche vliegpleisters of een *Linimentum volatile* verzagt wierden, en deeze Lyders moesten zich nog lange na het eindigen der koortsen thuis houden, vermits de zinking pynen andersints wederom verheften, en lang bybleeven: Eenige Lyders kreegen op het einde deezer koortsen eene roode vlekachtigen uitslag, zeer gelyk aan eene *scarlatina*, dog binnen weinige daagen verdwynende zonder affschilfering, en deeze Lyders herstelden het volkomenste en klaagden naderhand, schoon wederom in de open lugt komende, van geene zinkingpynen.

II. *Algemeen heerschende Ziekten.*

Men kan zeggen, dat dezelve in deezen maand genoegzaam geen plaats hadden; hier en daar kan men zeggen dat 'er enkele Lyders aan de pokjes ziek laagen, die echter zeer goed-aartig waaren, en regelmatig afliepen, volgens de sterflysten is, daaraan een kind gestorven.

Maas

Maafelen en roodvonk vond men ook nog in enkele huizen, daaraan zyn insgelykstwee Lyders overleeden.

III. Landziekten.

Veele zinkingaartige toevallen, vooral plaatselyke pynen wierden gezien, en schoon men wel geene regelmaatige zinkingkoortsen veel zag, wierden echter die geenen het meesten aangedaan, die aan langduurige borstziekten kwynenden; zynde 'er ook volgens de sterflijsten 12 aan de teering, en agt aan Borstkwaalen gestorven, en hoe onnaauwkeurig deeze opgaave ook zyn mooge ten opzichte der onderscheiden soorten, zoo kan men 'er echter over het geheel eenige staat opmaaken, voor zoo verre deeze ziekten tot één en dezelve soort behooren.

IV. Tussenkomende Ziekten.

Men hoorden zeer veele klagten over alle soorten van ziekten, die uit slym en eene belette uitwaasfeming gebooren wierden, en zeer eigenaartig bleeven deeze ziekten nog behouden eene algemeene geschiktheid tot die toevallen, welke uyt een *saburra pituitosa* van maag en darmen voortkwaamen, waaronder *diarrhæa*, *tenesmi*, *cholera*, *nausea* en gebrekke-lyke spysverteering. By zeer weinigen gingen deeze ziekten tot eenen hoogen graad, en door

in den beginnen de ontlasting te bevorderen, schikten zy zig zeer wel, vooral als 'er zig geen zinking pynen by voegden, want deeze beiden, naamentlyk bedorven stoffe in de eerste weegen, en zinking pynen verzellen elkanderen zeer dikwils, schoon egter niet altoos, want de hier opgenoemde ziekten wierden ook wel zonder zinking pynen gezien, gelyk ook menigvuldige klagten over plaatselyke zinkingen gehoord wierden by menschen, die voor het overige zeer wel waaren, en gereegelde ontlastingen hadden. Onder de zinkingpynen, die zoo wel het lastigste voor den lyder, als het moeyelykste in de geneezing waaren, vond men zeer veele bastaard pleuris pynen, die de inademing zeer belemmerden, hoewel de pols niet koortig was, de *urin* was zeer bleek, en buiten die pyn bevonden zig de lyders anders vry wel, aderslaatingen bragten geen verligting aan, ja zelfs was het beeter dezelve geheel naa te laten vooral als de lyders van geene sterke lighaams gesteldheid waaren, verzagtede *cataplasmata* bragten ook weinig of geen hulp aan: men vond geen spoediger hulp teegen deeze plaatselyke zinkingpynen, als door spaansche vlieg pleisters, en wanneer de pynen by bleeven, of zig verheften, na dat dezelve aan het geneezen waaren, was het dienstiger ze op nieuw aan te leggen, zo zulks vereischt wierd, dan door prikkelende middelen daagelyks opentehouden, nadien de plaatselyke ontsteeking die daar door veroorzaakt word, en wel op de ribben, waar weinig spiervee-

zelen zyn, zulke heevige pynen by de inadef-
ming zomtyds veroorzaakt, dat men, indien
'er geene andere teekenen in acht genomen
wierden, ligt denken zoude, 'er eene waare
longontsteeking plaats had. By Lyders, die
vreesachtig voor spaanschevliegpleisters zyn, of
by kinderen, kan men, om zich na de om-
standigheden wat te schikken, en hun te ge-
moed te komen, gebruik maaken van sterke
Epi-pastica, die dikwyls vry wel, schoon
zelden zoo spoedig als de eersten voldoen:
zeer eenvoudig en spoedig kan men zoodani-
gen vervaardigen uit roggemeel en gestampt
mostaart zaad van ieder evenveel en met goe-
de wyn-azyn tot een deeg gemaakt, en op
de pynelyke plaats aangelegd.

By het eindigen van het Jaar 1794 zullen
wy nog byvoegen eenige aanmerkingen om-
trent de *Epidemie* der Pokjes. De *Epidemie*
begon in August. 1793, en in 't begin van
die maand heerschte die algemeen in 't nabu-
rig Dorp Ryswyk, en was enkel *sporadisch*
in 's Hage, zoo dat 'er drie kleine kinderen aan
stierven: In September vermeerderde die, en
'er stierven 8 kinderen: In October waren 'er
tien gestorven, maar in November verspreide
zich de ziekte en daar stierven 26 aan de pok-
jes; verder vermeerderde het getal der zieken,
zoo, dat 'er in December 69 gestorven zyn;
men kan dit breeder zien in het Bericht der
ziekten van 's Gravenhage door PROFESSOR
E. J. THOMASSEN A THUESSINK &c.
medegedeelt in de Verhandelingen van de Natuur
en Geneeskundige Correspondentie Societeit &c.

het eerste Stuk. Men kan nu verder zien in het tegenswoordig 2de stuk dat de ziekte in January tot zyn hoogste toppunt kwam, en 119 in die maand aan stierven: en February ni t veel minder was, zoo dat 'er 117 overleeden zyn: maar in Maart was een groote vermindering en daar stierven nog 63 aan die ziekte: In April was byna de helft, want daar waren 37 gestorven: Mey had nog 33 dooden, maar in Juny was het verminderd tot 14: In de volgende maand July stierven 'er 8. In Augustus nog 3: Maar in September geen een: echter in October weder 1. In November geen, en in December nog 1.

Het Totaal getal in dit Jaar is dus geweest 396 dooden, vergelykt men dit getal met de in 't licht gegeven Sterflysten van 's Hage van den Jaare 1755 tot 1773 en dus 19 Jaaren, gedrukt by *H. C. Gutteling*, 1774, dan blykt dat het Jaar 1762 het zelfde getal aan dooden gehad heeft, echter met dit onderscheid, dat 'er in geen eene Maand zoo veel gestorven zyn als in December 1793 en January, February en Maart 1794. Maar in 1762 had January maar 6, de overige waaren meer overeenkomstig in getal, want in de 11 volgende Maanden was July het hoogste en had 50 dooden, en February het laagst en had 25 dooden, vaders blykt uit diezelfde lyst en dat de *Epidemie* in 1773 nog veel sterker geweest is, als deze van 1794, want toen zyn 'er in dat Jaar gestorven 529 menschen; het is ook opmerkelyk dat in die 19 Jaaren maar 2 Jaaren zyn, als 1755 en 1761, dat aan de pokjes niemand gestor-

storven is. Het was te wenschen dat die sterflysten in die orde vervolgt waren: mogelyk zouden wy dan kunnen ontdekken dat door de menigvuldige Inëntingen die in 's Hage gedaan zyn, het getal der kindeer die aan de pokjes sterven, vermindert was in de laatste 19 Jaren.

Vernits by het eindigen van dit Jaar bekend is de tegenwoordige juiste bevolking van 's Hage met derzelver Distrieten, dan weet men dat die in 's Hage bedraagt 38433 en met derzelver Distrieten (die ook hunne dooden ter Secretarie aangeeven) 42365 menschen. Wy moeten hier aanstippen, dat in 't Werk der gemelde Sterflysten pag. 70 de bevolking van 's Hage en derzelver Distrieten berekend is volgens de wyze van den Heer *Suszmilch* Goddelyke orde § 117, namentlyk het middengetal der overleedenen te vermenigvuldigen met 36 en dat der geboorenen met 27, maar als dan de twee producten saam te voegen en daarvan te neemen de helft voor het getal der inwoonderen, en volgens deze rekening over de 19 Jaaren is gebleeken, dat het getal der Inwoonderen bedroeg 41472 en dus maar 293 minder als de tegenwoordige bevolking bedraagt.

Wy hebben in de maand January pag. 7 het getal der bevolking te laag gesteld op 36000, en dus is de evenreedigheid tot de gestorvenen en die de kinderziekte gehad hebben te groot. Echter is het getal der gestorvenen in die maand en in de volgende zoo groot, dat zelden de *epidemie* zo een sterke verwoesting maakt in zoo een korten tyd.

Wy zien ook in de *Epidemie* van 1794

bevestigd dat November, December, January en February verre de gevaarlykste zyn, gelyk in voorschreeven lyften pag. 37 ook aangetekend is; Insgelyks is zeer overeenkomstig zoo als wy in den loop van dit Jaar uit onze eigen practyk ook opgemaakt hebben, dat 1 van de 10 lyders gestorven is, zo als ook in voorsz. lyften pag. 38 § CXI berekend word over de geheele 19 jaaren, dat een tiende door die ziekte verflonden wordt. Dit onderscheid heeft plaats, dat onze aantekeningen zich bepaalen tot een Jaar van zwaare *Epidemie* en die in de aangehaalde lyften tot 19 Jaaren.

Wy zullen nu de balans eens opmaaken uit de bekende bevolking van 's Hage en derzelver Distrieten en het bekende aantal der overleedenen aan de kinderziekte in dit Jaar. Voor eerst weet men dat 396 gestorven zyn, gesteld dat een tiende overleden is, dan hebben in dit Jaar 3960 de kinderziekte gehad; dierhalven is het getal vermids de bevolking bedraagt 42365 (om byna ronde getallen te houden,) $10\frac{2}{3}$ gedeelte van de geheele bevolking in 's Hage die de Kinderziekte gehad heeft, en een 10de van dat gedeelte gestorven is.

Hier benevens moet men opmerken dat het ruim $\frac{2}{3}$ onder de 5 jaaren sterven aan deeze ziekte. Wat een verwoesting onder de kinderen als de Kinderziekte regeert! hoe noodzaakelyk dierhalven het voortzetten eener algemeene Inënting.

C O R O L L A R I A.

1.

De *epidemia variolosa* begon op 't laast van de Zomer in 1793, vermeerde langzaam en is op zyn hoogste toppunt geweest in January en February; naderhand by ieder maand vermindert, zoo dat in September die ziekte geheel ophield.

2.

Uit alle de maandelyksche aantekeningen blykt dat geheel byzondere *miasmata venenosa* te gelyk kunnen regeeren en onderscheiden *epidemische* ziekten voortbrengen zomtyds in een en dezelfde persoon gelyk, als 'er voorbeelden in dit jaar geweest zyn, in pokken en mazelen.

3.

Het geheele jaar door was in 't algemeen zagt en vogtig, en de ziekten der jaargetyden waren vroeger in hun begin als gewoonlyk zoo dat op het laast der Wintermaanden reeds de Lente ziekten gezien wierden, ingelyks de Zomerziekten en Herfsziekten vroeger als gewoonlyk voorkwamen, en aldus werd bevestigd het geen HIPPOCRATES Lib. III. Aphor. 19 aantekent, *morbi autem omnes quidem in omnibus temporibus fiunt, nonnulli vero in quibusdam ipsorum magis & fiunt & exacerbantur* en STOLL *aphorismi de Cogn. & Curand. febribus* zegt
zeex

zeer wel § 40 *quosi tempora anni consuetum suum tenorem non observent alius quoque erit febrium habitus ad anni partes.*

4.

De zinkingaartige gesteldheid vereenigde zig met alle ziekten, als met die der jaargetyden, *epidemische* landziekten, en tusfschenkomende ziekten, zoo dat veele verschynzelen daar aan alleen waren toeteschryven en in de geneeswyze een byzondere opmerkzaamheid vorderden; en wy die onder de algemeenste landziekten plaatsen kunnen.

5.

De menigvuldige Inëntingen dit in 't begin van 't jaar gedaan zyn, wanneer de *epidemia variolosa* het sterkste heerschte, hebben duide-lyk aangetoondt door de menigvuldige pokjes die de Inëntelingen kregen, en de daar doormeerder moeite en gevaar die by veelen plaats had, en by sommige ook napokken gekomen zyn; dat de Inënting het gevaarlykst is, als de natuurlyke pokken algemeen regeeren.

6.

Alle ziekten maar vooral *epidemische* ziekten zyn meerder of minder gevaarlyk na de complicatien die zy krygen met de ziekten der Jaargetyden.

7.

De Complicatie met het zinkingaartige is, nadeelig in pokken en vooral in 't voortbrengen der napokken, die na maaten derzelve Complicatie met het *catharrhale* het meest volgen.

8.

De geneesmiddelen van wylen Doctor van de Bosch als een specifiek middel opgegeeven tot beteugeling en verbetering der kwaadaartigheid van gevaarlyke en slegt soort van pokjes, is door de gedaane proefnemingen in dit Jaar ons niet gebleeken, waarom wy nog blyven wenschen dat 'er zodanig middel, beter als de Inenting mag ontdekt worden.

9.

In alle koortzen voorkomende uit een *saburra primarum viarum* en alwaar dierhalven de voornaamste indicatie vordert, door ontlastende middelen de eerste wegente zuiveren, zoo is ons voorgekoomen, dat de *emetica* en *purgantia* in behoorlyke dosi's dagelyks eens ingegeeven meer voldaan hebben als *emetico cathartica per epierasin* ter voldoening aan de les van Hippocrates om de ziekten, *cito, bene & jucunde* te herstellen.

27 Waarneemingen omtrent de Lugtgesteldheid

L T S T

DER

GESTORVENEN

IN GRAVENHAGE,

in den Jaare 1794.

	Mans.	Vrouwen.
January	123	124
February	113	108
Maart	66	91
April	51	66
May	54	66
Juny	43	53
July	53	38
Augustus	52	46
September	41	43
October	47	26
November	54	61
December	66	72
	<hr/> 768	<hr/> 794

Te Zamen 1562 Dooden,

WAARNEEMINGEN

O M T R E N T D E

Lugtgesteldheid en Ziekten, te

R O T T E R D A M;

voor den Jaare 1794

Medegedeeld door den Heer

O. C. E I C K M A;

Med. Doctor.

January.

Van den eersten tot den dertienden January hebben wy de meeste koude gehad, de grootste koude op den verbeterden Thermometer van Six had plaats tusschen den 9 en 10 January, zynde 18 graden; na den 13 tot den 26 was het weder vogtig en dooyend, nevelachtig en hier en daar met regen verzeld, de hoogste Thermometer had in deze tyd plaats zynde den 19^{de}. 44. graaden; van den 26 tot 31 incluis had men snagts vorst, ook sneeuw.

In January was de Hoogste Barometer den 20ste 's avonds 30^{de}. 59. — en de laagste

28, 55 den 25ste met zwaare storm. ---- De Hygrometer meestal zeer vogtig, welke by de mistige Luchtgesteldheid meest al 100 aantoonde, de grootste droogte by eene O. N. O. ste wiud 60°.

Zommige Epidemische Ziekten van het vorige jaar vertoonden zig ook nog gedurende deze Maand schoon niet algemeen.

Het *Roodvonk* was meesten deels goedaartig, en liep in een korten tyd zonder toe vallen van belang af.

De *Mazelen* waaren zeldzaam en niet vergezeld met verzwaarende omstandigheden.

De *Pokken* waaren meede van weinig aan belang. --- By eene Lyderes aan deze ziekte nam men waar, dat dezelve met een *diarrhoea* begon, terwyl de mond en keel zig even eens vertoonde als of het roodvonk te wagten was, ook nam de opperhuid een meer dan natuurlijke roode kleur aan, en men had geene de minste gedagten op pokjes; op den 4 en 5 dag zag men echter eenigeweenige zeer goedaartige puistjes ten voorschyn komen, welke geregeld den loop der pokjes volgden, terwyl de voorige toevallen verdweenen.

Behalven deze ziekten leverde deze maand veele voorbeelden op van *Peripneumonia notha*, waar van zommige niet gemakkelyk te genezen, en voor lieden van een vergevorderden leeftyd zelfs doodelyk waren --- De aderlaatingen deden hier weinig goeds en de *purgantia* waaren zichtbaar nadeelig; *decocta graminis* met de *Oxymel simpl.* en *sp. nitri dulcis* waren van de beste uitwerking. --- Men moest echter deze wel onderscheiden van *p-*
ri-

ripneumonia vera, waarvan ook enkele voorbeelden zich opdedden, en welke wel deegelyk zelfs herhaalde aderlaatingen, het aanleggen van spaansche vliegplysters op de borst, en verdunnende verkoelende geneesmiddelen en Clysteeren vereischten.

February.

Leverde in den beginne veele drooge dagen, op het einde echter eenige windrige en regenachtige --- de grootste graad van warmte was 52°. en de geringste 28°. De Barometer stond aan hoogste den 27 gelyk 30, 37 deszelfs laagste stand 29, 41 --- De vogtmeter als in de vorige maand.

Het getal der zieken van de voorigemaand, werd geduurende deze nog veel verminderd vooral met opzigt tot de *peripneumonia*, welke tevens goedaartiger waren.

Pokken, *Mazelen* en *roodvonk* waren zeldzaam.

Dan thans begon zig een andere ziekte te vertoonen, welke van een kwaartaartigen aart scheen te zyn, gelyk uit het volgend voorbeeld kan worden opgemaakt.

Een jonge Dochter, welke over sterke vermoeyenis door de leden klaagde, werd adergelaaten en met *purgantia* behandeld, hier door verzwakte zy geweldig en begaf zig dien volgens onder de behandeling van eenen anderen arts, die dadelyk bespeurde, dat 'er eene gansche *disolutio Sanguinis*

plaats had: het bloed liep haar den mond uit, de pis was bloedig en uit de lancetsteek ontlaste zig zomtyds nog eenig bloed. Voorts was het geheele lighaam met blaauwe *petechiae* uitgeslaagen. Men diende de *Cortex Peruv. ruber* met de *Elixer vitrioli* toe, dan de lyderes stierf den 6 dag na de aderlating.

Maart.

Was over het algemeen zeer buiachtig, met regen, en hier en daar sterke wind, de hoogste Thermometer was 64 graden, en de laagste 'snachts 36. — de Baromeeter onderging in deeze maand geene zeer groote veranderingen en bleef meestal gedurende eenige achtereenvolgende dagen trapswyze ryzende of dalende; de hoogste stand van den zelve was 30, 53, de laagste 29, 61. — De Hygrometer stond eens op 97, dog de grootste droogte was 61.

Van de zoo eevengemelde ziekte nam men meer en meer voorbeelden waar, welke tevens aanduiden, dat dezelve besmettelyk was.

In één huisgezin trof deeze ziekte, acht Persoonen, een Vader en Moeder met zes kinderen successivelyk: de ziekte begon gemeenlyk met een groote vermoeidheid en pyn door de leden, waar by zich dikwyls zwaare hoofd en lendenpyn voegde; de pols was in het begin der ziekte natuurlyk, maar verminderde langzamerhand, doch zonder snelheid; de oogen waren rood en even als ontstoken; de tong was meestal zuiver en buitengewoon rood, glad en glanzig

zig van oppervlakte, ook was dezelve zeer gevoelig, gelyk ook de keel, en zelfs by zommige de gehele flokdarm en maag, zoo dat de doorzwelging pynlyk was, en de lyders niets zonder groote pyn en aanhoudende braakingen in de maag verdraagen konden: onder dit alles bleef de eetlust echter nog lang in stand, en verminderde alleen naar maate de krachten afnemen; eenige waren zeer onrustig en zelfs volsirekt slaapelocs; andere weder leiden in geduurige slaapzucht als verzonken; meest alle hadden stuipachtige beweegingen, en zelfs waren deze by zommigen vry hevig: — By vyf van de acht in dit huisgezin ontstond 'er op den 7de den 9de of den 14de dag der ziekte een ontlasting van vry dun, doch nog niet geheel gedissolveerd bloed, by de vrouw uit de lyfmoeder en by den man, twee zoons en eene dochter uit den neus; deze ontlasting was al vry overvloedig en werd gevolgd van vermindering der hoofd en lendenpynen, doch de pols zank datelyk al verder weg, zoo dat het moeijelyk werd die meer te bemerken, de oogen werden doffer, en het rood veranderde in een donkerbruine vuile kleur, de tong werd drooger en beevende, ook werd zy benevens de lippen en tanden met een barre zwarte korst als bedekt; de Lyders geraakten aan 't ylen, en dat wel byna onophoudelyk, en scheenen in het uiterst gevaar; dit duurde dus 5, 6 ja zomts 8 dagen, als dan keerden de krachten allengs weder, de tong begon min of meer vogtig te worden, de oogen helderden een weinig op; de urin, die tot dus verre steeds met een

vuile geroerde wolk van boven tot onder bezet was, werd helderder, en de wolk begon te zinken; de ylhoofdigheid verminderde, de eetlust, die by zommigen niet eens geheel verdweenen was geweest, wakkerde weder aan, en 'er kwaamen zig zichtbare teekenen van herstelling vertoonen; de vermoeidheid en pyn in de ledemaaten, die by het meerendeel zoo hevig was, dat zy het nacht en dag uitschreeuwden, duurden nóg het langst en verdweenen niet dan traaglyk; by een meisje van zes jaaren ontstond in het laatste der ziekte een absces onder het linker oor en een dergelyk op het voorhoofd, en by een andere een zwaare *diarrhaea* met heevige buikpynen, die omtrent 3 à 4 dagen duurden, meest tegen den avond, en na geene gewoone hulpmiddelen luisterden; deeze twee hadden geene bloedvloeiingen gehad.

Zonderling is het, dat deeze Lyders zelfs in het hevigste humer ziekte meestal den eetlust niet geheel verlooren; althans geen afkeer 'er van hadden, in zoo verre zelfs, dat de vader des huisgezins byna in het eerste, toen de tong droog en hard, de lippen en tanden met zwarte korsten bezet, de oogen dof en met bruinroode randen om de bol omringd waren, en de pols zich byna niet meer liet onderscheiden, tusfchen beide, by zyn verstand zynde, niet zonder smaak bier en brood at: — Ook heeft men opgemerkt, dat deeze Lyders byna alle, niet alleen in dit huisgezin, maar ook elders een ongemeenen trek tot bier hadden, welken trek zy ongestraft, ja zelfs met voordeel in volgden.

Het verdient ook opmerking, dat van alle acht deeze zieken in dat huisgezin 'er geen één gestorven is, schoon zy geringe lieden waren, weinig oppasting en verversching hadden, en in een Kelder zig moesten ophouden, waar in geen lucht dan door den ingaan kon gemaakt worden, en in welken aardappelen en verscheidene groentens te rotten laagen, hebbende 'er tot 6 toegelyk ziek geleege, terwyl de overige, die de zieke bystonden, of naauwelyks aan de beeter hand waren, of reeds zelve ziek begonden te worden: integendeel zyn 'er van de geenen, die deeze menschen hebben opgepast, verscheiden ziek geworden en onder schynbaar gunstiger omstandigheden gestorven; onder anderen had een fris en gezond jongman van 18 jaaren één à twee nachten by deeze zieken gewaakt, waarop hy omtrent 14 dagen daarna meede ziek werd en wel datelyk veel heviger dan de anderen; zyn krachten verminderden oogenbliklyk zeer sterk, zyn pols was veel radder, hy sloeg aanstonds aan het ylen, alle de *functioes* geraakten in wanorder, zyn tong was reeds den vierden dag zeer droog en hard, zoo dat hy dien niet konde uitsteeken; zyn waaterloozing was geheel gestremd, waar van echter het involgen van zyne eensklaps ontstaane begeerte naar bier, waar van hy in korten tyd al een vry ruime hoeveelheid verzwolg, hem verlichting toebragt en zelfs geheel onthief: de ziekte echter verminderde niet, geene middelen, van wat aart ook, en in welken maate toegediend, bragten de allergeeringste verandering daarin te wege, de Lyder stierf omstreeks den

18de dag: kort voor zyn dood begon zyn Moeder te klaagen, de eerste toevallen waaren matheid en pyn der leedenmaaten en Lendenen, haare krachten namen spoedig af, terwijl inmiddels de Vader ook begon ziek te worden, die zonder veel te klagen dadelijk in eene byna aanhoudende slaapzucht storte, beide stierven voor den 14de dag der ziekte; ik had by deeze allerlei rottingweerende en versterkende middelen gebuigd, en de lucht van het Vertrek gestadig door het openzetten van deuren en vensters en het affpoelen van den vloer met fris water laten zuiveren; de overige nabestaande, die niet in het zelfde huis woonden, maar alleen daar kwaamen om de zieken op te passen, liet ik telkens de handen en het aangesigt met fris water wassen en den mond met azyn spoelen, terwijl ik hun tuschen beiden het gebruik van een glas wyn en zelfs jenever toefstond, geen van deeze zyn besmet geworden: ook verdient het opmerking, dat de eenigste van de oppassers, die in het vorig gemelde huisgezin een tyd lang gewaakt heeft en niet besmet geworden is, een persoon was, die zig dikwyls in 't gebruik van sterken drank te buitengiug.

Van de geneesmiddelen in deeze gevallen gebruikt zal ik niet veel zeggen, ik heb 'er geene gevonden, die wezenlyk goed deden het geene op de eene plaats voordeelig schein, was op een andere plaats nadeelig; doch inzonderheid zyn my de *cortex*, *campher* en alle *corroborantia* en *antiseptica calida* schadelijk voorgekomen, uitgenomen, wanneer de zieken aan het herstellen waren, doch dan konden zy

het

het ook zonder doen; in het begin der ziekte deden de *pediluvia* nog eenig nut, misfchien waaren de *balnea tepida* in dit geval in 't begin der ziekte toegediend van nut geweest; ik vermoede nog steeds een *causa exanthematosa*, en het gene ik in vervolg van tyd dit jaar heb waargenomen heeft my ook hier in bevestigd: de aderlaatingen; door andere in het werk gesteld, zyn doorgaans van de dood gevolgd geweest.

April en Mey.

Deze maand en het grootste gedeelte van de maand Mey door eene heevige ziekte aangetast geweest zynde hebbe ik geene waarnemingen kunnen doen; In het algemeen weet men echter dat de laatste helft van de maand April ons een by uitstek schoon en warm voorjaar heeft opgelevert zo dat dit aanmerking verdient, de hoogste Termometer moet in deze maand 76 graaden alhier gestaan hebben, ook waren op deze tyd al de gewassen reeds zoo verre als andertyds in de maand Mey.

Behalven dat de zoo evengemelde ziekten nog hier en daar, schoon gansch niet algemeen, bleeven voortgaan zig te vertoonen, nam men in deze maand ook eenvoudige *febres catarrhales* en *diarrhoea* waar, die niets aanmerkelyks opleerden.

Variolæ deden zig ook nog op enkele plaatsen zien, en waaren by den eenen goed en by den anderen vry kwaadaartig: *confluentes* in den uitersten graad hebben wy by een

jongeling van 16 jaaren van een gezond en sterk gestel onder de *cura antiphlogistica* zeer wel zien afloopen, de kwyling was sterk, maar de *febris secundaria*, naar gelang van het geweld der ziekte zeer maatig.

Voorts zagen wy ook nog nu en dan het roodvonk in zyn gewoone gedaante, en enkele mazelen.

In de maand MEY nam men de onder Maart gemelde ziekten waar, die, inden beginnen zig eenigzins a's *morbi catarrhales* vertoonende spoedig een geheel andere en kwaadaartlge gedaante aannamen, een dienstmaagd, na in den beginne met *aperientia leniter laxantia* behandeld te zyn, verviel den 4e dag in een sterke *diarrhoea*, gepaard met verval van kragten en ligte raaskalling; men deed haar spaansche vliegplysers aanleggen, en daar'er zig op de tong een droog sprouwagtig uitflag vertoonde, gaf men een mixtuur met *borax* en *laud. liq. sydenhami*, en liet clysmata toedienen uit een *Infusio florum chamom.* met honig, den tweeden dag na deze geneeswyze volgde een sterk zweet met vermindering der toevallen, terwyl de tong eenigzins vogtig werd en de Ylhoofdigheid week: men gaf haar verders afkookzels van den koortsbast waar in rhabarber getrokken was met *borax*, en by deeze middelen ging alles redelyk wel, tot dat'er omtrent den 12 dag der ziekte over den linkerarm en een gedeelte van de linkerzyde des lighams een rood, eenigzins geerstvormig uitflag zig vertoonde, waar op de geheele herstelling spoedig volgde. --- Een Schippers kneekht

knecht van een sterk gestel klaagde in het begin over pijn op de borstspieren, na het toedienen van een openend afkookfel vond hy zig 'sanderen da gsbeter, dan den derden dag, de pijn wederom erger zynde, liet men, geen kwaad vermoedende, een aderlating doen, doch met een slecht gevolg, staande het aangezicht den volgenden dag vervallen, de pols was ingezonken, de tong droog en 'er volgde raaskalling met een aanhoudende uitwerping van speeksel, men diende *campher* met *sp. nitri dulcis* toe, liet *clysmata* zetten en spaansche vliegplysters aanleggen doch zonder vrucht; de kragten verder vervallende gaf men een sterke *decoct. cort. Per. rub.* met de *laud. liq. Sydenh.* doch alles te vergeefs, dewyl de lyder op den 6 of 7 dag der ziekte den geest gaf.

Behalven deeze ziekten nam men hier en daar enkele *cholerae* en *febres tertianae* waar.

In het zelfde huis, daar men de *variola confluentes* in April zoo hevig had gezien in een jongeling van 16 jaaren, terwyl de ziekte wel afliep en de *febris secundaria* van geen belang was, werd een jongetje van 4 jaaren door de zelfde ziekte aangetast, doch dezelve was zoo goedaartig, dat men niet nodig oordeelde iers van belang daar aan te doen, doch op deeze goedaartige ziekte volgde een hevige *febris secundaria*, en, offchoon men zorgde, dat 'er door *clysmata* maatic open lyf gehouden wierd, verviel de lyder in een *diarriae* van een stinkende en bloedige stoffe, die echter gelukkig door de *anima rhei* gestuit werd, terwyl *corroborantia* de geneezing voltooiden.

Juny

Juny.

Leverde ons veele schoone en droge dagen, zo dat deze maand in het algemeen voor droog moet gehouden worden, de hoogste Thermometer was den 30. 80° . de laagste 45° —

De Hoogste Barometer 30, 43 - en de laagste 29, 67 in het algemeen stond de Barometer geduurende deze maand vry hoog — de grootste vogt van den Hygrometer was 79° en de grootste grootste droofte 41.

De voorige ziekten bleven in 't algemeen voortgaan zig te laten zien.

Het *roodvonk* was dikwyler kwaadaartig; 'er vertoonde zig veelerlye uitflag, dat dan eens naar roodvonk, dan eens naar mazelen, dan weder na gierst uitlag, naar *petechiae*, naar *variolæ spuria* enz. geleek, en in het eene geval zeer goedaartig was, terwyl het in het andere geval met min of meer kwaadaartige toevallen gepaart ging, en schoon men dit geduurende deeze maand wel het allermeeeste waarnam, zoo had dit echter het geheele jaar door en zelfs reeds in 't voorige jaar plaats.

July.

Deeze maand was ingelyks droog en vry warm, de hoogste Thermometer den 13de 43° de laagste in de nagt 56° — de Barometer onder

derging gelyk meestendeels des Zomers plaats heeft, weinig verandering, zynde meest al 2 a drie lynen boven of onder de 30 duymen. — De grootte droogte van den Hygrometer was eens 34°: de grootte vogt meest al 80 of 79 - uitgenomen by een vogtigen mist eens 90. — Op deze plaats merke ik aan dat myn vogt meeter welke in de stad en van den grond verheven hangd, vooral 's nagts zulk een groote vogtigheid niet kan aantonen, als zulk een welke op 't land, en niet zeer hoog van den grond hangd; genomene proeven immers tonen aan, dat by 't vallen des daauws, die werktuygen welke het minste van de oppervlakte der aarde af zyn, de grootste vogt aantonen.

Behalven de bovengenoemde ziekten, waaronder ook de ziekten, in de maand Maart vermeld, die thans nog meer en meer van een rottigen aart scheenen te worden, ontmoette men meer en meer *diarrhææ*, waarvan sommige met heevige *tormina* gepaard en bloedig waren en echter vry gemakkelyk genazen.

Augustus.

De luchtgesteldheid was in deze maand veel vogtiger, als mede was de gevallen regen meerder dan het uitgewaasfemd water, de grootste warmte was 76 en de grootste koude 's nagts 51. De hoogste Barometer 30, 28 - de laagste 29, 61. De gemiddelde vogtigheid der lucht was deze maand by de 8 graden meerder als de vorige, de

de hoogfte graad van vogt 89; de grootfte droogte 40½ graden.

September.

Heeft insgelyks veel regen gehad, de grootfte warmte was 75° en de laagfte graad van den Thermometer 48 — de Barometer stond meest al onder de 30 duimen, deszelfs grootfte hoogte beliep 30, 11 en de geringfte 29, 38 — de Hygrometer over het algemeen weder vogtiger, de grootfte droogte 46° en de grootfte vogt 89.

Deeze maanden leverden geene byzonderheden van belang op, de meeste ziekten der vorige maanden bleeven aanhouden. *Najaars koortfen*, hebben wy niet waargenomen.

October.

In deze maand was de hoogfte Thermometer 64° de laagfte 38 — de Hoogfte Barometer 30, 32 — de laagfte 29, 13 met stormen regen buyen, welke laaste in deze maand fterk waren, waar door ook het gevallen water meer dan 4 maal dat van 't uitgewafemde overtrof, ook was de gemiddelde vogtigheid der lucht wel om 9° groter als in de vorige maand; de Hygrometer was meefstal omtrent en boven de 80 graden ja zelf fomtyds 96, en de grootfte droogte was 54°.

By

By het *Roodvonk* nam men *gierst uitflag* waar; ook enkele *keelziekten* zonder uitflag, waarvan zommige kwaadaartig waren, en in den aart van het roodvonk deelden.

De *Pekken* werden weder algemeener.

November.

De grootste warmte 63° — de grootste koude 26 graden tusschen den 19 en 20 — de hoogste Barometer 30, 21 de laagste 29, 29 de algemeene graad van droogte byna het zelfde als in de voorgaande maand, de grootste graad van vogt 100, de grootste droogte 59.

December.

Deze maand leverde ons in het begin eenige heldere dagen, hier na eenige duistere met weinig regen, en eindelyk mist gevolg door vorst, welke laatste ik in dezen winter altoos op mist heb zien volgen; de vorst zelve was in den begin met mist gepaard, vervolgens hadden wy helder weder tot by na aan 't einde der maand wanneer een betrokken lucht en naderhand met een ryzenden Barometer mistige lucht het jaar eindgde — de laatste Thermometer was by my $8\frac{1}{2}$ graad 's nagts, de hoogste 49. —

De Hoogste Barometer 30, 46 de laagste 29, 50.

De grootste vogt der lucht by mistig weder 98 — en de grootste graad van droogte 58° den 20ste by heldere lucht.

De

De voorige ziekten bleeven in deeze Maanden al aanhoudend voortgaan.

Men nam hier enkele rotkoortsen waar, die door besmetting in 't hospitaal der Soldaaten op Fyen Oort waren overgebracht, en waa van 'er één in den dood eindigde.

In zeeker huisgezin was de besmetting overgebracht door den Vader, die schipper zynde geprest was geweest om zieken uyt de Engelsche Armee naar Doesburg te transporteeren, 't huis komende was hy eensklaps van een geweldige koorts overvallen, niet tegenstaande hy dienzelfden dag nog smaakelyk schoon niet overtollig gegeten had, een Chirurgyn had hem met *catarthica* behandeld, en hier door was hy spoedig op het uiterste gebragt; zyn broeder, een jongeling van 17 jaaren werd ook ziek, doch op deezen had men zoo naauw geen acht geslagen; zoo dat hy de behandeling des Heelmeesters grootendeels was mis gelopen; dan daar het gevaar by den Schipper begon te ryzen, besloot men een Arts by hem te haalen; ik vond dien man in een slechten toestand, gestadig ylhoofdig of slaaperig, een drooge tong met weinig beslag, vuilroode traanende oogen; een byna onmerkbaaren pols, raauwen met vuile vezelen als gemengde pis: ik beproefde den koortsbast in een sterk afkookzel met den *Elix. vitriol Myns.*? dan dit scheen meer na-dan voordeel toetebrengen, want de tong werd hoe langer hoe drooger; en de keel als gesloten, zoo dat 'er byna niets meer door kon, de ylhoofdigheid gepaard met slaapzucht vermeerderde van dag tot dag; telkens ontsliep hem een vuile stinkende zwarte dreck

drektstof zonder zyn weeten, en hy scheen alle vermogens geheel te verliezen. In dezen allergevaarlyksten toestand van zaaken nam ik myn toevlugt tot de spaansche vliegen, waarvan ik twee vry groote pleisters aan de kuitten, en een aan den hals liet aanleggen; de slaperigheid scheen hier door een weinig te verminderen, en de krachten voor een korten tyd opgebeurd te worden, maar wel dra was alles in de vorige omstandigheden en nog erger, niet tegenstaande ik benevens de *Cortex* en spaanschevliegen noch wyn en Campher in een vry aanmerkelyke dosis liet gebruiken: nu nam ik myn toevlugt tot de zoogenaamde *vaste of Kool-zuure lucht*, welke ik op de volgende wyze toediende; ik liet voor inwendig gebruik gereed maaken twee *mixtuuren*, waarvan No. 1 bestondt uit drie drachmen harts-
hoorngest, één drachme *borax*, één once fyroop van witte slaap bollen en 4 oncen gekookt water.

No. 2 Bestond uit één once honigazyn twee drachmen zoeten salpetergeest, een drachme gecampherden wyngest, en 4 oncen wynazyn: van deze mengfels liet ik telkens om het uur een lepel geeven eerst van No. 1, en dan onmiddelyk daarop één van No. 2. behalven dit liet ik 2 maal daags een clystma zetten uit twee mengfels, waarvan het eene bestondt uit honig, geest van hartshoorn en water, en het andere uit honig, azyn en gecampherde wyngest, welke twee mengfels ik in de clysteerspuit langzaam liet by één gieten onmiddelyk voordat het lavement gezet w d, zoo dat de vermenging dier twee vogten

ten en dus de ontwikkeling der lucht voornamelyk eerst in de ingewanden geschiede: -- de toediening van deze middelen was van een uitmuntende werking, de eerstvolgende nacht was de lyder veel bedaarder, de pols wakkerde aan, de huid die tot dus verre bar en dor was geweest, werd reeds min of meer vogtig, de slikking was veel ruimer, den volgenden nacht was de lyder meestentyds present, hy had een poos rustig geslapen en een weinig uitgewaasfemd, en nu vertoonde 'er zig een uitslag van roode vlekken gelyk aan vlooi-beten zonder steek in 't midden, deze uitslag bleef den ganschendag en werd door een overvloedig zweet den volgende nacht vervangen en verdween: de pols was nu ruim, 'er volgden natuurlyke en niet stinkende afgangen op de clysteeren, de tong werd vogtig, 'er begon trek tot eeten te komen en de lyder herstelde, de netelige omstandigheden, waar in hy zich bevonden had in acht genomen zynde, al zeer spoedig -- Intusschen herstelde de Broeder veel spoediger enkel door het gebruik van *diaphoretica diluentia* met *sp. mindereri* en daar op een weinig *cortex* met de voorige middelen. — Niet lang daar na werd de Vrouw en Zuster vervolgens ook de Dochter en ten laatste nog een Zoontje en Dochtertje van minder jaaren ziek en werden onder het gebruik der genoemde middelen spoedig genezen.

Ten besluite van deze waarnemingen kan ik niet nalaaten nog aantemerken, dat ook nu, gelyk zulks meermaalen gebeurt is, de verschillende uitslagziekten van pokken, roodvonk

en mazelen te gelyker tyd geheerscht hebben, even als of dezelve eenigzins met elkander in verband stonden: --- Ook heeft onzen aandacht tot zich getrokken de invloed, welke deze heerschende uitslagziekten hadden op veele anderen voorkomende ziekten, voornamelyk op die, welke haaren oorsprong uit een belemmerde uitwaasfeming hadden; zoo dat byna alle deze ziekten met uitslag gepaart gingen en een slechten uitgang hadden, wanneer de zelvê met aderlatingen en purgeermiddelen, behandeld werden, terwyl aan de andere kant verhittende versterkende middelen, zelfs wanneer 'er teekenen van rotting zich vertoonden, nadeelig waren; terwyl de geneezing dan het beste gelukte, wanneer 'er door het gebruik van zachte ontspannende en verdunnende uitwaasfeming bevorderende middelen uitslag te voorschyn kwam.

Nog moet ik met opzicht tot de zich dikwils vertoond hebbende Keelziekten, aanmerken dat dezelve, schoon van geen uitslag vergezeld, meest al in den aart van het roodvonk scheenen te deelen, blykens de daar by zich vertoonende peukelige tong en keel, gepaard met opzetting der kwyklieren: ook was het beste hulpmiddel, dat byna nimmer miste in beide gevallen (of naamlyk de keelziekte met roodvonkig uitslag gepaard ging of niet) een plyster van den *ladanum*, om de geheele keel geslagen.



B E R I C H T

V A N D E

Z I E K T E N

T E

H O L W E R T,

in den Jaare 1794.

D O O R

W. G. A L S T O R P H I U S,

*Commis Collecteur op de Convoyen en Liccenten ;
Correspond. Lid van de Nat. - en Geneesk.**Corresp. Societeit ; mitsg. Gepermit-
teerd Heel- en Vroedmeester enz.
der Grieteny Westdongeradeel,
in Friesland te Holwert.**De ziekten deezer jaars waaren als volgt :*

In *January*, wierdt men nauwlyks één eenige
zieke ontwaar.

Van *January* tot *Juny* vertoonden zich ver-
scheide Rheumatique-ziekten, onder de gedaante
van koortsen, keel ontsteeking, Zydeweê, kolvk
pyn,

pyn, enz. de galachtige ongesteldheid, die er teevens meede gepaart ging, was des te duidelyker, naardien des Lyderspols minder hard was, de tong galachtig beflagén, gepaart met eenen kwaaden smaak, geringe walging, benauwdheid voor het hart, traagen stoelgang.

De meer of minderen hardheid der pols en temperament der Lyders reegelden (niet alleen) de hoeveelheid van het afgetapte bloed, maar insgelyk deszelfs meerdere herhaaling, in opgemelde ziekten.

Verders wierden de *Febris* en *Pleuritis rheumatico Biliosa*, op gelvke wyze behandeld, als door my, in het bericht, over diergelyke ziekten, van den Jaare 1791. is meede gedeeld; en geplaatst in de verhandeling en omtrend dewêrgefteldheid en ziekten der Vereenigde Nederlanden, uitgegeeven door de Natuur en Geneesk. Corresp. Societeit, in 's Hage, 1 deel Bladz. 282-286.

Behalven zagte Braak-en verkoelende openende laxermiddelen, (na voorafgaande *venæ sectio*) deden de Cataplasmata uit Zuurdeeg met mostert aanzet om de keel geapliceert; als mede *Gargarismata resolyentia*, in opgemelde keel ontsteeking, veel dienst.

In de kolykpyn, waaren vogtige warme stoo-vingen, op den buik geplaatst nuttig om de werking der toegediende Buik openende middelen te bevorderen; naardien de krampachtige sluiting van 't darm-canaal, hier door wierdt weggenomen, en de pyn aanmerklyk verzagte.

Verscheiden Lyders, van onderscheidene jaaren wierden in April en May, door een kwaataartig uitslag aangetast; aderlatingen, gepaart met

verkoelende buik openende middelen, deden geen de minste vrucht. Poeyers uit de *Merc. dulcis*, *sulph. aur. antim.* met eenige greinen *rheum.* gepaart met een *Decoct. Rad Bardan, Liquiritia, herb. Agrimon, & flor. samb.* scheenen de scherpte, die in 't *serum* plaats hadde, dermaaten te verbeteren, dat de jeukte langzaam afnam; zoo dat met op 't laast, niets dan een smeering *ex ung. Nutrit. & Flavedul.* om de korsten of rooven te doen scheiden, noodig hadt, ter volkomen herstelling der Lyders. — Dat opgemeld uitflag zig spoedig weeder vertoonde, als voornoemd *unguent* te vroegtydig gebruikt wierdt, naa alvorens de *Acrimonia Seri* vernietigd te hebben, is iets, 't welk ik niet voor by kan te doen opmerken.

In de maanden *Juny* en *July*, is een enkele ziekte, van onderscheidene aart, wiens aanrekening nauwlyks waardig, waargenoomen.

De gewoone galkoortsen, (zomwylen met kolyk-pynen vergezeld) deden zig in *Augustus* en *September* hier en elders op: deszelfs geneezing, volgens de reegelen der Geneeskunde, naar vereisch der byzondere onderwerpen toe gepast, wierd de ziekte spoedig hersteld. Een braakmiddel, nochtans, in den beginne gegeven, doet meer af, dan 3 daagen purgeeren. De maag word daar door (niet alleen) van den ballast ontlast; maar de werking, van de daar op volgende toegediende ontbindende zuurachtige-laxeermiddelen, word door de schuddende-losmaakende beweeging der buiks ingewanden, aanmerkelyk bevorderd. — Ook koomt wel eens een *venæ sectio* te pas, wanneer in

in sterke gestellen de hoofd en lendenpynen zwaar zyn: in zwakke gestellen, is op gemelde konstbewerking, als de ontlasting, door krampachtige fluiting, belet word, somtyds van nut; waar in ook de *spir. nitr. dulcis* en *Mindereri*, met voordeel gegeven worden.

Het volgende geval, den opmerking alzints overwaardig, kan ik niet voorby, hier nevens te laten volgen.

Den 25 van laatstgemelde maand, wierd ik door een Vryster geraadpleegt: haar tong was met een galachtige korst overtoogen; gepaart mer eene kwaade'imaak, walging, benauwdheid voor het hart en traagen stoelgang; verzeld van eene kleinen rasfe pols.

In deeze omstandigheid diende ik haar een braakmiddel toe; waar door zy eene groote meenigte galachtig slym ontlaste. Hier op vertoonde zy my haar linker opperarm, die ik heevig ontstoken en in deszelfs midden met eene gangreneuse korst, ter groote van een dubbeltje, bezet vondt. — Verwonderd over dergelyk verschynzel; vroeg ik naar de oorzaak. Zy verklaarde my oprechtelyk deeze te zullen zeggen, onder belofte van dit alles, omtrent haar Broer geheim te doen houden. Voor eenige daagen (dus luid het verhaal) bevond zy zig by haar Moei, die een eenige Dochter hadde, deeze was zy voorneemens, (uit hoofde ter dier plaats grasceerende kinder pokjes) te doen inënten. Een Hee meester hadt haar, ten dien einde stof bezorgt, De Moej verzocht met deszelfs Dochter haar te doen inënten, deeze konstbewerking, werd door laas beiden (door middel

F 4

van

van een wond met een speld gemaakt) verrigt Ten zelfden daage reysde zy weederom naar huis; en gevoelde reeds den volgende dag pyn ter plaatse der inënting, den vierden dag, ver- toonde de *eruptie* zich in het aangezicht, 3 of 4 daagen laater was 'er kermis op het boeren Dorp. Haar Broer verzogte haar daar mee- de neevens hem naa toe te ryden, vrees voor ontdekking van opgemelde inënting, deedt haar besluiten niet tegenstaande de pokjes (die zy onder den naam van uitslag verheelde) reeds in het aangezicht zich vertoonden, zyn verzoek in te willigen. Het weêr was toen ten dagen koud en vochtig. By haar te huis komst, wier- de zy door huivering, hitte en koorts aangetast. Den volgende dag waaren de pokjes verdwee- nen; en werd reeds de kenmerken eener galach- tige ongesteldheid door my bevoorens gemeld gewaar.

Dit alles zette my in de verdere behande- ling aanmerklyk igt by. De Gangreneuse korst aan de onstoken opperarm was de plaats der voorige inënting. Ik appliceerde een verkoelende-weekmaakende-pap uit haveren- gort in karnemelk gekookt; en diende haar öpenende-verkoelende-buik ontlastende mid- delen toe. Door 't gebruik deezes, nam de galächtige ongesteldheid van dag tot dag af; de onsteking der Oppe arm verminderde en de Gangreneuse Korst scheide gelukkig: ech- ter ontlaste de Zweer nog eenen langen tyd een aanmerklyke hoeveelheid scherpe Etter, waar door deszelfs omtrek excorëerde. Zoo dat de Lyderesse (zonderdat 'er weederom een

Erup-

Eruptie of één eenig pokje verscheen) eindelyk volkomen herstelde. —

Den 14 October, verzogte opgemelde *Lyderesse* my, haar Broer eens te bezoeken: hy klaagde over vermoeidheid in de leeden, hoofd- en lendenpynen; benauwheid voor het hart en walging; de tong was een weinig geelächtig beslagen en de pols vol en hard. Ik deedt den lyder een *Venæ Sectio*; het bloed vertoonde eene inflammatoire ongesteldheid. Verkoelende, öpenende, en blikontlastende middelen wierden hem toegediend. Den 3den dag vertoonde de *Eruptie* zig in het eerst op den rug, tusfchen de fchouderbladen, vervolgens in 't aangezigt, armen, handen, deyen, beenen en voeten. De pokjes waren van een goedäartige afgefonderde foort: alles ging voorfpoedig en hy wierd gelukkig hersteld. —

Nauwlyks was opgemelde lyder hersteld, of een dienstjonge, ten zynen huize, werd ongesteld, en nadien zyn dienst byna geëindigd was, werd hy zyne Ouders toegezonden. Hy kreeg de Pokjes, dezelve waren van eene goedaartig en afgezonderde foort: besmette 3 zyner Susters en herstelden alle zonder eenige Geneeskundige hulp. —

Offchoon in October nog een enkele Galcoorts geobserveert wierd: staaken in November en December de Rheumatique het hoofd weder op: en niet tegenstaande dezelve nog met 't Galächtige vermengt was namen de meeste derzelyven, na maate 't Winterfai-
zoen naderde, een inflammatoire natuur aan.

Aderlatingen, *resolventia*, *laxantia*, gevolgt van zachte *diaphoretica* (na vereischt der omftandigheden) waren de voornaamfte *remedien*, ter herftelling van opgemelde ziekten.

Twee Vryfters pleegden my raad, wegens een Scrofuleus uitflag, die de eene de vouw des Elleboogs, en de andere de hand ontfierde: verfcheiden hulpmiddelen door een ander Heelmeester aangewend waren vruchteloos. Poeyers uit de *merc. dulcis*, *fulph. aur. ant.* met eenige greinen *rheum*, volbragten de herftelling met behulp van 't *ung. nutrit.* en *Flavedulum*.

Insgelyks heerfchten verfcheiden Verkoudheden, die by fterke geftellen, dooreen *Vence Sectio* en het drinken van een aftrekzel van verzagtede borstkruiden met *nitrum*; en by zwakkere door Flier-thee, eindigden.

Ook heb ik, in de *Rheumatismus Chronicus* my van pillen uit de *sapo. venet.* *Gum. guajac.*, met de *fulph. aur. ant.*, met vrucht bedient.

Behalven opgemelde Ziektens, wierden nog door my geöbserveert, de volgende:

Twee Lyders pleegden my raadt, wegens een heevige Jeukte; welke hen by eene vermeerderde warmte des Ligchaams, door de beweging of het bed veroorzaakt, dermaten kwelde, dat ze dikwerf by nacht 't bed, ter ftilling dier jeukte, moesten verlaate. Daar de fcherpte der vogten, door my, als derzelfs oorzaak befchouwd wierdt: diende ik hen eenige poeijers ex *Merc. dulci*, *fulph. aur. antimon.* *Camphora*, met eenige greinen *Rheum*, toe. Door welks langduurig gebruik ze eindelyk herftelden.

Eene

Eene jeugdige vrouw, van een aandoenlyk en zwak zenuwgestel, wandelde op zeekeeren kouden dag, met eene haarer Medgezellinnen naa de Zee-dyk, om de wonterbaare vorming der ysfchortsen, van de vorst, door 't zee-water, in de Wadden, te zien. Naauwlyks was ze t'huiswaards gekeerd, of ze werd door stuipen der bovenste leedematen aangestast; verzeld van flauwtens met eenen kleinen naauwlyks merkbaaren pols. Op het toedienen van eenigen *Antihysterique* droppelen, bedaarden wel dra opgemelde toevallen; maar verscheenen spoedig weeder. Een aderlating van ses oncen, deedt den pols voller en sterker worden. Het afgetapte bloed was dik en vertoonde op de zelfs oppervlakte eene rheumatique korst. Door het gebruik van een mengzel *ex Rob. samb.*, een weinig *Nitrum*, met de *spir. Mindereri*, en *aq. Costä*, wierd de uitwaazeming hersteldt en de lyderesse genas. --

Eene vrouw, byna 50 jaaren oud: wierd dikwerf door eene hartklopping gefoltert; was daar by onrustig; verzeld met eenen rasen tuschenposenden pols. Daar de lyderesse aan eene Catarrhale koorts gelaboreert hadde, schreef ik opgemeld toeval, aan een zwak en aandoenlyk spier en senuw-vezel, toe. Na haar eenigen *Antihysterique* droppelen toegedient te hebben. liet ik haar, om de 2 uren, een brok, ter groote van eene muschaat noot, van ondergeschreeven *Electuarium* gebruiken: *R. cort. peruvian. opt. S. P. Unc I rad. valerian. sylvestr. Unc ½ Limat Martis Dr. 2 syr. Cort. aurant. q. s. ut F. Elect.*

Door

Door welks gebruik, opgemeld toeval verminderde en de Lyderesfe eindelyk herstelde.

Een Vryfter, verzogt myn hulp, wegens eene pynlyke aandoening, verzeld van eene zonderlyke beweeging (gelyk zy zich uitdrukte) in den Buik, welke van daar, na de keel opklom en eene krampagtige toefluiting van de *Larynx* veroorzaakte. Opgemelde toevallen in den buik, wierden door my aan winden (door veerkragteloosheid van 't Darm-canaal) toegeschreeven. Veelal eigen by *hysterique* vrouwen. Ter versterking van dezelve, diende ik haar, een *Elect. ex Cort. peruvian opt., rad. helenii, gentian., Cort. aurant*, met de *sal Martis* en *syr. Menth.*, toe. Door welks gebruik, gepaart met staal water en melk, ze genas.

Een Jongeling van 18 jaaren pleegde my, wegens eenige vallende-ziekachtige toevallen, raadt: zyn gebrekkige spysverteering, slymachtige beslagene tong, dikwerf walgingen en traagen stoelgang; mitsgaders het bleekkleurig aangezicht, gezwollen randen der bovenlip en neus; onrustigen slaap en verwyde oogäppelen, dedden my vermoeden, dat opgemeld toeval, aan wormen zynen oorsprong verschuldigd was.

Door 't toedienen van een *Emeticum ex Tart. Emet.* onlaste hy eene meenigte slym, neevens eenen langen ronden worm; vervolgens liet ik hem pillen, *ex sapon. venet., gum Asæ. Foetid., Aloës, Extr. amar., cum vitriol. martis*, gebruiken, waardoor eene groote meenigte wormen *per sedes* geloost wierden; en de lyder, van opgemelde ziekte, bevrydt wierdt. —

Door

Door het gebruik, van voornoemde pillen, genas ik insgelyks een Boer van eene lastige jeukte in 't *intestinum rectum*, door aars-mzaden veroorzaakt. —

Daar de Berichten, van deezen aart, niet gedogen, meer dergelyke gevallen by te brengen, zy het my geoorloofd, den leergierigen Heelmeester, ter lezing aan te pryzen, de fraaye werken des heeren WYTH en MICHELL, waar in hy, nopens de oorzaaken, den aart, kenmerken, voorbehoeding en geneezing, der zenuw-ziektens, uitmuntende onderrichting, bekomen kan. —

Voor en al eer ik eindige, vergunne men my slechts nog één geval meede te deelen: om hier door te toonen, dat 'er een zeer nauw verband is tusseh n de Genees- en Heel-Kunde: dat de laarste in zeer veel gevallen, weinig of niets kan uitrichten zonder meede hulp der eerste: dat men ook hierom, niet zeer gunstig kan denken over Heelmeesters, die voor het minst niet zoo wel bedreeven zyn in de Geneeskunst, a's de practicale leerstellingen d'er Weetenschap, voor zoo verre zy teevens e-nige betrekking hebben op de oeffening der Heelkunde. —

Een Man, ruim 50 jaaren oud, pleegde inyden 24 van Slachtmaand, raad: weegens een ligte ontvelling aan de scheen, verzeld van eene roosachtige ontsteeking deezes Deels en stee-kende pyn. Bovendien was de opperhuit in deszelfs omtrek, met veele blaasjens opgeheeven en met een dun s'cherp vogt gevuldt.

Ik knipte alle blaasächtige verheevendhee-

den door ontlafte het inhoudend vogt; en befmeerde deezen, neevens het roosächtige gedeelte des Beens, met *ung Nutritum*.

Nauwlyks waaren 'er 8 daagen verlopen, of het twee derden gedeelte des opgemelden deels, neevens de rug en zydelijke deelen van den voet, waaren door de telkens opkomende bleinen, ontveld, en ontlasten eene groote meenigte dun fcherp vogt.

Daar de fcherpte in de vogthoop des Lyders van my, als de oorzaak deezer toeneemende verërgering befchouwd wierd: diende ik hem een *decoct. ex rad. bardanae, liquirit. æ, herb. agrimoniae* en *Flor. jamb.* toe, fchreef hem een verzagende Eetreegel voor: en dekte het ontvelde deel, met een pleifter, (die den Lyder alleen verdroeg) wiens zamenftelling, uit hoofde van het voordeel, diè den Maaker daar van geniet, als nog geheim blyft: (maar naar myn inzien waarfchynlyk uit de *lap calamin, bolus armenae*, met een weinig Waschen olyfolij beftaat) gepaart met eene horizontaale legging en volftrekfte rust van het lydende deel.

Op deeze wyze, hadt ik het genoeg, dat de fcherpte der vogten wel haast geleenigd; het ontlafte vogt niet alleen lyviger werdt, maar wel dra in goeden Etter veranderde; zoo dat zig binnen korten tyd, op verfcheiden plaatfen huiltippen opdedden, waar door deeze aanmerkelyke huidzweer, reeds den 14 December, volkomen geftoten was.

Ter meerder verfterking van het Lidteeken liet ik by wyze van omflagen *aq. Goulardi* nog eenigen tyd bezigen.

De koude, door den vorst veroorzaakt, die op

op den 16 December inviel; maar den 25 deez-
zer vry heevig was: deedt op gemeld deel an-
dermaal roofachtig ontfteeken, verzeld van hier
en daar kleine opkoomende blaasjes met een dun
fcherp vogt gevuld en pynlyke fteekingen.

De beftrooying van het lydende deel met het
pulvis ad erysipelas Mynzicht.; neevens het aan-
houdend gebruik van poeyers *ex mere. dulci,*
sulph. aur antim. met eenige greinen *Rheum*,
volbrachten de volkomene herftelling. —

Aanmerking.

Opmerkelyk was het, dat wanneer de ly-
der, door het gebruik van opgemeld *Decoftum*
en poeyers, eene aanmerkelyke jeukte om het ge-
heele lichaam (door de vermeerderde uitwaaze-
ming van de fcherpe roos-ftoffe) ontwaar wierd;
hy al dan weinig hitte of fteeking aan het Been
gevoelde. —

Uit het voorgaande Bericht, blykt derhalven,
dat het grootfte getal ziekten, van eene rheu-
matique galachtige aart is geweest. De vogtige
weersgefteldheid ten toemalige tyden, waaren de
voorfchikkende oorzaken der zelve ziek-
ten. —

KORTBERICHT

DER

ZIEKTEN

welke in het Jaar 1794 in

M E P P E L

Geheerscht hebben,

DOOR

B. W. VAN DE SANDEN.

January.

Van den 1 tot den 3 hadden wy OZO. winden met helder weer en vorst. Den 4 W. wind met vorst en zeer dikke mist. Van den 5 tot den 8 helder weer en vorst met O. wind. Den 9 was de wind W. met vorst en mistig weer. Den 10 Z wind met dooy weer en mist. Den 11 en 12 was de wind ONO. met vorst en zwaare mist. Van den 13 tot den 20 hadden wy zagte W. wind, met dooy weer. Den 21 en 22 was de wind O met veranderlyk weer. Van den 23 tot den 25 regen en storm met W. wind. Van den 26 tot den 29 ZW. wind met vorst en sneeuwjagt, terwyl de 30 en 31 de wind weder W. was met mistig en regenachtig weer.

Niet

Niettegenstaande het flappe en veranderlyke weêr hadden wy deeze maand niet veele ziekten, behalven verkoudheden, zinkingachtige zeere keelen, rheumatique pynen en duizelingen. Nu en dan zag ik hardnekkige hoesten, vergezeld met een wit en papachtig beslag op de tong, smakeloosheid en bedorven adem; uitwazemende middelen waren over het algemeen nadelig en verergerden de toevallen, terwyl ontlastende middelen als *Ipecac.* en rhabarber deze hoesten geheel wegnamen.

In het midden der maand begonnen zich hier en daar *peripneumoniae* en *pleuritides inflammatorie pituitosæ* te openbaaren, dezelve begonnen met een ligte drooge hoest en benaauwdheid, welke langzaam erger wierden, wanneer er koorts bykwam; de legging wierd zeer lastig en by zommigen onmogelyk, het aangezicht en de oogen wierden rood en opgezet, en by zommigen geduurig zuiver bloed opgehoest; door herhaalde aderlatingen, welke altyd een dik galachtig zwart bloed gaven, veele emollierende dranken en verzagende pappen te gelyk met de damp van warm water wierden eindelyk deze ziekten overwonnen.

Kinderen leden deze maand zeer veel aan stuipen, het getal der geïstorvenen daar aan beliep 6.

Hoe zeer de kinkhoest zich maar in enkele huïsgezinnen meer vertoonde, overleden er deze maand nog 2 kinderen aan.

Ge uurende de heldere koude dagen zagen wy by sterke en volbloedige menschen duizelingen en hoofdpynen; door tydige aderlatingen

gen wierden in zulke gevallen beroertens voorgeschooten.

Aamborstige Lieden leden deze maand gedurende het mistige weêr zeer veel. Er overleed een aan de tering.

Aan een vrouw van een zwak en teder gestel, welke eenigen tyd met wormen geplaagd was, gaf ik de *Cortex Geoffr. surinam.* met dat gevolg, dat verscheidene lange ronde wormen tegelyk met eene groote hoeveelheid slym ontlast wierden, ter zelve tyd ontdekte ik dat er eenige leden van de kauwoerde worm ontlast waren; ik diende haar aanstonds het middel van Nouffer toe, waar door ongeveer 40 ellen van de Lintworm uitgedreeven wierden.

February.

Van den 1 tot den 3 hadden wy Z. wind met helder weêr. Den 4 en 5 was de wind ZO. met donker weêr en stinkende dikke mist. Den 6 en 7 hadden wy helder weêr met vorst en O. wind. Van den 8 tot den 16 bleef de wind bestendig W. wayen, met veranderlyk donker regenachtig weêr en gedurige stormwinden. Den 17 en 18 hadden wy NO. wind met koude regen, welke den 19 en 20 door vorst en helder weêr met O. wind werd afgewisseld. Van den 21 tot het einde der maand was de wind W. en NW. met veelvuldige regen en storm.

Deze maand gaf ons zeer weinige ziekten;
zom-

zomtyds zag ik catarrhale hoesten van dien aard, als in de voorgaande maand ook plaats hadden. Nu en dan nam ik zinkingachtige zeere keelen waar, welke meest al iets van het ontstekingsachtige hadden, en gewoonlyk eene kleine aderlating vorderden, waarna zy door uitwasemende en verdunnende middelen behandeld, spoedig weggenoomen wierden. Hier en daar begonnen zich in deze maand galachtige colyken te openbaaren, welke door buik ontlastende middelen als *Ipecac.* en *Rhabarb.* het best tegen gegaan wierden; rheumatique pynen waren mede niet ongemeen: Atsthmatici leden in deze maand zeer veel, kinkhoest werd deze maand niet meer waargenomen.

Maart.

Vanden 1 tot den 7 hadden wy meest ZO. Z. en ZW. wind met zagt weêr en zonneschyn. Den 8. 9. en 10 was de wind bestendig O. met nagt vorst. Den 11 hadden wy weder Z. wind met regen. Van den 12 tot den 17 bleef de wind aanhoudend W. vergefeld met donker regenachtig en storm weêr. Den 18. 19 en 20 was de wind Z. en ZW. met aangenaam weêr. Op den 21 liep de wind O. en bleef tot den 28 bestendig uit dien hoek waajen, gaf ons helder weêr, nu en dan met nagt vorst vergezeld. Den 29 30 en 31 kreegen wy warm en groeizaam weêr terwyl wy Z. en ZW. wind hadden.

Zeere keelen en rheumatique pynen heerfchten

dezemaand het meest, hier en daar zag ik *pleuriti* en *cripneumonia rheumatica*, waar van de vezellende koorts catarihaal was; de beweging was meer belemmerd als de ademhaaling; een kleine aderlating vond ik altyd dienstig vooraf te laten gaan, waarna spaansche vliegen en uitwaasemende middelen de ziekte spoedig wegnamen.

April.

Van den 1 tot den 4 was de wind N. NW. met zeer goed warm weêr. Van den 5 tot den 12 was de wind W. in den beginne met koude, den 7 groeizame regen; van den 8 tot den 12 warm weêr. Den 13 en 14 hadden wy O. wind met extra warm weêr, tekenende de Thermometer van Fharenheit des middags 72 gr. Den 15 liep de wind N. met frisch weêr en 's avonds donder. Van den 16 tot den 19 was de wind NW. met een heldere warme lugt. Den 20 hadden wy met O. wind regen en donder. Van den 21 tot den 24 hadden wy meest N. en NO. winden met helder warm weêr. Den 25 en 26 veel regen met ZW. wind. Den 27 en 28 N. wind met heldere lugt, den 29 en 30 O. wind, met warmte.

Daar het weêr gedurende de geheele maand des daags meesten tyd zeer schoon en buiten gewoon warm was, wierden velen door de koude morgen en avond lgt van voorjaars koortsen aangetast, welke meest al van een zinking-
ach.

achtigen aart waren, met vervuiling der eerste wegen gepaart. De koorts begon gewoonlyk met eene bezetting en plaatslyke pyn inde borst, welke eene kleinè aderlating noodzakelyk deed worden, het bloed was in de meeste gevallen een weinig ontstoken; in enkele gevallen, alwaar eene aderlating de pyn niet geheel wegnam, deed een aangelegde spaansche vlieg pleister dezelve spoedig verdwynen, terwyl de overige toevallen van walging, beslagen tong, benaauwdheden &c daar na door braak en laxermiddelen spoedig wierden weggenomen, wanneer de ziekte gewoonlyk door een overvloedig zweet eindigde.

Choleræ en *colicæ biliosæ* waren in deze maand vry algemeen, dezelve verdroegen in den beginne gene sterke purgeermiddelen, zagte clystieren en verdunnende middelen deden de pynen en geweldige bewegingen der ingewanden spoedig bedaren, wanneer daarna door zagte ontlastende middelen de galachtige ziektestof gemakkelyk werd afgevoerd.

Peripneumoniæ inflammatorio-biliosæ wierden in deze maand ook nu en dan waargenomen, door aderlatingen en braakmiddelen genazen dezelve spoedig.

Slymberoertens onder bejaarde lieden hadden geduurende dezen tyd plaats en wierden door aderlatingen en ontlastende middelen, waar door veel taaye slym werd afgevoerd, meestal gelukkig genezen. Asthmatici leden buiten gewoon veel.

Een lyder, van elders herwaarts gekomen, lag zeer hevig ziek aan eene *febris scarlatina*,

dog had niets byzonders in haren loop, en op de gewoone wyze behandeld genas dezelve binnen 14 dagen, zonder dat de besmetting zig verder uitbreide.

Parotides onder de kinderen waren deze maand zeer algemeen. Twee overleden deze maand aan de tering.

Mey.

Byna de gehele maand door was de wind W. en NW. Van den 1 tot den 9 hadden wy met W. wind, afwisselend regenachtig en warm weêr. Den 10 en 11 ZZW. wind met warm weêr en regen. Den 12 W. wind met regen. Van den 13 tot den 16 W. wind, met helder weêr en nagt vorst. Den 17 NO. wind met helder weêr. Van den 18 tot het einde der maand W. en NW. winden, den meesten tyd met goed weêr, nu en dan regen.

De tusfschenpozende koortsen waren meest galachtig, velen hadden de tekenen van *febris biliosa*, kwamen s'avonds met koude aan, eindigden met zweet; herhaalde braakmiddelen door purgeermiddelen gevolgd, bragten gewoonlyk een spoedige genezing te weeg. Wanneer na genoegzame ontlastende middelen echter de aanvallen der koorts niet geheel ophielden, was het nodig de koorts bast aanstonds te geven, om eene weder instorting voortekomen.

Zinkingachtige zere keelen meest al met gal-
ach.

achtige ongesteldheid der ingewanden gepaard, waren deze maand zeer menigvuldig.

In een allerhevigst colyk, daar alle gewoone geneesmiddelen zonder veel vrugt aangewend waren, deed een spaansche vlieg plailter op de buik aangelegd, uitneemend veel dienst.

Bloedvloeijingen by vrouwen nam ik deze maand buiten gewoon veel waar, by twee van dezelve volgde een miskraam.

Parotides onder de kinderen bleven nog zeer menigvuldig.

Juny.

Van den 1 tot den 4 hadden wy N. wind. Van den 5 tot den 12 was de wind W. welke op den 13 en 14 O. waajde. Van den 15 tot den 19 N. en NW. wind. Den 20 O. Van den 21 tot den 24 NNO. Den 25 en 26 ZW. Den 27 N. Den 28 29 en 30 O. — Deze gehele maand door hadden wy buiten gewoon warm weer, zo dat de Thermometer op onderscheidene dagen te 2 uur na den middag op 90°—95° stond; den meesten tyd was de lugt droog en helder. Op den 7 een weinig regen. Den 20 regen met donder en bliksem en den 25 sterke regen.

De *febris biliosa* begon zig door de aanhoudende warmte meer te openbaren. Na dat de zieken eenige dagen geklaagd hadden over gebrek aan eetlust, wierden zy door zwaare pyn in het hoofd, de rug en lenden aangestast,

taft, vergezeld met benaauwdheid en drukking omtrent de hartkolk, walging, geele en flymige tong, afwisselingen van koude en hitte, en hevige vermoeidheid in alle de leden. Wanneer in dezen toestand een braakmiddel wierd toegediend en daarna zagte laxermiddelen, namen dezelve door het ontlasten van veel taaye fcherpe gal de ziekte meestal in eens weg. Indien men echter deze ontlastingen in den beginne verzuimde, wierd een gedeelte der galstof in het bloed opgenomen, waarna de koortfge aanvallen fterker wierden, vergezeld met een geele kleur in de huid, felle hette, hoog rood water, en een ondraaglyke pyn in de onderfte ledematen; veelen wierden in dezen toestand door een geweldig verzwakkende diarrhé aangevallen, waarby de tong rood en droog was. In deze gevallen, vooral wanneer er nog geen diarrhé plaats had, deed een braakmiddel uitfteekende dienften, en kwam de diarrhé meefttyds voor, ja zoms deed het dezelve ophouden; wanneer dus door de braking veel galáchtige ftoffen waren ontlast, had ik veel nut van het toedienen van zuuren, als Tamarinde, Cremor tart. en diergelyken, met een weinig tart. Emet. gemengd; waar door de buik opengehouden wierd en in weinige daen een goede crisis wierd te weeg gebragt. Indien echter na een hoewel laat toegediend braakmiddel de diarrhé met groote zwakheid bleef aanhouden, vond ik veel nut by de *arnica*, deze ontbond de taye stof in de ingewanden, maakte dezelve beweeglyk, veroorzaakte een vogtige en beflagene tong, en gaf

ge-

gelegenheid, dat de ziektestof door zachte *emetic* na boven en beneden ontlast kon worden, waarna de *Cort. peruv.* met *serpent. virginian.* &c. de Lyders spoedig tot vorige gezondheid bragten.

Galcoliquen waren deze maand ook menigvuldig, ontstonden uit eene ophoping van galstoffen in de eerste wegen, en vorderden ontlastende middelen; het best voldeden in deze gevallen de *Ipecacuanna* en *Rhabarbar*, waardoor de stoffen naar boven en beneden ontlast wierden. Dezulken, aan welke zure ontlastende middelen wierden toegediend, kregen meest hevige krimpelingen in de ingewanden, en zware doorloopen, welke geen verligting te weeg bragten.

Parotides bleven nog vry algemeen in het begin der maand, tegen het einde der maand wierden dezelve weinig meer waargenomen.

By 2 Kinderen hier uit Holland aangebragt, wierden pokjes gezien, welke zeer goedaartig waren, en niets byzonders in haren loop hadden. Een Jongeling overleed deze maand aan de tering.

July.

Van den 1 tot den 22 hadden wy bestendig droog weêr, met felle zonneschyn en warmte; niet zelden zag ik op het warmste van den dag de Thermometer van Fharenheit tot 93 klimmen; de wind was gedurende dien tyd verander-

derlyk. Van den 1 tot den 3 was de wind W. Den 4 N. Wind. Den 5, 6 en 7 was de Wind O. extra warm. Den 8 en 9 W: en NW. Wind. Van den 10 tot den 12 N. Wind. Van den 13 tot den 17 was de Wind bestendig W. Den 18 en 19 hadden wy N. en NO. Winden. Van den 20 tot den 22 W. Den 23 was de Wind ZW. met regen en donder vergezeld. Den 24, 25, en 26 ZW. Wind met regen. Den 27 en 28 hadden wy bestendig W. Wind, met stormachtig weêr en regen. Den 29 W. Wind met goed weêr. Den 30 was de Wind ZO. met warm weêr, waarop s'avonds zwaare donder en bliksem met stortregen volgde. Den 31 hadden wy weder W. Wind met aangenaam warm weêr.

In deze maand hadden wy weinige zieken, allen waren zy van een galachtigen aart. Galcoliquen waren de meest heerschende ziekten; nu en dan wierden ook galachtige boorden waargenomen, dezen echter waren zelden zeer hevig, en genazen meest al door het toedienen van zachte clysteeren en verdunnende dranken; terwijl eindelyk zagte demulcentia en anodyna het lighaam geheel tot rust bragten.

De Galcoliquen, welke door eene verzameling van Galfstoffen in de eerste wegen wierden veroorzaakt, verderden ontlastende middelen, als Ipecacuanha en Rhabarber, waar door de stoffen spoedig naar boven en beneden ontlast wierden. Bittere Maagmiddelen met een weinig Rhabarber gemengd, beveiligden de herstel- de Lyders voor een nieuwen aanval.

De Kinderziekte, welke zich in de voorgaande

de maand had beginnen te openbaren, bleef nog sporadice grasseeren; dezelve was van een zeer goeden aart, en had niets byzonders in haar loop.

Op de sterfelyft vond ik een kind, aan de kinderziekte overleden.

Augustus.

Van den 1 tot den 6 hadden wy bestendig W. wind, den 1 en 2 met aangenaam warm weêr, den 3 en 4 wind en regen; den 5 'smorgens zware donder en bliksem, gevolgd van stormwind en felle plasiegen: den 6 goed weêr. Den 7 was de wind veranderlyk, meest Z. W. met weinige regen. Den 8 en 9 was de wind N. en NO. met veel wind. Van den 10 tot den 14 hadden wy meest W. wind, met donker weêr. Op den 15 liep de wind O. en bleef tot den 19 O. verzeld met warmte, waarop den 19 'savonds felle donder en bliksem volgde met veel regen, terwyl de wind W. liep, en tot het einde der maand bleef aanhouden, den meesten tyd verzeld met goed weêr; den 27 en 28 alleen hadden wy regen en storm, gelyk ook den 30 en 31 een weinig regen.

De galachtige ongeesteldheid, welke zig in de beide jongstverlopende maanden had beginnen te vertonen, kreeg meer en meer de overhand. Galkoliquen en boorden, St. Anthoniesvuur, baistaard peripneumonien en Galkoortsen wieden veel waargenomen.

Bastaard peripneumonien, door de natte lugt en koude avonden veroorzaakt, waren vaneen galagtigen aart, hoe zeer zy het voorkomen hadden van een ware peripneumonie, dewyl er met de hoeft meestal een volle pols en zware benaauwende ademhaling gepaard gingen. Aderlatingen bragten geen verligting toe, terwyl purgeermiddelen de benaauwdheden doorgaans vermeerderden; de tong, welke in het eerst zuiver was, wierd al spoedig geel en de smaak bitter: hier by kwam opgespannenheid der maag, met gedurige walging. Braakmiddelen in deze omstandigheden tydig toegediend, ontlasteden zo wel naar beneden als naar boven zeer veel galstoffen, waardoor de hoest en benaauwdheden meestentyds geheel wierden weggenomen.

Galkoortsen begonnen met de gewone toevallen van hoofdpyn, duifeling, walging, pyn in de lenden, benaauwdheden, afwisselende koude en hitte, vuil en geel beslagen tong, met een bittere smaak, Door *Ipecac*: en daar na Rhabarber by tyds gebruikt wierden velen spoedig genezen: wanneer deze ontlastende middelen in den beginne verzuimd wierden, nam de ziekte spoedig toe, 'er kwamen yling, verzwakkende *diarrhé*, en by velen stuiptrekkingen by; in dezen toestand was het nodig na genoegzame ontlastingen de koortsbast met campher en wyn toetediennen, waar door de meesten herstelden.

Hier en daar zag ik ook intermitteerende koortsen, hoe zeer het lighaam genoegzaam gezuiverd was, was echter de koortsbast alleen niet in staat dezelve wegtrenemen, maar veroorzaakte dikwerf buikverstoppingen en opspanningen. Het

tal *Ammoniac* ende *Rhabarber* by de koortsbase gevoegd voldeed in deze gevallen by uitstek.

Scorbutique zweren in de mond by kinderen wierden deze maand menigvuldig waargenomen, en waren meest al met gal gepaard, braakmiddelen en openende Laxeermiddelen waren zeer dienstig; mondspoelingen met spir. salis deden mede veel nut.

De Pokjes begonnen in deze maand meer algemeen te worden meest alle lyders hadden onvermengde goede pokjes. — Een kind van 2 jaren overleed aan dezelve.

Er stierven deze maand 2 aan de tering.

September.

Den 1 en 2 hadden wy W. Wind, met goed weer. Den 3 en 4 veranderlyke O. Wind in t regenachtig weer. Den 5 was de wind W. met warmte, Van den 6 tot den 10, hadden wy bestendig O. Wind, den meest n tyd met koude en regenachtig weer. Van den 11 tot den 14 was de Wind W. en NW. met goed weer, het welk tot den 18 bleef aanhouden, meest met Z. O. winden. Van den 19 tot het einde der maand, hadden wy meest ZW. W. en NW. winden, den 20 met stormwind en stortreegen, den 21 veel reegen, den 23 en 24 veel reeg n met Bliksem en Donder: tot het einde der maand helder en koud.

De

De Maselen begonnen zich in het begin der maand ineest onder de Kinderen te openbaren, en namen daaglyks meer en meer de overhand, zy waaren zeer gereegeld en goedaartig. De zieken wierden eerst door alle tekenen van eene ligte verkoudheit aangevallen, welke by zommigen 4, 5, of 6 dagen aanhielden, by anderen weederom veel langer werd n waargenoomen; de uitbotting was meest al gereegeld, met weinig koorts verzeld: eerst openbaarden zich roode en weinig verheevene vlakken op het aangezicht en aan den hals, vergezeld met roode en tranende oogen, het heldere zonneligt, en de schyn van het vuur was onverdraagelyk voor de oogen, veroorzaakte steekende pynen en vermeerderde de roodheid der oogen; een geringe hoest ging algemeen met de zelve gepaart. Op den 2den dag was de uitslag over het geheele lichaam algemeen, helder rood schynende, terwyl meestal op den derden dag de uitslag zich reeds flaauwer vertoonde, en de hoest sterker was; op den vierden dag verdweenen alle toevallen gewoonelyk, de lyders bevonden zich wel en binnen weinige dagen volgde eene gunstige afschilvering der huid. Dit soort van Maselen vereischte genoegzaam geene geneesmiddelen, eene ruime toediëning van warme verdunnende dranken, een goed dieet en matige warmte bragten spoedig de volkomen herstelling te weeg.

De pokjes, welke zich deze maand meer epidemisch begonnen te vertoonen, waaren zeer goedaartig en hadden meestal een allergunstigsten loop. Een kind, het welkzamen-

vloei-

vloeiende pokjes had, die reeds begonnen optedroogen, en waarby zich in het geheele beloop der ziekte geene nadelige toevallen vertoond hadden, kreeg zeer onverwacht eene hevige bezetting op de borst, vergezeld met stuiptrekkingen, waaraan het binnen een half uur overleed. Een Meisje van ruim vyf jaaren, te welk ik omtrent drie jaaren te voren de pokjes had ingeënt, met dat gevolg, dat de plaatsen der inënting behoorlyk aangedaan wierden door ontfteeking suppuratie enz.; op den ioden dag openbaarden zich genoegzaame pokkoorts, agtervolgd van eenige weinige pokjes, hier en daar over het lighaam uitbottende, waarvan echter geene tot behoorlyke suppura tie kwamen, uitgezondert eene pok, welke zich eenige dagen laater op den beneden arm vertoonde, ongeveer twee handen breed onder de plaatsen der inënting; hierom oordeelde ik het kind genoegzaam beveiligd tegen eene nieuwe pokziekte. Dit zelfde kind wierd in deze maand door de natuurlyke kinderziekte aangetast, kreeg discrete pokjes, van een zeer goedaartig soort, vry menigvuldig over het gehele lighaam; de ziekte liep zeer regelmatig af, en het kind genas zonder behulp van eenig wezenlyk geneesmiddel.

De koortsen, galachtige coliquen en boorden van de vorige maand bleven met dezelve toevallen aanhouden, en vereifchten eene gelijke behandeling.

Hier en daar zagen wy by kinderen doorlopen, welke dikwyls met persfingen gepaart en bloedig waren. Bloed-

Bloedvloeijingen by vrouwen waren in deze maand menigvuldiger dan gewoonlyk.

Een meisjen van 2 jaaren en een zoontjen van 9 jaaren overleden in deze maand aan de pokjes.

Twee stierven er deze maand aan de tering.

October.

Van den 1 tot den 4 hadden wy zeer veranderlyke winden, met een donkere nevelagtige lugt. Van den 5 tot den 10 was de wind meest W. met regen en stormachtig weer. Den 8 en 9 vergezeld met hagelbuyen. Den 11 en 12 was de wind Z, met helder weer. Van den 13 tot den 16 hadden wy O, en ZO. wind met zonneschyn. Van den 17 tot den 21 ZZW. wind, den meesten tyd met goed weer; den 19 regen. Van den 22 tot den 25 hadden wy O. wind, met goed weer, s'morgens zeer mistig. Den 26 NW. wind, met donkere lugt. Van den 27 tot den 30 ZW. wind met regen en stormwinden. Den 31 W. wind, droog en koud.

Het veranderlyke weer gaf hier en daar ziekten, welke of ontsieekingachtig of van een rheumatiquen aart waren. Roos, rheumatique pynen, heesheid en verkoudheden waren algemeen, waarby zich veele teekenen van een dik galachtig slym in de eerste wegen. als een witte beslagene tong, bittere smaak en dergelyke vertoonden; na het be-
hoor-

hoorlyk zuiveren der eerste weegen, deden uitwaasfening bevorderende middelen als *Elix. guajac. vol. Pulv. Dov. &c.* uitneemende diensten.

De pokjes, welke in de voorige maand reeds epidemisch hadden begonnen te grasfeeren, waren deze maand zeer algemeen, en offchoon dezelve in het begin der maand goedaartig waren, stierven er echter op het einde der maand, toen dezelve kwaadaartiger begonnen te worden, reeds 5 aan deze ziekte, waarvan 3 Mans en 2 Vrouwen: als 3 van 1 tot 5 jaaren, 1 van 5 tot 10 jaaren, 1 van 25 tot 30 jaaren.

Ik had verscheidene zieken aan goedaartige pokjes, welke allen regelmatig afiepen; by anderen was de uitbottings-koorts zeer hevig, vergezeld met braking, benaauwdheden, hoesten, niezen en tranende oogen; gewoonlyk geschiede de uitbotting by deze lyders zeer traag, en duurde eenige dagen, de pokjes waren klein, en vielen zeer ligt in. In deeze gevallen deed een tydig toegediend braakmiddel zeer voordelige uitwerking, terwyl spoedig aangelegde spaanschevliegplaafters aan de beenen, en het gebruik van de *sulph. aur. antim.* een meer geregeld beloop der ziekte te weeg bragten.

Een kind van 5 jaren, hetwelk zeer weinige pokjes had, die regelmatig afiepen, kreeg op den tyd der uitbotting eene hevige neusbloeding, welke reeds 12 uren geduurd had, toen ik by het zelve wierd geroepen; het kind, welk te voren zeer sterk en gezond

was geweest, was door het verlies van zo veel bloed zeer verzwakt, ik liet aanstonds steekwieken in de beide neusgaten brengen, en gaf inwendig de *spir. vitr.* met eene aanmerkelyke hoeveelheid koud water gemengd; hier door bedaarde de neusbloeding. Des anderendaags vertoonde zich over het geheele lighaam *petechiae*, waar van zommigen aanmerkelyk groot waren, ik liet met het gebruik van de *spir. vitr.* aanhouden. Op den derden dag begon de neusbloedig op nieuws zeer hevig, terwyl het kind niet zeer ziek scheen, en de pokjes regelmatig aflieden; ik liet wederom steekwieken met *spir. vitrioli* nat gemaakt in de neusgaten brengen, waar door het bloeden spoedig bedaarde. Op den 5de. dag der ziekte waren de blaauwe vlakken meest allen verdweenen, het neusbloeden bleef geheel weg, het kind at matig, sliep vry gerust, en was binnen weinige dagen door het aanhoudend gebruik van de *spir. vitr.* geheel weder hersteld.

De Mazelen waren nog al vry algemeen, de meesten waren goedaartig, en hadden de gewone toevallen van de vorige maand; anderen hadden veel pyn in de leden, braken en neusbloeding: — wanneer de mazelen in haar volle kragt waren, was gewoonlyk de oogontsteeking en hoeft, het hevigst; meestal verdweenen deze toevallen te gelyk met de ziekte. Verdunnende warme dranken, en zomtyds een eenvoudig aftrekzel van vierbloemen bragt de ziekte-stof genoegzaam naar buiten; zagte *narcotica* deden den hoeft bedaren, terwyl ik in enkele gevallen tot evordering der *ex*

pectoratie er een weinig *sulphur. aurot. antim.* liet ondermengen.

Een Kind overleed deze maand aan de mazelen.

Er stierven deze maand 4 aan de tering.

November.

Van den 1 tot den 4 hadden wy WZW. wind, met regen en storm. Den 5 was de wind Z. met hevige stormwind en regenvlaagen. Den 6, 7 en 8 was de wind ZZO. met zonneschyn. Van den 9 tot den 12 hadden wy W. wind met veranderlyk weêr. Vanden 13 tot den 16 was de wind NW. met aanhoudende regen. Den 17 liep de wind naar het Oosten, en bleef in die hoek tot den 24. Vanden 17 tot den 20 met vorst en helder weêr; den 21, 22 en 23 mistig, Van den 24 tot den 26 W. wind met mist en regenagtig weêr. Van den 27 tot het einde der maand was de wind ZW. en W. met afwisselend helder weêr en regenbuyen.

De Mazelen bleven deze maand sporadice grasfeeren, waren zeer goedaartig, allen herstelden er van.

De Pokjes wierden meer en meer algemeen, en waren minder gunstig als in de vorige maand; de uitbottingskooorts was gewoonlyk zeer matig, de pokjes kwamen zeer langzaam op en bleven veel al lang neergedrukt; waren ledig, of met een dun scherp vogt gevuld.

de pols klein; gewoonlyk ging er eene benaauwende hoeft en fchorheid mede gepaart; welke toevallen met het opklimmen der ziekte vermeerderden; by zommigen was de zwelling aanmerkelyk, by anderen zeer gering; by enkelden had eene overvloedige kwyling plaats, het geen meest altyd een gunstig teken was. De blaasen opgedroogd of afgewreeven zyn- de, wierd de huid in korte ogenblikken droog en hard, en na weinige uuren bruin: velen stierven op of omtrent den 13de dag; by anderen droogden de pokjes geheel op, terwyl er echter brand en hitte der huid, kortademig- heid en kleine pols, dorst en droogte der mond overbleeven, en oifchoon de kragten al eenig- zints vermeerderden, stierven nogtans zommi- gen onverwagts op of na den 20ften dag met flurpen, wanneer zich by deze pokjes een di- arrhé voegde, stierven de meesten spoedig. De koortsbaft en zuuren deden in deze pokjes na deel. — Tydig aangelegde fpaanfche vlie- gen aan de beenen, *regul. antim. in diuin*, *sulph. antim. aurat.* en *Campher* waren zeer voordelig. Ik wierd in deze maand by een elfjarige Ly- der geroepen, welke *variola petechiales* had; op den 4den dag der ziekte waren reeds groo- te purpere vlakken boven de oogleden, het gehele lighaam bedekt met paarfche vlakken, waar van zommigen aanmerklyk groot waren; een menigte dun bloed ftep uit de neus en mond, de adembaling was zeer belemmerd, de borft vol en reutelende, de pols zeer snel en zwak, de lyder waterde by aanhoudenheid bloed, de pokjes waren niet zeer menigvuldig.

Niet-

tegenstaande het spoedig aanwenden van nodige hulpmiddelen als *cort*, *spir. vitr.*, *Camph.* &c. overleed de Jongeling de volgenden dag reedts.

Aan de Pokjes stierven deze maand 14, 7 Mans, 7 Vrouwen, waar van 9 van 1 tot 5 jaar. 3 van 5 tot 10 jaar. 1 van 25 tot 30 jaar. 1 van 30 tot 35.

Voor het overige hadden wy deze maand weinig ziekten, hier en daar wierden catarhale vloeijingen, oog-enkeels ontsteekingen, verkouwdheden en diergelyke waargenomen, welke op de gewone wyze behandeld spoedig wierden weggenomen.

Er overleed deze maand 1 aan de teering.

December.

Van den 1 tot den 4 hadden wy ZZW. wind, den 3 en 4 met helder weêr. Van den 5 tot den 28 hadden wy meest bestendig O. wind, nu en dan wat naar het Zuiden hellende. Den 5 en 6 met vorst; den 7 zware mist en dooy. Van den 8 tot den 11 helder met vorst, dog 'smorgens meest mistig weêr. Vanden 12 tot den 15 donker weêr. Den 16 begon de vorst strenger te worden met helder weêr. Den 24 de telste vorst, 5 graden boven o. des morgens te 8 uren. Den 25 en 27 sneeuw met sterke wind. Den 28 'savonds veranderde de wind en liep W. tot den 30, vergezeld met dooy weêr. Den 31 was de wind weder O. met vorst en dikke mist.

In enkele huisgezinnen wierden de Mazelen nog waar genomen.

De Pokjes bleven nog even menigvuldig aanhouden, en waren over het algemeen van denzelven aart als in de voorgaande maand. 15 Overleden aan dezelve, 3 Mans, 12 Vrouwen, waar van 1 beneden 1 jaar, 9 van 1 tot 5 jaar, 3 van 5 tot 10, 2 van 25 tot 30 jaar.

De ziekten waren wyders deze maand meest zinkingagtig; verkoudheden, rheumatique pynen, diarrhéeen waren de meest heerschende ongesteldheden. *Asthmatici* hadden deze maand veel te lyden, vooral gedurende het mistige weêr. Vele menschen hadden gedurende de koudste dagen een holle krampagtige hoest, welke zeer hardnekkig was.

L R S T

DER GESTORVENEN EN GEBORENEN IN

M E P P E L,

in den Jaare 1794.

*Gestorven.**Geboren.*

January	-	-	14.	-	-	-	9.
February	-	-	5.	-	-	-	9.
Maart	-	-	4.	-	-	-	6.
April	-	-	6.	-	-	-	4.
May	-	-	8.	-	-	-	11.
Juny	-	-	11.	-	-	-	8.
July	-	-	8.	-	-	-	10.
Augustus	-	-	8.	-	-	-	14.
September	-	-	13.	-	-	-	10.
October	-	-	17.	-	-	-	7.
November	-	-	24.	-	-	-	9.
December	-	-	20.	-	-	-	14.

Totaal 138.

111.

KORT VERHAAL

*der in het najaar voorgekomene
Ziektens by het Regiment*

HOLLANDSCHE GARDES TE VOET,

door J. C. A. GENOUX.

Het Volk van voorsz. Regiment door de fatigues der Campagne afgemat, door het slegte en dikwils geheel ontbeetende voedsel, gedurige bivouaqueringen, bloodgesteld aan de uitwerking eener guure, dan warme, dan excesive koude en natte lucht, het leggen op eenen moerasfigen natten grond, de meesten tyd zonder stroo en dikwils zonder eenige andere bedekking als hunne eigen korte rokken, moest natuurlyker wyze het zo veel te meer aan kwaadaartige en zonderlinge ziekten onderhevig doen zyn: terwyl alle deeze bovengemelde gelegenheds oorzaken zaamenvloeden.

De slimste hier van vertoonde zig in de maanden September en October te *Beek* by *Breda*, en nog meer in 't Campement binnen de linien van *Waspik*; op de hevigste en aanhoudenste Rotkoortsen by *Breda* zeer gemeen. volgde te *Waspik* eene soort van *Diarrhaea dysenterica*, die by veele subjecten een effectieve *Dysenteria* wierd; egter door de gewoone heelmiddelen zeer spoedig weer herstelde, voornaamentlyk als hun na behoorlyk gebruik der *evacuantiâ* des avonds eenige geringe dosi's *opium met iprecacanth.*, om de
uit

uitwaasfening te herstellen, toegedient wierd.

Kort voor het veranderen deezes Campements in een Cantonnement der omleggende dorpen, vertoonde zig eene andere heerschende Ziekte, die wegens haaren zonderbaaren aart en verschynzelen meer opmerkzaamheid dan de voorgaande verdiende. De Lyders hier van overvallen, waren niet alleen eenige zeer robusten en sanguinairen als meer zulke die van een phlegmatike en swakke Constitutie waren, zo veel ik hebbe konnen bemerken, zulke die in 't voorjaar met *icterus*, bezogt geweest, en in 't najaar, van de toen heerschende *Diarrhœa* waren bevryd gebleeven.

Deze ziekte die men met de naam van galachtige catarhale Zenuw Koorts zoude kunnen bestempelen, vertoonde zig door eene hevige prikkeling in de neus, verzeld met zwaare hoofdpyn, dommelinge en suysen, of brommen in de ooren (by robuste Lyders vond zig hier by ook wel eene, egter niet zeer hevige pyn in de rechter zyde, onder de korte ribben, een vollen en harden pols, het uit de ader gelaten bloed van zulk een lyder, was zeer goed gemengd, van goede couleur en scheiding: de slegte gevolgen echter van dezelattingen, waar door de kragten der lyders dadelyk verminderden, de snert vermeerderde, en de geheele loop zyner Ziekte hardnekkiger wierd, deden my in 't vervolg ten eene maale van deze methode afzien) de tong was wit toch wel nig aangestigen, de smaak goed, of schoon by eenigen bitter (gegevene *emetica* in dit laatste geval

ren van weinig uitwerkzel en geen nut, maar wel van dat kwade gevolg, om de weinige krachten der lyders genoegzaam geheel te doen verliezen): Gewoonlyk 3, en by andere meer phlegmatike Lyders ook wel 12 uren na deze eerste verschynfelen, verdween deze lastige kribbelinge in de neus, plaats makende aan eene doorgaans geele, by eenige citroen, by andere meer oranje kleurige verw des Vels; het wit der Oogen behield, (hetzelve wierd zomtyds wel iets blauwer,) gedurende den loop der ziekte deszelfs natuurlyke couleur; te gelyker tyd wierden de tong en lippen kool zwart, hard, geklooven, een zeer stinkende en heete adem volgde, verseld van eene convulsive beweging aller hals en dikwils ook gezigt spieren en der tong; de lyders klaagden nooit over dorst, veele weigerden zelfs om te drinken, egter zonder afschuw daar voor te toonen, het geheele vel wierd na weinige uren brandend hard, droog en ruuw, gewoonlyk begon 's anderdaags reeds de bovenhuit zig afte schobben, egter zonder eenige uitwaasfeming.

De pols was van 't begin der ziekte tot dit tydstop en verder zeer irregulier, klein, gespannen, niet zeer schielyk, en intermitteerde zomtyds wel tot 12 a 14 slaagen

De stoelgangen waren met den eersten aanvang deezer ziekte zwart en geheel stinkend, veranderden egter met de kouleur des vels en wierden grauwwachtig en minder stinkend.

Van het begin tot 't einde der ziekte behielden de lyders 't vrye gebruik haarer overige leden, behalven dat der tong en spraak, die uit hoofden

den der monddroogte en convulsive bewegingen der halspieren zeer gebrekkig wierd, de eetlust bleef hun min of meer by; echter wierden zy om dezelve oorzaak in het nuttigen van eenige spys zeer gehindert; alle behielden het volle gebruik huns verstands, behalven eenige weinigen die op 't einde zeer zwak wierden, en vervielen in een *coma vigil* & *delirium tranquillum*; De bynagelyktydige totaale doofheid, (het eerste zekere kenteeken hunner aanstaande herstelling) deed hun binnen weinige dagen deezen staat met die van bewust zyn en vermindering huns lyden verwisselen.

Daar de genefing deezer ziekte eenen byzonderen aandagt op het temperament en corporeele gesteltenisse van ieder individu vereischte, en dus ook kleine veranderingen in de keusenhetgebruik der geneesmiddelen noodzakelyk werd; zo zy het my geoorloofd hier alleen bytevoegen, het geene ik in 't algemeen als resultaat aangeven kan.

Daar alle evacuandia, zoals reeds gezegt is, eene nadeelige uitwerking voortbragten, zo was alles van zagt oplofende, zweetdryvende, krampstillende en tevens sterkende middelen te verwagten: dit deden dan in het eerste tydftip volmaakt wel de *Liquor digestiv. Boerh.*: in het tweeden, dezelve met een zwak *Decoct. cort. c serpentar.* en *sal succini*, waarby s'avonds gewoonlyk een *haustus* van *spir. Minder. camph.* en *Laud. Lig.* met voortreffelyk succes gegeven wierd. By een verregaande zwakte en *coma vigil* deed voorsz.

De-

Decoct. met vermeerderde *dosis* van *sal succini* en *Camph.*, verzeld met *Vesicat.* en afwasfchingen van het Vel met wyn azyn en water van elk even veel, en laauw warm gebruykt, ogefchyndlyke beteringe bewerken.

Voor ordinairen drank wierd water, zuiker en azyn laauwarm toegediend, de geene die den *spir. vitriol.* neemen wilden, geneesden fchielyker; tusfchen beide, toch meer by 't einde der ziekte gaf men goede rhywijn met water. Den dikwils haperende afgang wierd door verwekende Lavementen onderhouden, by groote zwakte, geftrender afgang en buikpynen, verzeld met *meteorismus* maakte een *cataplasma* van *cort. grof.* met *flor. Cham.* in roode wyn gekookt en op de maag gelegd, als ook een Lavement van *Cham.* met *Mofch.* aanftonds verzagting.

By deze behandeling openbaarde zig gewoonlyk op de vyfde dag, by eenigen, 1 of 2 dagen later een totaale doofheid, het vel begon weeker te worden, de tong eenigzints vogtiger, de oogen traanend, de pols wierd weeker, gelyker en voller, de tong vogtig en minder zwart, de adem vogtiger en minder heet, de flaap gerufter en aanhoudender, de *urin*, voorheen klaar en ligtgeel, wierd nu bruinagtig en troubel, tevens fterk van reuk, gewoonlyk 12 uren laater volgde een zeer fterke klevige, zwavelagtig ruikende critique zweet, die 12 en meer uren aanhield, en waar door allengs alle toevallen verdweenen.

Zagte, zuure en uitvoerende middelen vol-

voleinden dan de kuur, en herstelden den Lyder ten eenemaalen, dog langzaam.


Dieet fouten veranderden dikwils, of veelmeer vertraagden en verslimmerden den loop deezer ziekte. In dit geval deeden volgens indicatie, emetica enz. goede uitwerkingen.

E I N D E.



... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...

THE HISTORY OF THE



... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...
 ... of the ...





